A

TI

ACCADEMIA DI MEDICINA
DI
TORINO
CM 14

SYNOPSIS
NOSOLOGIÆ METHODICÆ,
EXHIBENS
CLARISS. VIRORUM
SAUVAGESII, LINNÆI, VOGELII, SAGARI,
ET MACBRIDII
SYSTEMATA NOSOLOGICA.

EDIDIT
SUUMQUE PROPRIUM SYSTEMA NOSOLOGICUM
ADJECIT

GULIELMUS CULLEN,

*Med. D. & in Acad. Edinburgensi Med. Pract. Prof. Medic.
Reg. apud Scotos Primarius, & Coll. Reg.
Med. Edinb. Socius;*

NEC NON

Societatum Reg. Londin. Reg. Edinb. Philosoph. Philadelph.
Med. Reg. Paris. Med. Hauniens. & Reg. Med.
Edinb. Sodalis.

EDITIO SECUNDA VENETA
JUXTA QUARTAM EMENDATAM
ET PLURIMUM AUCTAM EDINBURGI 1785.

TOMUS PRIMUS.

VENETIIS,
MDCCXCV.

Sumptibus JOANNIS ANTONII PEZZANA.
SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

PARS PRIMA.

GENERA MORBORUM

DEFINITA

AB ERUDITISSIMO

FRANCISCO BOISSIER DE SAUVAGES.

Ex Nosologia Methodica,

2. tom. 4.to

Amstel. 1768.

cumdem finem conferre possent, hic primum addidi.

Quae porro in re nosologica ipse conatus sum, emendatiora, & plurimum aucta, hic protuli; quae tamen ulterius hic dicenda essent, in Prolegomenis, initio tomi hujus operis alterius praefixis, inveniri possunt; atque illuc Lectorem ablegamus.

SERIES CLASSIUM ET ORDINUM.

CLASSIS I. VITIA.

ORDO I. MACULÆ.
II. EFFLORESCENTIÆ.
III. PHYMATA.
IV. EXCRESCENTIÆ.
V. CYSTIDES.
VI. ECTOPIÆ.
VII. PLAGÆ.

CL. II. FEBRES.

ORDO I. CONTINUÆ.
II. REMITTENTES.
III. INTERMITTENTES.

CL. III. PHLEGMASIÆ.

ORDO I. EXANTHEMATICÆ.
II. MEMBRANACEÆ.
III. PARENCHYMATOSÆ.

CL. IV. SPASMI.

ORDO I. TONICI PARTIALES.
II. TONICI GENERALES.
III. CLONICI PARTIALES.
IV. CLONICI GENERALES.

CL. V. ANHELATIONES.

ORDO I. SPASMODICÆ.
II. OPPRESSIVÆ.

CL. VI. DEBILITATES.

ORDO I. DYSÆSTESIÆ.

OR-

ORDO II. ANEPITHYMIÆ.
III. DYSCINESIÆ.
IV. LEIPOSICHIÆ.
V. COMATA.

CL. VII. DOLORES.

ORDO I. VAGI.
II. DOLORES CAPITIS.
III. DOLORES PECTORIS.
IV. DOLORES ABDOMINALES INTERNI.
V. DOLORES EXTERNI ET ARTUUM.

CL. VIII. VESANIÆ.

ORDO I. HALLUCINATIONES.
II. MOROSITATES.
III. DELIRIA.
IV. VESANIÆ ANOMALÆ.

CL. IX. FLUXUS.

ORDO I. SANGUIFLUXUS.
II. ALVIFLUXUS.
1. *Sanguinolenti.*
2. *Non Sanguinolenti.*
III. SERIFLUXUS.
IV. AERIFLUXUS.

CL. X. CACHEXIÆ.

ORDO I. MACIES.
II. INTUMESCENTIÆ.
III. HYDROPES PARTIALES.
IV. TUBERA.
V. IMPETIGINES.
VI. ICTERITIÆ.
VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

GENERA MORBORUM

CLASSIS I. VITIA.

Character. Symptomata cutanea levidenſia, vel mechanicis chirurgiæ auxiliis curanda.

ORDO I. MACULÆ.

Coloris nativi mutationes.

Genus I. LEUCOMA. 1

Macula opacans corneam.

G. II. VITILIGO. 2

Macula corymboſa, ſeu ex minoribus maculis compoſita, cum depreſſione cutis.

G. III. EPHELIS. 3

Maculæ acquiſitæ, umbrinæ, glabræ, corymboſæ, faciem vel tibias, rarius partes tectas, afficientes.

G. IV. GUTTAROSEA. 4

Maculæ faciei rubræ, guttatæ, parum prominentes, aut aſperæ, & diu permanentes.

G. V. NÆVUS. 5

Macula congenita, quæ vulgo tribuitur vehementi cupiditati, qua mater initio graviditatis exagitata fuit, quandoque cum partis eminentia.

G. VI. ECCHYMOMA. 6

Macula nigricans, vel atro-rubra, aut liveſcens, ſucceſſu temporis flaveſcens, non congenita, nec aſpera, ſed plana, aut parum prominens, & ſubſolitaria.

O. II. EFFLORESCENTIÆ.

Tumores humorales exigui gregales, vel cutis elevatio per pustulas, papulas, phlyctænas, varos similesve asperitates.

a. Pustula. Phyma parvulum apice ruptum.
b. Papula. Phyma parvulum desquamari solitum.
c. Phlyctæna. Vesicula fludio seroso plena.
d. Varus. Tuberculum durum constans.

7 G. VII. HERPES.

Efflorescentia ex tumoribus exiguis, rubris, aggregatis, pruriginosis, in squamas furfuraceas, raro crustaceas, abeuntibus.

8 G. VIII. EPINYCTIS.

Phlyctænæ atro-rubræ, aggregatæ trium vel quatuor linearum in diametro, tibias ut plurimum afficientes & noctu potissimum acriter pungentes.

9 G. IX. PSYDRACIA.

Phymata erysipelatosa.

10 G. X. HIDROA.

Exanthemata miliaria plyctænoidea.

O. III. PHYMATA.

Tumores humorales, notabiles, solitarii.

11 G. XI. ERYTHEMA.

Tumor sine febre, superficiarius, solitarius, diffusus, rubro roseus, pressione evanescens.

12 G. XII. OEDEMA.

Tumor diffusus, frigidus, pallidus, laxus, doloris expers.

13 G. XIII. EMPHYSEMA.

Tumor diffusus, elasticus, pressione crepitans, cuti concolor.

G. XIV. SCIRRHUS. 14

Phyma durum, indolens, cuti concolor.

G. XV. PHLEGMONE. 15

Tumor ſpheroideus, rubore, calore, tenſione, dolore pulſatili inſignis, ſponte in ſuppurationem vergens.

G. XVI. BUBO. 16

Tumor partim ſcirrhoſus, partim inflammatorius, glandulæ unius aut alterius inguinalis.

G. XVII. PAROTIS. 17

Tumor ſcirrhoſo-phlegmonodeus glandulæ parotidis dictæ in ſuppuratum lentiſſime vergens.

G. XVIII. FURUNCULUS. 18

Tumor inflammatorius, cutaneus, prominens, durus, & atro-ruber, cujus centrum, cum ſuppuratus eſt, occupant fibræ craſſæ, quæ in pus non colliqueſcunt.

G. XIX. ANTHRAX. 19

Phyma apice gangrænoſum, ambitu inflammatum.

G. XX CANCER. 20

Tumor durus, tuberoſus, lancinans, pertinaciſſimus.

G. XXI. PARONYCHIA. 21

Phlegmone extremi digiti cum dolore perterebrante.

G. XXII. PHIMOSIS. 22

Phlegmone præputii, cum hujus adducendi vel reducendi difficultate.

O. IV. EXCRESCENTIÆ.

Tumores a ſolidis adauctis, indolentes, lente creſcentes, in ſuppurationem ſponte non abeuntes.

G. XXIII SARCOMA. 23

Excreſcentia carnis conſiſtentiam circiter obtinens.

24 G. XXIV CONDYLOMA.

Excrescentia firma carnibus durior, ossibus mollior.

25 G. XXV. VERRUCA.

Excrescentia cutanea prominens, condylomate minor, sensu destituta, indolens.

26 G. XXVI. PTERYGIUM.

Excrescentia carnea, vel membranaceo-vasculosa ad oculi canthum exorta, alam expansam referens, & versus corneam se extendens.

27 G. XXVII. HORDEOULM.

Tumor durus vix sensu gaudens, cuti concolor, raro rubens, in palpebrarum limbo enascens, sphæricus, piso ut plurimum minor.

28 G. XXVIII. BRONCHOCELE.

Excrescentia vel tumor scirrhosus anticæ partis colli.

29 G. XXIX. EXOSTOSIS.

Tumor ossis vel totalis vel partialis.

30 G. XXX. GIBBOSITAS.

Ossium pectoris indecora prominentia a tumore, luxatione, distortione, aut alio principio oriunda.

31 G. XXXI. LORDOSIS.

Ossium distortio, unde hinc protuberant, inde vero excavantur artus, ac incurvantur ossa, vel a situ deflectunt.

O. V. CYSTIDES.

Protuberantiæ factæ a fluidis intra membranas proprias vel alienas maxime dilatatas contentis, vel receptacula quævis distendentibus.

32 G. XXXII. ANEURISMA.

Cystis arteriosa.

G. XXXIII. VARIX. 33

Cystis venosa.

G. XXXIV. HYDATIS. 34

Cystis lymphæductuum.

G. XXXV. MARISCA. 35

Tumores in ani margine enati, rubri, sæpe dolentes, & cruorem sæpe fundentes, sponte dein recedere soliti.

G. XXXVI. STAPHYLOMA. 36

Cystis aquosa corneæ proptosi, & dilatatione, vel ab uveæ hernia trans foramen corneæ elapsa.

G. XXXVII. LUPIA. 37

Cystis vel folliculus materiem pultaceam non purulentam continens.

G. XXXVIII. HYDARTHRUS. 38

Cystis articuli aquosa.

G. XXXIX. APOSTEMA. 39

Cystis purulenta.

G. XL. EXOMPHALUS. 40

Cystis umbilicalis sæpius aquosa.

G. XLI. OSCHEOCELE. 41

Cystis in scroto.

O. VI. ECTOPIÆ.

Proses, Celes, Pararthremata, *Graec.*
Prolapsus, Herniæ, Aberrationes, Luxationes, *Lat.*

Partium solidarum e sua sede dimotio sensibus obvia.

G. XLII. EXOPHTHALMIA. 42

Magnitudo nimia, Prolapsus, Expressio oculi, *Lat.*
Hygrophthalmia, Elephantiasis oculi, *Boerh.* de Morb. Ocul. pars II. cap. 5.
Exophthalmia, Hydrophthalmia, Buphthalmus seu Buphthalmia, Ophthalmoptosis, Ecpiesmus *Græ*-

corum. *Mauchart*, diss. de Hydrophthalmia, & oculi Paracentesi inter *Haller*. disput. Chir. T. I.

Grosseur contre Nature, Hydropisie, Cancer, Chure de l'oeil. *Maitre-Jan*, part. II. chap. 6.; *Saint Yves*, Part. II. chap. 1.

Bulbi oculi procidentia, aucta, vel non mutata sensibiliter nativa ipsius magnitudine.

43 G. XLIII. BLEPHAROPTOSIS *Mauchartii*.

Blepharoptosis, Lagophthalmus, Ectropium, Entropium, *Gr.*

Palpebræ superioris casus, Retractio, Palpebrarum introversio, extroversio, *Lat.*

Chute, relaxation de la paupiere superieure, eraillement des paupieres, trichiaise avec introversion des tarses. Vide *Platner*. Instit. Chirurg. §. 577. §. 584.; *Maitre Jan*, part. III. chap. 18. 19. 20. 21.; *Saint Yves*, part. I. chap. 8. 9. 10: *Dionis*. Dem. 6., *Boerh.* de Morb. ocul. part. I. cap. 5.; *Heister*. Chir. T. 1. part. II. §. 2. cap. 45. 46. 48.; *Gorter*. Chir. repurg. lib. 5. cap. 10.

Palpebræ utriusque vel alterutrius elongatæ, retractæ, introversæ, vel extroversæ ectopia.

44 G. XLIV. HYPOSTAPHYLE.

Staphyle, Kion, Imantium, Craspedon, Columella bicornis, *Aretæi*, Acut. lib. I. cap. 8. de affectibus columellæ.

Uvulæ prolapsus. *Nenter*. tab. 25. cap. 8.

Uvula nimium producta, *Heister*. Chir. T. 2. p. 659.

Uvulæ inflammatio, catharrus, paralysis, casus, *Gorter*, Praxis Med. Syst. pag. 165.

Relachement de la luette, *Dionis*, Dem. V.

Gurgulionis seu uvulæ laxatæ, inflammatæ, ulceratæ, incrassatæ, attenuatæ, bicornis, procidentia.

45 G. XLV. PARAGLOSSE.

Linguæ extumescentia, magnitudo, inflatio, *Galen.* Method. med. libr. XIV. *Valesci de Tarantæ* Philon. lib. 2. cap. 59.; *Marc. Donat.* Med. Histor. mirab. lib. 3. cap. 4.

Linguæ retractio, exertio, *Gorter*.

Glossocele *Gaubii Pathol.* §. 242.; Linguæ extrusio, Idem, §. 254.

Ren-

Renverſement de la langue dans le goſier, *Petit.* Mém. de l' Acad. des Sc. 1742.

Linguæ motu deglutitorio in fauces revolutæ vel ore extruſæ, exundantis, exertæ ectopia.

G. XLVI. PROPTOMA. 46

Partis externæ, etiam ante lapſum conſpicuæ, & a palpebris, bulbo oculi, lingua, ac gurgulione diverſæ procidentia.

G. XLVII. EXANIA. 47

Proctocele *Pathol. Meth.* edit. 3.
Morbus pœnalis Gerhamenſium, lib. Regum I. cap. 5.
Prolapſus ani *Auctorum*, ut *Plateri*, Prax. lib. II. cap. 2. *Nenteri*, tab. 126. &c.
Chute du fondement *Dionis*, Dem. IV. pag. 392. *Arnaud.* des Hernies, tom. I. chap. 28.; *Levret* obſ. ſur les polypes, ſect. 3. pag. 165.

Sphincteris ani, & inteſtini recti inverſi, procidentia.

G. XLVIII. EXOCYSTE. 48

Prolapſus, inverſio veſicæ urinariæ *Auctorum*; *Salzmanni* diſſ. de Hern. veſicæ inter *Halleri* Diſp. Sel. tom. III.; *Solingen* de mulierum & infant. morb. chir. pag. 741.
Renverſement de la veſſie urinaire. *Noel.* obs; Recherches ſur la Hernie de la veſſie par *Verdier*; Mém. de l' Acad. R. de Chir. tom. 2.

Membranæ tum veſicæ corpus, tum ipſius collum, interne obveſtientis procidentiæ per meatum urinarium facta.

G. XLIX. HYSTEROPTOSIS. 49

Hyſteroceles nudæ *Pathol. Method.* Edit. 3.
Relaxatio, prolapſus, procidentia, inverſo uteri vel vaginæ *Auctorum*, ut *Heiſteri* Inſt. chir. tom. II.; *Gunzii* de Herniis, &c.
Relachement, chute, deſcente, renverſement de la matrice ou du vagin. *Arnaud*, tom. 1. chap. 24. &c.; *Puzos* ſur les maladies de la matrice; *Sabatier*, Mém. de l' Acad. R. de Chir. tom. 3.

Uteri vel vaginæ procidentia.

50 G. L. ENTEROCELE.

Hernia inteſtini.

51 G. LI. EPIPLOCELE.

Hernia Omenti.

52 G. LII. GASTROCELE. *Ign. la Chauſſe.*

Hernia ventriculi, *Faber. Hildani* reſp. ad Doring. pag. 915.; *Blegney* Zod. med. Gall. ann. I. Feb. Obſ. 2. pag. 44.; *Gunzii* libell. de hern. cap. 20. *Ign. La Chauſſe* Diſſ. de hernia ventrali, & *Kirſchbaum* Diſſ. de hern. ventriculi in diſp. Chir. Haller. tom. 3. Diſſ. 68. 69.

Hernie de l' eſtomac, *La Faye* ſur *Dionis*, pag. 121.; *Arnaud.* Tr. des hernies, préface, p. 81.; *Sharp* Rech. Crit. chap. I.; *Garengeot*, Mém. de l' Acad. R. de Chir. T. 1. p. 703.

Ventriculi trans laxatos, diductos, regionis epigaſtricæ parietes, imo & per umbilici annulum elapſi ectopia hernioſa.

53 G. LIII. HEPATOCELE, *Gunzii* Libell. de hern. p. 4.

Hernia hepatis, E. N. C. Dec. I. Ann. II. & Dec. II. Ann. VII.; *Bohnii* Chir. rational. pag. 230.

Hernie du foye, *Arnaud* des hern. tom. 1.

Hepatis trans laxatos, diductos in umbilici vicinia abdominis parietes, vel per ipſum umbilicum ectopia hernioſa.

54 G. LIV. SPLENOCELE, *Gunzii* Libell. de hern. p. 4.

Hernia lienis, *Faber. Hildani* epiſt. LV. pag. 999.; *Spigelii* de corp. hum. fabric. lib. 8. cap. 14.; *Ruyſchii* Adverſ. Anat. Dec. II. pag. 23.

Hernie de la Rate, *Arnaud* des hern. tom. 1. pag. 29.

Lienis trans laxatos, diductos abdominis in latere ſiniſtro parietes, vel per inguinalem ejuſdem lateris annulum elapſi ectopia hernioſa.

55 G. LV. HYSTEROCELE.

Hernia uteri *Sennert.* Lib. 4. Med. Pract. part. II. ſect.

sect. II. cap. 17.; *Doringii* Epist. ad G. Faber. Hildanum de hernia uterina, p. 893.: *Graaf.* de mulier. organ. cap. 8.; *Ruysch.* Adv. Dec. II. pag. 23.

Hernie de la Matrice, *Arnaud* des hernies. T. I. pag. 29.; *Sabatier* Mém. de l' Acad. Real. de Chir. T. III.

Uteri trans annulos inguinales, aut laxatos, diductos inferne abdominis medietatis parietes elapsi ectopia herniosa.

G. LVI. CYSTOCELE, *Platner*. Inst. Chir. *Ign. La Chausse* de hern. ventrali. 56

Hernia cystica *quorundam*.

Hernia vesicæ urinariæ *Salzmanni* Diss. inter *Halleri* Disp. Chir. Tom. III. Diss. 72.; *Gunzii* Libell. de Hern. &c.

Hernie de la vessie urinaire *Mery*. Mém. de l' Acad. R. des Sc. 1713. *Garengeot* Oper. de Chir.; *Levret* Obs. sur les polpes; *Sharp* Rech. Crit.; *Verdier* Mém. de l' Acad. R. de Chir. T. II.

Vesicæ urinariæ trans annulos inguinales, sub arcubus cruralibus, & per laxatos, diductos perinæi, hypogastrii, necnon vaginæ parietes elapsæ ectopia herniosa.

G. LVII. ENCEPHALOCELE, *Corvini* Diss. de hern. Cerebri inter *Halleri* Disp. Chir. T. 2. Diss. XLVI. 57

Hernia cerebr., *Reiselii* Eph. N. C. Dec. II. Ann. II. Obs. 115.; *Lechelii* ibid. Obs. 158.; *Treu* Comm. Litt. 1738., Hebd. 52. n. 3.; *Taconi* Diss. de humano monstro Bononiæ nato; *Corvini*, ibidem.

Hernie du Cerveau, *Le Dran* Obs. de Chir. Obs. I.

Cerebri, cerebelli, aut utriusque, verbo Encephali, per ossium cranii non penitus ossificatorum hiatum prorumpentis, ectopia herniosa.

G. LVIII. HYSTEROLOXIA. 58

Obliquitates uteri *Rœdereri*, Elem. art. obstetric. §. 449. — 507.; *Levret* Observ. sur les accouch.

Inclinatio, reclinatio, obliquitas uteri *Deventer*, cap.

cap. 46. 47. 48. : *Ruyschii*, Observ. XCVIII.
Inclinaison, obliquité de la matrice, *Sabatier*, Mém. de l' Acad. de Chir. tom. III. &c.

Uteri, sæpius gravidi, & contra quam in hysterocele fit, abdominis claustris contenti situs in obliquum errans.

59 G. LIX. PARORCHIDIUM.

Testiculorum serior descensus, vel retractio, *Felic. Plateri* Mantiss. Observ.; *Ambr. Paraei* Lib. vii; *Thom. Bartholini* Hist. Anat.; *Morgagn.* Advers. IV.; *Dionis* Oper. de Chir. Dem. IV. *Quelmalzii* inter Halleri Disput. Anatom. T. V. Dissert. I.; *Verdier* sur la Hernie de la Vessie, Mém. de l' Acad. R. de Chir. tom. II.

Testiculi unius, vel utriusque, cujus post nativitatem sedes naturalior scrotum est, situs in alienum aberrans.

60 G. LX. EXARTHREMA, *Græc.*

Exarthrosis, Parathrema *eorund.*
Luxatio, subluxatio, distortio, *Heister.* Inst. Chir. T. 1., *Boerh.* Aph. comment. T. I.; *Gorter.* Chir. repurgat. cap. VI. *Platner.* Instit. Chir. §. 1090 — 1213.
Luxation, entorse, *Petit.* Malad. des os, T. II., *Coll. de Villars* Chir. T. V.; *de la Faye* Princ. de Chir.: *Duverney* Malad. des Os, tom. II.

Separatio contigui in ossium articulis diarthrosice, non vero immobiliter combinatis.

61 G. LXI. DIASTASIS, *Græcorum.*

Ossium recessus, *Latin.*; *Petit* T. II. chap. 8. & 13., *La Faye* Prin. de Chir. pag. 474. *Duvernoy* T. II. ch. 1. & 5.

Ossium cartilaginum, immobiliter combinatorum, separatio, seu recessus ab invicem partialis vel totalis.

62 G. LXII. LOXARTHRUS.

Perversio capitis ossium ac musculorum appensorum, *Duverney*, T. II. cap. II.
Artis vari *Duverney*, T. II. cap. II.
Gibbositas scapularis *Auctorum*.

Os-

Ossium cum motu sensibili articulatorum situs relativus in alienum constanter mutatus, aut obliquitas respectiva persistens citra exarthrema & spasmum.

O. VII. PLAGÆ.

Solutiones continui.

G. LXIII. VULNUS. 63

Solutio mechanica continui in carnibus cum labiorum hiatu, initio cruenta, dein ad inflammationem suppurationemque tendens.

G. LXIV. PUNCTURA. 64

Continui solutio intus tantum extensa.

G. LXV. EXCORIATIO. 65

Cuticulæ vel cutis a carnibus subjectis separatio.

G. LXVI. CONTUSIO. 66

Textus carnosi, potissimum infra cutem, ruptio per minima puncta & vasorum contritio, ecchymoma sæpius inferens.

G. LXVII. FRACTURA. 67

Separatio violenta & mechanica ossis in fragmenta invicem non cohærentia.

G. LXVIII. FISSURA. 68

Separatio ossis in duas partes rima tantum dissitas, & alterutro saltem extremo cohærentes.

G. LXIX. RUPTURA. 69

Tendinum vel ligamentorum aut cartilaginum solutio, vel vehemens distractio, cum vel sine exarthremate.

G. LXX. AMPUTATURA. *Ill. Linn.* G. 241. 70

Solutio continui in partibus tum mollibus, tum osseis, cum artus, articuli, vel partis totali separatione a residuo trunco.

71 G. LXXI. ULCUS.

Partium mollium erosio purulenta, cute profundior, cum pure ichoroso vel utcumque vitioso.

72 G. LXXII. EXULCERATIO.

Excoriatio ulcerosa suppurans.

73 G. LXXIII. SINUS.

Cavitas ulcerosa, cujus fundus amplus, sæpe multiplex desinit in angustum orificium.

74 G. LXXIV. FISTULA.

Cavitas ulcerosa, sinuosa, cujus parietes callosi sunt ut plurimum, aut fundus ad os cariosum, arthrocace corruptum, pertingit.

75 G. LXXV. RHAGAS.

Solutio continui sicca in partium marginibus.

76 G. LXXVI. ESCHARA.

Crusta sicca, mortua, fluidis solidisque corporis humani coagmentata.

77 G. LXXVII. CARIES.

Ossis suo periosteo denudati decoloratio, asperitas, exfoliatio & subsequens fragilitas ac erosio.

78 G. LXXVIII. ARTHROCACE.

Ulcus medullæ ossium, sæpius in epiphysibus, cum carie, exostosi, & dolore.

GL. II. FEBRES.

Pulsus magnitudo & frequentia cum frigore in insultu, fervore in decursu, madore in declinatione, & semper virium prostratione majori quam a virium vitalium gradu foret exspectandum.

OR-

ORDO I. CONTINUÆ.

Impetus febrilis a frigore sæpius exordiens sine exacerbatione partiali, & sine accessu, non pluries quam semel vel bis in mense revertens, adusque finem ægritudinis perseverat.

G. I EPHEMERA. 79

Decursus ægritudinis intra dimidiam septimanam absolvitur. Vigor morbi subito accedit.

G. II. SYNOCHA. 80

Decursus intra septimanam, incrementum successivum.

G. III. SYNOCHUS *Galeni*. 81

Decursus ad duas tresve septimanas, cum pulsus robore sanum, in morbi statu saltem, notabiliter superante.

G. IV. TYPHUS *Hippocratis* 1. & 2. de intern. affect. Foesii 553. 82

Decursus ultra duas septimanas, sæpius tres, cum calore & urina sanorum similibus, pulsuque quoad frequentiam sano fere simili, & quoad robur non majori, artubus interea maxime prostratis.

G. V. HECTICA *Galeni & ejus Sequacium*; *Sydenhami*, p. 524. 83

Decursus ultra mensem, debilitas parva, pyrexia exigua, cum pulsu post pastum frequentiori.

O. II. REMITTENTES.

Pyrexia pluries in decursu morbi crescit & decrescit, non omnino recedit, typus sæpe confusus.

G. VI. AMPHIMERINA. 84

Remissio quotidianæ typum servat. Exacerbationes cum horrore,

G. VII.

85 G. VII. TRITÆOPHYA.

Remissionis typus tertianarius, frigus fere nullum.

86 G. VIII. TETARTOPHYA.

Remissio quartanæ typum servans.

O. III. INTERMITTENTES.

Pyrexia plures in decursu ægritudinis deserit & recurrit, cum intervallis lucidis.

87 G. IX. QUOTIDIANA.

Accessus similes quolibet die accidunt.

88 G. X. TERTIANA.

Accessus similes alternis diebus revertuntur.

89 G. XI. QUARTANA.

Accessus similes duobus interpositis diebus redeunt.

90 G. XII. ERRATICA.

Accessus similes distantes ab invicem pluribus quam quatuor diebus, aut typi omnino incerti.

CL. III. PHLEGMASIÆ *Galeni*.

Pyrexia continua vel remittens cum interna inflammatione, vel cum exanthematis.

O. I. EXANTHEMATICÆ.

Eruptiones cutaneæ cum pyrexia sæpius maligna, quandoque lenta.

91 G. I. PESTIS.

Eruptio bubonum, anthracum, pyrexia typhods.

92 G. II. VARIOLA, *Haly Abbatis Jouberti*, & *antiquorum*.

Eruptio pustularum phlegmonodearum in suppurationem tendentium.

G. III.

G. III. PEMPHIGUS. 93

Eruptio phlyctænarum avellanæ circiter magnitudine sero dilute flavo turgidarum.

G. IV. RUBEOLA, sic primitus nominata a traductoribus *Haly Abbatis* Practicæ, lib. 3. c. I. de Variolæ & Rubeolæ Medela. 94

Eruptio papularum in squamulas furfuraceas abeuntium. Præcedunt tussis sicca, sternutatio, lachrymatio, & febris catarrhalis.

G. V. MILIARIS. 95

Eruptio phlyctænarum mili semini non majorum.

G. VI. PURPURA. 96

Eruptio maculosa purpurea, livida, vel atra, indolens, cum typho vel remittente febre.

G. VII. ERYSIPELAS. 97

Eruptio erythematis cum synocha febre.

G. VIII. SCARLATINA. 98

Eruptio maculosa, rubra, pruriens, papulosa, lata, parum uniformis, in squamulas furfuraceas abiens, sed sine præludio catarrhali, & sæpe ad secundam tertiamvem vicem se prodens ac rerecondens vicissim.

G. IX. ESSERA. 99

Eruptio ut plurimum apyreta, superysipelatosa, subito accedens per vices & recedens.

G. X. APHTHA. 100

Eruptio pustulosa, phlyctænodes, & ulcerosa, in ore aut pudendis.

O. II. MEMBRANACEÆ.

Pyrexia magna typo synochæ vel synochi cum dolore visceris cujusdam.

G. XI. PHRENITIS. 101

Dolor capitis, delirium audax, vis artuum, pulsusque major, pyrexia acuta.

G. XII.

102 G. XII. PARAPHRENESIS.

Symptomata phrenitidis & peripneumoniæ.

103 G. XIII. PLEURITIS.

Dolor lateris, respiratio & pulsus frequens, tussis

104 G. XIV. GASTRITIS.

Dolor epigastrii, nausea, vomituritio, febris typhodes, vel remittens maligna.

105 G. XV. ENTERITIS.

Dolor circa umbilicum vehemens, cum meteorismo, pyrexia acuta, ileo, vel dysenteria.

106 G. XVI. EPIPLOITIS.

Dolor circa hypocastrium. & umbilicum juxta epiploi extensionem.

107 G. XVII. METRITIS.

Dolor & tumor in regione & extensione uteri ac lumbis & inguinibus cum febre.

108 G. XVIII. CYSTITIS.

Dolor, tumor, tensio hypogastrii, cum dysuria, vel ischuria.

O. III. PARENCHYMATOSÆ.

Dolor obtusus, calor & tumor in visceribus farctis, non sacciformibus cum pyrexia acuta, suppurationis apparatu.

109 G. XIX. CEPHALITIS.

Febris acuta cum delirio somnolento, & carphologia.

110 G. XX. CYNANCHE.

Dolor gutturis cum dyspnœa strangulante, dysphagia, & pyrexia acuta.

111 G. XXI. CARDITIS.

Dolor sub sterno, pulsus inæqualis, frequens, palpitatio, & cardialgia, cordis anxietas.

G. XXII.

G. XXII. PERIPNEUMONIA. 112

Pyrexia acuta, dyſpnœa gravis, gravativus pectoris dolor, tuſſis cruenta, pulſus mollis.

G. XXIII. HEPATITIS, *Galeni*. I. Epid. Comm. 3. 113

Dolor, tenſio, calor in regione hepatis, cum pondere, tuſſi ſicca, reſpiratione difficili.

G. XXIV. SPLENITIS. 114

Dolor, tumor in regione lienis, tactum vix tolerans, cum febre ut plurimum remittente.

G. XXV. NEPHRITIS. 115

Dolor acutus in regione renum juxta ureteres in veſicam directus, cum febre acuta, dyſuria, iſchuriave, &c.

CL. IV. SPASMI.

Contractio invita, conſtans vel interpolata, muſculorum organis locomotivus, non vitalibus inſervientium.

O. I. TONICI PARTIALES.

Rigiditas & immobilitas artus vel organi determinati.

G. I. STRABISMUS. 116

Oculi ſpaſmus axium opticorum divergentiam inferens.

G. II. TRISMUS. 117

Maxillæ inferioris ſpaſmus, tonicus, vel clonicus.

G. III. OBSTIPITAS. 118

Colli ſpasmus tonicus, capitis nativam mobilitatem & directionem mutans.

G. IV. CONTRACTURA. 119

Artus cujuſdam, ut brachii, vel cruris, conſtans, diuturna, rigiditas ſenſim exorta.

120 G. V. CRAMPUS.

Subitanea, fugax, dolorifica musculi rigiditas.

121 G. VI. PRIAPISMUS.

Penis injucunda rigiditas.

O. II. TONICI GENERALES.

Rigiditas totius fere corporis.

122 G. VII. TETANUS.

Spasmus generalis subito ortus cum dyspnoea.

123 G. VIII. CATOCHUS.

Spasmus generalis sensim factus sine dyspnœa.

O. III. CLONICI PARTIALES.

Agitatio invita & coacta cujusdam organi, vel artus, cujus motivum non percipitur.

124 G. IX. NYSTAGMUS.

Spasmus clonicus oculi, palpebræve.

125 G. X. CARPHOLOGIA.

Motus velut convulsivus manuum, quo ægri floccos e vestibus evellere, paleas colligere, muscas venari, &c. videntur.

126 G. XI. PANDICULATIO.

Distensio semivoluntaria plurium vel omnium successive membrorum, ut plurimum cum oscitatione.

127 G. XII. APOMYTTOSIS.

Succussio cutis & capitis tremula, violenta, cum expiratione sonora, quasi stertorosa.

128 G. XIII. CONVULSIO.

Agitatio invita artus vel musculi brevis & superstite in paroxysmis animæ functionum exercitio.

G. XIV. TREMOR. 129

Artus alterna per itus & reditus frequentes motitatio cum movendi facultate concurrens.

G. XV. PALPITATIO. 130

Pulsatio in regione cordis pulsui arteriarum numero, minime vero intensitate, respondens.

G. XVI. CLAUDICATIO. 131

Inter gradiendum cruris motus, quo centrum gravitatis trunci sensibiliter, dextrorsum vel sinistrorsum transfertur.

O. IV. CLONICI GENERALES.

Spasmi clonici vel totius corporis, vel ad plures partes extensi.

G. XVII. RIGOR. 132

Totius cutis succussio frigorifera.

G. XVIII. ECLAMPSIA. 133

Artuum vel musculorum plurimorum spasmus clonicus acutus, cum sensuum obscuratione.

G. XIX EPILEPSIA. 134

Spasmus clonicus, periodicus, chronicus artuum, cum sensuum obscuratione.

G. XX. HYSTERIA. 135

Artuum, organorumque etiam internorum spasmus clonicus, tonicusve, paroxysmis fugacibus leviter variantibus, cum mortis formidine intensissima.

G. XXI. SCELOTYRBE. 136

Motus semivoluntarius vel unius lateris, vel totius corporis, inter gradiendum, gesticulationem, aut ridiculam histrionis festinationem referens.

G. XXII. BERIBERIA. 137

Motus gradientium genua retrahens cum tremore, formicationis sensu, vocis raucedine, Indis familiaris.

CL. V. ANHELATIONES.

Agitatio invita, defatigans, musculorum pectoris, unde respiratio difficilis, frequens, sine febre acuta.

O. I. SPASMODICÆ.

Insultus fugaces, sed sæpius iterati spasmodicorum motuum pectoris cum expiratione sonora.

138 G. I. EPHIALTES.

Anhelatio difficilis, querula, cum insomnio terrifico.

139 G. II. STERNUTATIO.

Concussio violenta pectoris, cum exspiratione veloci narium interiora everrente & sonora.

140 G. III. OSCEDO.

Diutina lenta profunda inspiratio, ore hiante, sæpius cum pandiculatione.

141 G. IV. SINGULTUS.

Concussio diaphragmatis cum inspiratione subito interrupta, sonora.

142 G. V. TUSSIS.

Concussio sonora, violenta pectoris cum expiratione ad pulmonem a quodam obice liberandum.

O. II. OPPRESSIVÆ.

Non fugaces, sed constantes respirandi difficultates, cum pectoris non raro oppressione, frequenti anhelitu, difficultate illius suspendendi, sine metu suffocationis.

143 G. VI. STERTOR.

Respiratio inter inspirandum, sonum gravem, tremulum, in gutture edens, sæpe cum alterno sibilo.

G. VII.

G. VII. DYSPNOEA. 144

Difficultas respirandi chronica, non intermittens, sine signis hydrothoracis vel empyematis.

G. VIII. ASTHMA. 145

Difficultas respirandi periodi recurrens, chronica.

G. IX. ORTHOPNOEA. 146

Præceps ut plurimum & acuta respirandi difficultas.

G. X. ANGINA. 147

Difficultas respirandi, cum sensu obicis in gutture, & sæpe deglutitione difficili, sine phlegmasia.

G. XI. PLEURODYNE. 148

Pectoris, laterisve dolor pungitivus cum respirandi difficultate citra phlegmasiam acutam.

G. XII. RHEUMA. 149

Difficultas respirandi cum sensu gravitatis in pectore, quam comitantur vel præcedunt coryza, sternutatio, raucedo, &c.

G. XIII. HYDROTHORAX. 150

Difficultas respirandi decubitu horizontali aucta, cum faciei pallore, manuum & pedum œdemate, symptomatibus ephialticis, alterutrius brachii stupore & ægritudine chronica non remittente.

G. XIV. EMPYEMA. 151

Symptomata hydrothoracis, prægressa pulmonis inflammatione suppurata & comitante febre hectica.

CL. VI. DEBILITATES.

Impotentia clare ac distincte sentiendi, appetendi, consueta vi artus organave movendi, nec non imaginandi, vigilandi, &c.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.

Impotentia clare ac distincte sentiendi sine sopore.

152 G. I. CATARACTA.

Visus debilitas ob maculam opacam pone pupillam.

153 G. II. CALIGO.

Visus debilitas obicibus opacis citra pupillam positis.

154 G. III. AMBLYOPIA.

Visus debilitas respective ad situm, gradum lucis, distantiam objecti, oculis pellucidis.

155 G. IV. AMAUROSIS.

Visus debilitas absoluta sine ulla organorum opacitate inassueta.

156 G. V. ANOSMIA.

Odoratus debilitas aut olfaciendi impotentia.

157 G. VI. AGHEUSTIA.

Gustus debilitas aut gustandi impotentia.

158 G. VII. DYSECÆA.

Auditus debilitas obicibus extra labyrinthum positis.

159 G. VIII. PARACUSIS.

Voces articulatas distincte audiendi difficultas vel impotentia.

160 G. IX. COPHSOIS.

Sonos etiam simplices percipiendi vel audiendi difficul-

ficultas vel impotentia, obice intra vel ultra labyrinthum posito.

G. X. ANÆSTHESIA. 161

Tactus in toto corpore debilitas vel obscuritas sine stupore & sopore.

O. II. ANEPITHYMIÆ.

Appetituum sensitivorum debilitas notabilis, vel suppressio insolita sine sopore.

G. XI. ANOREXIA. 162

Appetitus esculentorum suppressio, seu famis feriario.

G. XII. ADIPSIA. 163

Appetitus potulentorum suppressio seu sitis feriatio.

G. XIII. ANAPHRODISIA. 164

Appetitus venereorum, seu libidinis suppressio.

O. III. DYSCINESIÆ.

Impotentia motus ac sæpe sensus in organis libertati subditis, ut lingua, larynge, artubus.

G. XIV. MUTITAS. 165

Voces articulatas edendi impotentia.

G. XV. APHONIA. 166

Plenaria vocis suppressio, citra stuporem & syncopem.

G. XVI. PSELLISMUS. 167

Quasdam syllabas literasve pronunciandi impotentia.

G. XVII. PARAPHONIA. 168

Vocem solitam edendi impotentia.

G. XVIII. PARALYSIS. 169

Motus aut tactus, vel utriusque in uno tantum artu debilitas.

170 G. XIX HEMIPLEGIA.

Debilitas motus aut tactus vel utriusque in alterutro corporis latere.

171 G. XX. PARAPLEXIA.

Debilitas sensus & motus in dimidio corporis transversim sumpti.

O. IV. LEIPOPSYCHIÆ.

Motuum, viriumque vitalium debilitas.

172 G. XXI. ASTHENIA.

Totius corporis gradaria seu successiva debilitas sensubus integris.

173 G. XXII. LEIPOTHYMIA.

Virium muscularium totius corporis subitanea imminutio, pulsu superstite.

174 G. XXIII. SYNCOPE.

Motuum vitalium subitanea debilitas cum frigore, pallore, sensuumque obscuratione.

175 G. XXIV. ASPHYXIA.

Omnium motuum & sensuum apparens cessatio mortem fere referens.

O. V. COMATA.

Sensus omnis, appetitus, motus liberi, phantasiæ, memoriæque feriationes.

176 G. XXV. CATALEPSIS.

Status soporosus cum artuum flexilitate & ad quosvis novos situs retinendos aptitudine.

177 G. XXVI. ECSTASIS.

Status soporosus a gravi pathemate subito ortus, ægrum in eodem situ quo prehensus est retinens, sine aptitudine cataleptica.

G. XXVII.

G. XXVII. TYPHOMANIA. 178

Apparens sopor cum pervigilio reali, vel sopor levis, e quo ægri facile excitantur, cum delirio comitante.

G. XXVIII. LETHARGUS. 179

Status soporosus facile excitabilis cum summo imaginationis & memoriæ torpore ac febre.

G. XXIX. CATAPHORA. 180

Status somnolentus facile excitabilis sine febre, delirio, & oblivione.

G. XXX. CARUS. 181

Sopor profundus sine stertore.

G. XXXI. APOPLEXIA. 182

Sopor profundissimus cum stertore vel sonora respiratione.

CL. VII. DOLORES.

Cujusvis experientia cognoscendi, nulla definitione distincte explicabiles sunt.

O. I. VAGI.

Dolores & molestiæ vagæ sæpius universales aut cutaneæ ad phlegmasias non referendæ.

G. I. ARTHRITIS. 183

Articulorum dolor spontaneus periodicus.

G. II OSTOCOPUS, *Gorræi* definit. 184

Ossium dolor non erraticus & internus in artubus.

G. III. RHEUMATISMUS. 185

Dolor diuturnus in parte carnosa artuum.

186 G. IV. CATARRHUS.

Collo vicinarum partium dolor a frigore ſuſcepto, cum tuſſi, coryza, &c.

187 G. V. ANXIETAS.

Moleſtia quæ ad continuam loci mutationem cogit.

188 G. VI LASSITUDO.

Moleſtia cum debilitate quæ ad quietem invitat.

189 G. VII. STUPOR.

Moleſtia quæ ſenſum tactus obſcurat.

190 G. VIII. PRURITUS.

Moleſtia quæ ad ſcalpendum nos cogit.

191 G. IX. ALGOR.

Moleſtia qualis a ſummo aeris frigore excitatur.

192 G. X. ARDOR.

Moleſtia qualis a ſummo aeris calore producitur.

O. II. DOLORES CAPITIS.

Scilicet vel capillitii vel faciei.

193 G. XI. CEPHALALGIA.

Gravativus capitis dolor.

194 G. XII. CEPHALÆA.

Periodicus, diuturnus tenſivus capitis dolor.

195 G. XIII. HEMICRANIA.

Dolor alterutrius lateris frontis.

196 G. XIV. OPHTHALMIA.

Dolor oculi cum rubore, lucis intolerantia & lachrymatione.

197 G. XV. OTALGIA.

Dolor aurium.

198 G. XVI. ODONTALGIA.

Dolor maxillarum dentiumve.

O. III. DOLORES PECTORIS.

Dolores cordis & œsophagi, anhelationis expertes.

G. XVII. DYSPHAGIA. 199

Molestia deglutitionem impediens sine notabili respirationis læsione.

G. XVIII. PYROSIS. 200

Sensus ardoris in ventriculo & æsophago sine febre acuta.

G. XIX. CARDIOGMUS. 201

Gravis pertinaxque molestia in præcordiis, cum sensu ponderis & magnæ molis pulsantis a minimo motu increscens.

O. IV. DOLORES abdominales Interni.

G. XX. CARDIALGIA. 202

Molestia in stomacho syncopem minitans.

G. XXI. GASTRODYNIA. 203

Quicumque dolor notabilis & constans in regione stomachi, qui continua animi defectione non stipatur cardialgia, nec pyrexia ut gastritis.

G. XXII. COLICA. 204

Dolor intestinorum.

G. XXIII. HEPATALGIA. 205

Molesta sensatio, gravativa, tensiva, aut alia quævis in regione hepatis, sine pyrexia acuta.

G. XXIV. SPLENALGIA. 206

Dolor aut molestia in regione lienis sine pyrexia acuta.

G. XXV. NEPHRALGIA *Zuvingeri*. 207

Dolor lumbi alterutrius ureteris ductum sequens, cum nausea, testis retractione in viris, cruris stupore in fœminis, &c.

G. XXVI.

208 G. XXVI. DYSTOCIA.

Dolor uterinus in gravidis cum conatibus parturitionis.

209 G. XXVII. HYSTERALGIA *Montalti*.

Dolor uteri ſine niſu parturitionis.

O. V. DOLORES Externi & Artuum.

210 G. XXVIII. MASTODYNIA.

Dolor mammarum.

211 G. XXIX. RACHIALGIA *Aſtrucii*.

Dolor abdominis & ſpinæ dorſi in brachiorum paralyſin aut convulſiones deſinens.

212 G. XXX. LUMBAGO.

Dolor lumborum corporis erectionem impediens.

213 G. XXXI. ISCHIAS.

Pelvis & coxendicis dolor claudicationem ſæpius inducens.

214 G. XXXII. PROCTALGIA.

Dolor podicis citra teneſmum.

215 G. XXXIII. PUDENDAGRA.

Dolor genitalium citra dyſuriam.

CL. VIII. VESANIÆ.

Error in imaginatione, appetitu, vel judicio.

O. I. HALLUCINATIONES.

Errores imaginationis ſalvo intellectu ab organorum externorum vitio.

216 G. I. VERTIGO.

Objecta licet quieſcentia e loco moveri vel in gyrum

rum versari nobis videntur. Ipse æger sibi quandoque nutare videtur.

217 G. II. SUFFUSIO.

Objectorum, quæ non sunt, imaginaria visio.

218 G. III DIPLOPIA.

Objectum duplicatum vel multiplicatum, apparet.

219. G. IV. SYRIGMOS.

Auditio imaginaria soni, cujus nullum est extra aures principium.

220 G. V. HYPOCHONDRIASIS.

Morbus diuturnus quo affectus se in mortis periculo versari ex ructu, palpitatione, aliisque levidensibus malis, imaginatur.

221 G. VI. SOMNAMBULISMUS.

Somniantes e lecto surgunt, vigilantium munia exsequuntur, & se sæpe diversis periculis exponunt.

O. II. MOROSITATES.

Cupiditates aut aversationes depravatæ.

222 G. VII. PICA.

Alimentorum consuetorum aversatio, cum inassuetorum, sanisque insalubrium, appetitu.

223 G. VIII. BULIMIA.

Appetitus esculentorum copiæ majoris quam quæ digeri possit.

224 G. IX. POLYDIPSIA.

Appetitus majoris solito copiæ potulentorum.

225 G. X. ANTIPATHIA.

Quorundam objectorum tanta aversatio ut ex eorum visu, vel olfactu æger gravia symptomata patiatur.

226 G. XI. NOSTALGIA.

Parentum patriæve tanta cupiditas, ut hac non expleta æger gravi morbo decumbat.

G. XII.

227 G. XII. PANOPHOBIA.

Summus pavor inter dormiendum ſine cauſa evidenti.

228 G. XIII. SATYRIASIS.

Effrænis, impudenſque veneris cupiditas cum libidinoſa penis tentigine.

229 G. XIV. NYMPHOMANIA.

In fœminis effræne veneris deſiderium.

230. G. XV. TARANTISMUS.

Effrænis choreas agendi, vel ſaltandi cupiditas.

231 G. XVI. HYDROPHOBIA.

Effrænis potulentorum averſatio, ſæpius a morſu animalis rabidi.

O. III. DELIRIA.

Errores mentis judicantis.

232 G. XVII. PARAPHROSYNE.

Delirium fugax, a veneno, aut altero morbo dependens.

233 G. XVIII. AMENTIA.

Delirium univerſale mite, ſine furore & audacia, cum morbo diuturno.

234 G. XIX. MELANCHOLIA.

Delirium particulare, mite, cum mœrore, ac morbo diuturno.

235. G. XX. MANIA.

Delirium univerſale cum furore, vel audacia & morbo diuturno.

236 G. XXI. DÆMONOMANIA.

Delirium melancholicum, quod vulgo diaboli potentiæ tribuitur.

O. IV. VESANIÆ ANOMALÆ.

Morbi prioribus affines.

G. XXII. AMNESIA. 237

Omnis memoriæ feriatio.

G. XXIII. AGRYPNIA. 238

Pervigilium continuum immodicumve.

CL. IX. FLUXUS.

Ejectio fluidorum aut contentorum, quæ quantitate, qualitate, desuetudine notabilis est.

O. I. SANGUIFLUXUS.

Sanguinis vel sanguinolentæ materiæ ejectio sine alvi fluxu.

G. I. HÆMORRHAGIA. 239

Fluxus sanguinis e naribus.

G. II. HÆMOPTYSIS. 240

Sanguinis expectoratio cum tussi sine pyrexia acuta.

G. III. STOMACACE. 241

Fluxus sanguinis e gingivis sæpius fœtidis putridisve.

G. IV. HÆMATEMESIS. 242

Sanguinis rejectio ex œsophago cum vomitorio conatu.

G. V. HÆMATURIA. 243

Sanguinis fluidive rubri per vias urinarias emissio.

G. VI. MENORRHAGIA. 244

Sanguinis per uterum aut vaginam fluxus vitiosus.

G. VII. ABORTUS. 245

Fœtus immaturi, sæpius cum menorrhagia ex utero exclusio.

O. II. ALVIFLUXUS.

Materierum in primis viis contentarum vitiosa per os aut anum rejectio.

I. *Alvifluxus sanguinolenti.*

246 G. VIII. HEPATIRRHOEA.

Alvifluxus per inferiora seroso-cruentus nec ater nec torminosus.

247 G. IX. HÆMORRHOIS.

Fluxus cruentus, ex podice, vel recto mariscis ruptis obsito.

248 G. X. DYSENTERIA.

Frequens torminosa, sæpe tenesmodes, fœcum cruentarum per inferiora dejectio.

249 G. XI. MELÆNA.

Fluidi atri per superiora, vel inferiora frequens rejectio.

II. *Alvifluxus non sanguinolenti.*

250 G. XII. NAUSEA.

Inanis vomendi conatus, & flatus tantum per os emissio; affinis est aeri fluxibus.

251 G. XIII. VOMITUS.

Palpabilium materierum, non cruentarum, facta per os, œsophagumque rejectio frequens.

252 G. XIV. ILEUS.

Atrox circa epigastrium dolor, seu gastrodynia, alvi constipatio, & fœculentæ demum materiæ vomitio.

253 G. XV. CHOLERA.

Vomitio biliosa aut acris assidua & diarrhoea violenta cum dolore abdominis, virium prostratione, & non raro surarum crampis.

254 G. XVI. DIARRHOEA.

Excrementitiorum humorum frequens, vel intempestivo dejecto.

G. XVII. COELIACA. 255

Albescentium, aut chilacearum materierum dejectio.

G. XVIII. LIENTERIA. 256

Celeris statim a pastu facta ingestorum, vix mutatorum dejectio.

G. XIX. TENESMUS. 257

Muci pauci frequens dejectio cum intensa dejiciendi cupiditate, & assiduo conatu.

O. III. SERIFUXUS.

Fluxus quivis nec cruentus nec alvinus.

G. XX. EPHIDROSS *Hippocratis*. 258

Sudoris quantitate, qualitate, intempestivitate peccantis effluxus.

G. XXI. EPIPHORA. 259

Vitiosus ex oculis humoris lachrymalis, sebacei, vel purulenti effluxus.

G. XXII. CORYZA, *Hippoc. Gorræi*. Def. Med. 260

Humoris serosi, mucosive e naribus effluxus sine ozæna, sæpius cum gravedine.

G. XXIII. PTYALISMUS. 261

Salivæ vel muci sine expectoratione ac vomitione ex ore effluxus, aut emissio.

G. XXIV. ANACATHARSIS, *Hippocr. Galen.* in Aph. 8. lib. 5. 262

Muci, lymphæ, vel cujuscumque humoris facta cum tussi expectoratio constans & notabilis.

G. XXV. DIABETES. 263

Subito post pastum potulentorum cum magna siti per urinæ vias emissio.

G. XXVI. ENURESIS. 264

Involuntaria, doloris & ardoris expers, mictio.

265 G. XXVII. DYSURIA.

Difficilis & dolorifica, ſæpius ardens, urinæ emiſſio.

266 G. XXVIII. PYURIA.

Purulentæ, albeſcentis, aut viſcido-mucoſæ materiei mictio.

267 G. XXIX. LEUCORRHOEA, *Caſtell.* Lex *Bonet.* Anat. Pr. Lib. 3.

Seroſo-flavæ, vel puriformis materiæ ex utero delapſus.

268 G. XXX. GONORRHOEA.

Stillicidium fluidi ſeminalis ex urethra, aut ex vagina.

269 G. XXXI. DYSPERMATISMUS, *D. Cuſſon.*

Seminis in actu venerea ſtillatitia, tarda, impedita, & ad generationem inſufficiens emiſſio.

270 G. XXXII. GALACTIRRHOEA.

Stillicidium lactis ex mammis.

271 G. XXXIII. OTORRHOEA. *Linn.* gen.

Fluxus ex auris cavo, ambitu, aut parte poſtica.

O. IV. AERIFLUXUS.

Flatus, halituſve vitioſa emiſſio.

272 XXXIV. FLATULENTIA.

Flatuum ex primis viis per ſuperiora aut inferiora frequens rejectio borborygmis ſtipata.

273 G. XXXV. ÆDOPSOPHIA.

Flatuum per urethram, vaginam vel uterum emiſſio.

774 G. XXXVI. DYSODIA.

Miaſmatum fœtidorum exhalatio.

CL. X. CACHEXIÆ.

Coloris, figuræ, molis in corporis habitu depravatio.

O. I. MACIES.

Corporis partium mollium extenuatio.

G. I. TABES. 275

Macies cum amphimerina lenta sine tussi.

G. II. PHTHISIS, *Græc.* 276

Corporis emaciatio cum amphimerina lenta, tussi, dyspnœa, & ut plurimum puris sputo.

G. III. ATROPHIA. 277

Macies sine febre.

G. IV. ARIDURA, *Etmulleri.* 278

Macies unius tantum partis.

O. II. INTUMESCENTIÆ.

Deformitas a volumine adaucto.

G. V. POLYSARCIA. 279

Intumescentia universalis ab adipe molesta & corporis agilitatem minuens.

G. VI. PNEUMATOSIS. 280

Elastica & flatulenta cutis intumescentia.

G. VII. ANASARCA. 281

Cutis totius intumescentia, mollis, pallida, non elastica.

G. VIII. PHLEGMATIA. 282

Artuum inferiorum turgescentia mollis, non elastica, cuti concolor, indolens.

G. IX. PHYSCONIA. 283

Intumescentia abdominis a partibus solidis sine gravitate & fluctuatione.

284 G. X. GRAVIDITAS.

Intumescentia abdominis ab hypogastrio incipiens, opus generationis subsequens & partu terminanda.

O. III. HYDROPES PARTIALES.

Tumores majores sed non universales, a fluido intra cavum capitis, abdominis, uteri vel vesicæ contento.

285 G. XI. HYDROCEPHALUS.

Tumor capitis, facie sæpius excepta, mollis aut elasticus, a fluidi intra ipsum congestione.

286 G. XII. PHYSOCEPHALUS.

Tumor totius capitis tensus elasticus sub digito crepitans.

287 G. XIII. HYDRORACHITIS, *Morgagni*.

Tumor cysticus sero turgidus ex hiatu vertebrarum lumbarium in recens natis protuberans cum anæsthesia.

288 G. XIV. ASCITES.

Hydrops totius abdominis a fluido non elastico, seu gravis & fluctuosus.

289 G. XV. HYDROMETRA.

Hypogastrii in mulieribus successive crescens tumor, uteri figuram referens, pressioni cedens, fluctuansve, ab ischuria & graviditate diversus.

290 G. XVI. PHYSOMETRA.

Constans, permanensque tumor levis, elasticus, uteri figuram, & sedem referens in mulierum hypogastrio.

291 G. XVII. *TYMPANITES.*

Hydrops totius abdominis a flatu, seu elasticus & levis.

G. XVIII. METEORISMUS. 292

Inflatio flatulenta, vel epigastrii, vel in morbo acuto ipsius abdominis.

G. XIX. ISCHURIA. 293

Tumor hypogastrii ex urinæ retentione sæpius intra vesicam.

Species sunt.

Ischuriæ renales.

Ischuria (*Nephritica*) a renum inflammatione, S. sp. 1. *Schacht*. Institut. med. pract. lib. VIII. cap. I. & VIII. *Gort*. Syst. prax. med. de ischur. *Fabric. Hildan*. de lithot. cap. IV. *Leal. a Fonte*, Cons. 59. *Bonet*. Sepulchr. lib. III. sect. XXIV. obs. IV. §. 3. *Schenck*. lib. III. de ischur. fals. cap. IV. & V. *Etmuller* Coll. pract. pag. 994.

Ischuria (*Nephrolithica*) a renum calculo, S. sp. 2. *Schacht*. lib. citat. cap. II. & VIII. *Gort*. lib. citat. de morb. renum. *Car. Pison*. de morb. a colluv. seros. *Schenck*. de ischur. *Bonet*. Sepulchr. de urin. suppress. & Medic. septentrional. de ischur.

Ischuria (*Nephroplethorica*) renalis a plethora, S. sp. 3. *River*. Cent. I. obs. 1. & 89. *Etmull. Schacht*. loco citat. *Gaub*. Pathol. de vit. mict. *Ludvvig*. Instit. med. clin. *Seb. Nasii* Specul. method. med. pag. 167.

Ischuria (*Lunatica*) renalis lunatica, S. sp. 4. *Tulp*. Obs. med. lib. II. cap. 49.

Ischuria (*Nephrospastica*) renalis spasmodica. S. sp. 5. *Schacht. Gort*. lib. citat. *Sydenh*. Differ. epist. tom. 1. *Raulin* des malad. vapor. Mém. de l'Acad. R. des sc. ann. 1715.

Ischuria (*Nephrelmintica*) renalis verminosa, S. sp. 6. *Gort*. lib. citat. *Gaub*. Pathol. de vit. mict.

Ischuria (*Neprothromboides*) renalis a sanguine congrumato, S. sp. 7. *Mercat*. de morb. intern. cur. cap. 12. *Etmull*. de laes. urin. secret. pag. 314. *Fernel*. Pathol. lib. VI. c. 13. *Gort. Gaub*. loc. cit.

Ischuria (*Nephropyica*) a renum purulentia. S. sp. 8. *Schenck*. lib. III. de ren. tumorib. *Gort. Gaub*. loc. citat. *Bonet*. Sepulchr. de urin. suppress. *Sal. Divers*. de affect. particularib. cap. 14.

Iſchuria (*Nephrophlegmatica*) renalis pituitoſa ſeu mucoſa, S. ſp. 9. *Sal. Diverſ.* loc. citat. *Graſii* Ephem. natur. cur. an. III. obſ. 212. *Schacht. Gort. Gaub. Mercat.* loc. citat. *Varand.* de ren. affect. *Bonet.* Sepulchr. de iſchur. obſ. IV. V.

Iſchuria (*Nephroplegica*) renalis paralytodea, S. ſp. 10. *Sal. Diverſ. Mercat.* loc. citat. *Horſt.* tom. II. lib. IV. obſ. 49. *Marcel. Donat.* Hiſtor. med. mirab. lib. IV. cap. 28. *Barthol.* Cent. IV. epiſt. 18. 38. 39. *Hoechſtet.* Obſ. Dec. V. caſ. 20. *Claud.* Chaptal. pract. Monſpel.

Iſchuria (*Suppleta*) renalis ab alia evacuatione ſuppleta, S. ſp. 11.

a. A diarrhœa & ſudore, *Marcel. Donat.* Hiſt. med. mirab. lib. IV. c. 27. *Schenck.* lib. III. de diabete, obſ. 9.

b. Ab. otorrhagia, *Sennert.* ex plat. pract. lib. III. part. VIII. Sect. II. cap. 9.

c. A perſpiratione, *Vandermond.* Journ. de med. tom. IV.

d. A ſudore, *Vandermond.* Journ. de med. tom. X.

2. Iſchuriæ uretericæ.

Iſchuria (*Ureteritica*) ureteritica inflammatoria, S. ſp. 12. *Sal. Diverſ.* loc. citat. *Ludvvig.* Inſtit. clin. *Gaub.* Pathol. de vit. mict. *Schacht.* Inſtit. pract. de iſchur. ſpur.

Iſchuria (*Ureterolithica*). Iſchuria ureterica calculoſa, S. ſp. 13. *Tulp.* Obſ. med. lib. II. cap. 45. *Monro* Eſſais d' Edinb. tom. VI. art. 68. *Bonet.* Sepulchr. lib. III. de urin. ſuppreſſ. *Schenck.* lib. III. de ureterib. *Sal. Diverſ.* loc. citat.

Iſchuria (*Uretero-thromboides*) Iſchuria ureterica, a ſanguinis grumo, S. ſp. 14. *Sal. Diverſ. Schacht. Gaub.* loc. cit. *Bonet.* Sepulchr. de urin. ſuppreſſ. obſ. I.

Iſchuria (*Uretero-phlegmatica*) ureterica a pituita, S. ſp. 15. *Gort.* Prax. med. ſyſt. *Schacht. Sal. Diverſ.* loc. citat. *Bonet.* Sepulchr. de urin. ſuppreſſ. *Sebaſt. Naſ.* Spec. meth. med. loc. citat. *Epiphan. Ferdinand.* hiſt. 97.

Iſchuria (*Ureteropyica*) ureterica purulenta, S. ſp. 16. *Gort.* lib. cit. de ureter. morb. *Schacht. Sal.* loc. cit.

Iſchuria (*Ureteroſtomatica*) ab orificii ureterum inte-

ferioris clausura, *Theod. Eller.* Miscell. Berolin, Tom. IV. pag. 381. *Verdier* ex noel. Mém. de l' Acad. de chirurg. tom. II. obs. 17. *Lieutaud.* Mém. de l'Acad. R. des sc. ann. 1753. *Franc. Syl. Deleboe* Prax. med. lib. II. *Saltzmann.* Obs. anat. pag. 62.

3. Ischuriæ vesicales.

Ischuria (*Cystitica*) a vesicæ inflammatione, S. sp. 18. *Schacht.* Instit. practic. Mém. de l'Acad. R. des sc. ann. 1704. 1753. *Boneti* Sepulchr. lib. III. de urin. suppress. *Forest.* lib. XXV. observ. 27. 28. *Zacuti Lusitani ex Galeno*, Hist. med. princ. lib. II. Hist. 150.

Ischuria (*Cystolithica*) a vesicæ calculo, S. sp. 19. *Tulpii* Observ. med. lib. IV. cap. 37. Essais d' Edinburg, tom. IV. *Foresti* lib. XXV. obs. 23. *Fabric. Hildani*, Cent. III. observ. 67. *Car. Pisonis* de morb. a colluv. seros. *Boneti* Sepulchret. de urin. suppress. observ. X. &c.

Ischuria (*Cystospastica*) a sphincteris vesicæ spasmo, S. sp. 20. *Mercati* de morb. intern. cur. lib. IV. cap. 22. *Sebast. Nasii* Specul. method. med. part. II. pag. 267. *Nenteri* de ischur. *Schachtii*, *Gorterii*, *Gaubii*, *Varendæi*, loc. citat.

Ischuria (*Cystoplegica*) a vesicæ paralysi, S. sp. 21, *Lieutaud.* Compend. medic. de ischur. *Zacut. Lusitan.* ex *Galeno* Hist. princ. hist. 140. *Mangeti* Biblioth. medic. pract. tom. IV. *Serane* Thes. pro Reg. Cathedr. *Hollerii* de morb. intern. cap. 47. *Amat. Lusitan.* Cent. IV. cur. 10. *Pringle* Essais d' Edinburg. tom. I. artic. 23.

Ischuria (*Polyurica*) a vesica lotio diutius cohibito distenta, S. sp. 22. *Halleri* Prælect. in *Boerhaave*, tom. II. §. 384. pag. 336. *Forest.* lib. XXV. observ. 14. *Nenter.* de ischuria. *Paræi* lib. XVI. cap. 48. *Sennert.* Pract. lib. III. part. VIII. sect. 1. cap. 4. *Etmulleri*, *Riverii*, *Varandæi* de ischur. &c.

Ischuria (*Cystopyica*) vesicalis purulenta *Felic. Plateri Mantis.* Obs. 29. *Camerar.* Ephem. natur. curios. tom. II. *Zacuti Lusitani* ex *Galeno*, Hist. medic. princip. hist. 148. *Hollerii* de morb. intern. cap. 47. *Sebast. Nasii* Specul. method. med. part. 11. pag. 167. *Andre* des maladies de l'urethre, observ. 16. *Vandermonde* Journ. de med. tom. IX.

Ischuria (*Cystothromboides*) vesicalis a sanguinis

grumo, S. ſp. 24. *Claudini* conſult. 141. *Fabric. Hildani* Cent. III. obſerv. 66. *Foreſti* lib. XXV. obſ. 20. *Zacuti Luſitani* ex *Galeno* Hiſt. med. princip. hiſt. 145. & ejuſdem Prax. med. admirab. lib. II. cap. 65. *Mercati* de morb. intern. cur. cap. 12.

Iſchuria (*Cyſtophlegmatica*) veſicalis a muco, S. ſp. 25. *Mercati* loc. citat. *Schacht.* Inſtit. medic. pract. lib. VIII. cap. 9. *Etmulleri* de iſchur. veſical. *Amati Luſitani*. Cent. VI. cur. 12. *Zacuti Luſitani*, Prax. med. admirab. lib. II. obſerv. 64. *Boneti* ex *Thom. Bartholin.* de urin. ſuppreſſ. obſerv. 17.

Iſchuria (*Ectopocyſtica*) a veſicæ ectopia, S. ſp. 16.
a. Hernioſa, ſeu a cyſtocele. *Verdier* Mém. de l' Acad. de Chirurg. tom. II. obſerv. 4. 6. 9. 10. 14. *Felic. Plater.* obſerv. pag. 830.
b. Proptoica, ſeu ab exocyſte, *Verdier* ex Noel. lib. citat. obſ. 17.

Iſchuria (*Cyſtoproctica*) veſicalis, ab inteſtino recto, ſcybalis, calculo, flatibus, inflammatione, abſceſſu, hæmorrhoidibus turgente. *Dodonæi* Obſerv. medic. cap. 47. *Schenck.* lib. III. de iſchur. obſerv. 6. *VVepferi* Diſſert. de apopl. pag. 391. *Vandermonde* Journ. de med. tom. IX. pag. 261. *Boneti* Sepulchret. de urin. ſuppreſſ. obſerv. 18. §. 4. *Schacht. Gaubii*. loc. citat.

Iſchuria (*Hyſterocyſtica*) veſicalis ab utero, S. ſp. 28.
a. Gravido, *Nordman.* Diſſert. de iſchur. gravidar. *Mauriceau*, lib. I. c. XV. *Roderici a caſtro*, lib. II. cap. XV.
b. Parturiente, *Boneti* ex *Riolani* de urin. ſuppreſſ. *Vandermonde* ex *Daran.* Journ. de med. tom. V.
c. Hydropico, *Hippocrat.* de morb. mulier. lib. 12. *Sennerti* Pract. lib. IV. part. I. ſect. II. c. X. XI. *Schenck.* lib. IV. de mol. falſ. *Schacht. Gaubii*, l. cit.
d. Tumoribus diſtento, *Gaubii*, *Schachtii*, loc. cit. *Sennerti* ibidem, ac ſupra, cap. XIII. *Knoeffelii*, E. N. C. ann. IV.
e. Prociduo, *Nordmann.* Diſſert. citata. *Sabatier* Mém. de l' Acad. de Chirurg. tom. III. *Sennerti* ibid. ac ſupra cap. XVI.

Iſchuria (*Atretarum*) urethrocyſtica a menſtruis in vagina retentis, S. ſp. 29. *Amyand* Tranſact. philoſ. ann. 1732. No. 442. art. 3. pag. 45. *Schenck.* lib. IV. de part. genit. mulier. obſerv. 9. *Heiſter.* Chirurg.

rurg. tom. II. pag. 951. *Astruc.* de morb. mulier. tom. I. lib. 1. cap. 5.

Ischuria paradoxa, S. sp. 30. *Morgagni* Epist. *Le Clerc.* Journ. de med. Juill. 1755. p. 11.

4. Ischuriæ urethrales.

Ischuria (*Perinæalis*) urethralis a perinæi tumore, S. sp. 31. *Galen.* lib. de affect. loc. & ex eo *Zacuti Lusitan.* Hist. 149. *Vandermond* ex *Daran.* Journ. de med. tom V. pag. 291. *Tulp.* Observ. med. lib. III. cap. X. *Forest.* lib. XXVI. obs. 2.

Ischuria (*Urethrolithica*) a calculo urethræ impacto, S. sp. 32. *Schmid.* Eph. nat. cur. decad. I. ann. VIII. obs. 89. *VVinckler.* ibid. tom. VI. observ. 34. *Zacut. Lusitan.* Prax. med. admirab. lib. II. obs. 66. 67. 68. *Tulp.* Observ. med. lib. III. cap. VIII. *Bonet.* Sepulchr. de urin. suppress. observ. 14. *Barthol.* cent. IV. epist. 5. *Heister.* Chirurg. tom. II. pag. 839.

Ischuria (*Urethrophlegmatica*) a muco urethram infarciente, S. sp. 33. *Bonet.* Sepulchr. & medic. septent. *Manget.* Biblioth. med. pract. *Amat. Lusitan.* cent. V. obs. 71. *Forest.* libr. XXV. obs. 25. *Varand.* de ischur. *Lud. Apin.* Eph. nat. cur. decad. III. ann. III. obs. 69.

Ischuria (*Urethrothromboides*) a sanguinis grumo urethram opplente, S. sp. 34. *Bonet.* Med. septentrion. de ischur. & sepulchr. de urin. suppres. obs. XI. *Forest.* lib. 25. obs. 25.

Ischuria (*Urethropyica*) a pure urethram obstruente, S. sp. 35. *Bonet.* Med. septentr. de ischur. *Forest.* Scholio modo citat. *Boerhaave* Præfat.

Ischuria (*Urethrohymenodes*) a membrana in urethram impacta, S. sp. 36. Hist. de l' Acad. R. des sc. ann. 1714. hist. pag. 22.

Ischuria (*Urethrelmintica*) urethralis verminosa, S. sp. 37. *Joan. Petr. Albreicht.* Vid. *Bonet.* Medicinam septentrionalem de urin. cap. 31. & *Manget.* Biblioth. med. pract. tom. IV. de morb. urin. spectant. *Vandermonde* Journ. de med. Septembre 1758. pag. 245. *Joan. Rhodii* Centur. 3. obs. 36. Collect. Acad. tom. 3. pag. 497. obs. 77.

Ischuria (*Urethritica*) ab urethræ inflammatione, S. sp. 38. *Hildan.* Cent. IV. obs. 54. *Forest.* de incert. urin. judiciis, lib. III. cap. 3. versus finem. *Varand.* de affectib. ren. & vesic. cap. VII. *Bonet.* Medic. septentr. de ischuria, cap. 1. No. V.

Gou-

Goulard. de malad. de l'urethre. *Heister*. Chirurg. tom. 2. pag. 838.

Ischuria (*Carunculosa*) a morbis, ut vocant, urethræ, S. sp. 39. *Amat. Lusitan.* cent. IV. cur. 19. Cent. V. cur. 48. *Sharp*. Recherches crit. c.IV. *Goulard*. des malad. de l' urethre. *Heister*. Chirurg. t. II. pag. 834. *Andre* des maladies de l' urethre, passim.

Ischuria (*Hydrocelodes*) ab urethræ ruptura in scrotum hiante, S. sp. 40. *Joan. Lud. Apin.* Miscell. nat. cur. decad. III. ann. III. obs. 68.

Ischuria (*Cryptopyica*) a penis intra corpus retractione, S. sp. 41. *Fred. Hoffm.* Consult. de morb. abdom. cas. 105.

Ischuria (*Peridesmica*) a vinculo strictiori peni injecto, S. sp. 42. *Bonet*. med. septentr. de Ischuria, cap. 1. No. VIII.

Ischuria (*Phimosica*) urethralis a phimosi, S. sp. 43. *Horst*. tom. II. lib. IV. pag. 274.; *Goulard*. de malad. de l' urethre, *Heist*. Chirurg. tom. II. pag. 818. *Bonet*. Sepulchr. de ischur. obs. XV.

Ischuria (*Aspadialis*) ab urethræ clausura, S. sp. 44. *Heister*. Chirurg. tom. II. pag. 818. & 951. *Horst*. tom. II. obs. 55. *Joan. VVieri* obs. pag. 221.; *Bonet*. Sepulchr. de urin. suppres. observ. XV. schol. & med. septentr. de ischur. cap. 2. §. VI.

O. IV. TUBERA.

Tumores partium solidarum, non hydropici.

294 G. XX. RACHITIS.

Deformitas ex articulorum tumore duro, carnium marcore, capitis mole, cum ingenio præcoci, in puerulis.

295 G. XXI SCROPULA, *J Allen*. Synopsis.

Tumor scirrhosus glandularum colli, mensen teriique, cum labiis & naso crassioribus.

296 G. XXII. CARCINOMA.

Ulcera cancrosa cum doloribus lancinantibus.

G. XXIII

G. XXIII. LEONTIASIS. 297

Papillæ ſetaceæ vel corniculatæ cutim exaſperantes.

G. XXIV. MALIS, 298

Tumores ſæpius purulenti, vel ulcera, cum inſectis vermiforibus, paſſim enata.

G. XXV. FRAMBÆSIA. 299

Excreſcentiæ fungoſæ, mori inſtar granuloſæ ſæpius cum ulceribus, &c.

O. V. IMPETIGINES.

Morbi chronici ſæpius contagioſi qui cutis excreſcentias, tumores gregales, exulcerationes, cruſtas, &c. inducunt.

XXVI. SYPHILIS. 300

Poſt impurum concubitum ulcuſcula, porri, bubones, fici primo ut plurimum in genitalibus, prægreſſa non raro gonorrhœa, dein puſtulæ cruſtoſæ, dolores nocturni, caries &c. in cæteris partibus.

G. XXVII. SCORBUTUS. 301

Stomacace cum maculis lividis, flavis, purpuroviolaceis potiſſimum tibiarum.

G. XXVIII. ELEPHANTIASIS. 302

Facies deformis tuberibus calloſis, ozæna, raucedo, cutis elephantina craſſa unctuoſa, in extremis artubus anæſtheſia.

G. XXIX LEPRA. 303

Tubercula calloſa, ſcabie majora, vel cruſtis & ſquamis diffuſa, herpetica, per cutem diſperſa, pruriginoſa.

G. XXX. SCABIES. 304

Puſtulæ cruſtoſæ, lentis magnitudine, pruriginoſæ, manus potiſſimum obſidentes.

G. XXXI.

305 G. XXXI. TINEA.

Crustæ flavæ vel griseæ, ulcerosæ, per caput dispersæ.

O. VI. ICTERITIÆ.

Totius cutis color inassuetus sine pyrexia acuta

306 G. XXXII. AURIGO.

Oculorum & cutis flavedo ad auream vel aurantiam vergens.

307 G. XXXIII. MELASICTERUS.

Cutis color niger, vel atro-lividus, atro atrofuliginosus.

308 G. XXXIV. PHOENIGMUS.

Rubor diffusus, vel maculosus sine pyrexia.

309 G. XXXV. CHLOROSIS, *Sennerti* qui falso nomen Hippocrati tribuit.

Pallor, vel fuscus color cutis, oculis minime flavis, sæpius cum pica.

O. VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

Signa classeos & affinitas cum prioribus ordinibus,

310 G. XXXVI. PHTHIRIASIS.

Exortus pediculorum vel insectorum pediculis affinium ex diversis corporis partibus, quas porrigine, ulcusculisque defœdant, aut puncturis, pruritu discruciant.

311 G. XXXVII. TRICHOMA, *Jachii*.

Capilli invicem complicati, agglutinati in globos inextricabiles, sæpius cum phthiriasi.

312 G. XXXVIII. ALOPECIA.

Capillorum lapsus cum cuticulæ desquamatione.

G. XXXIX.

G. XXXIX. ELCOSIS. 313

Numerosa vel ampla ulcera chronica, cariosa, fœtida cum pyrexia lenta.

G. XL. GANGRÆNA. 314

Initio mors partis, dein ejus putrida dissolutio.

G. XLI. NECROSIS. 315

Partis mors, sine tumore prævio, deinde vero exsiccatio, induratio, nigredo.

PARS SECUNDA.

GENERA MORBORUM DEFINITA

AB ILLUSTRI

CAROLO A. LINE,

EQUITE AURATO, ARCHIATRO, &c. &c.

Uspaliæ 1763.

CLAVIS CLASSIUM.

MORBI.

Febriles (e sanguine in medullam.)		
	EXANTHEMATICI	I
	CRITICI	II
	PHLOGISTICI	
Temperati		
Nervini		
Sensationis	DOLOROSI	IV
Judicii	MENTALES	V
Motus		
	QUIETALES	VI
	MOTORII	VII
Fluidi Secretionis		
	SUPPRESSORII	VIII
	EVACUATORII	IX
Solidi,		
Interni	DEFORMES	X
Externi	VITIA	XI

EXANTHEMATICI Febris cum efflorescentia cutis maculata.

CRITICI Febris cum Urinæ hypostasi lateritia.

PHLOGISTICI Febris cum Pulsu duro, Dolore topico.

DOLOROSI Doloris sensatio.

MENTALES Judicii alienatio.

QUIETALES Motus abolitio.

MOTORII Motus involuntarius.

SUPPRESSORII Meatuum impeditio.

EVACUATORII Fluidorum evacuatio.

DEFORMES Solidorum facies mutata.

VITIA Externa palpabilia.

SYMPTOMATA se habent ad Morbum, ut Folia & Fulcra ad Plantam.

FEBRIS dignoscitur Pulsu citato.

I. EXANTHEMATICI.

I. CONTAGIOSI.

I. MORTA.

Phlyctænæ (273) aliquot in Abdomine sive Artubus, magnitudine avellanæ.

Febris Diaria (11) malignissima, funestissima.

II. PESTIS.

Anthraces (272) seu *Bubones* (271) gangrænosi (233).

Febris Synocha (12) acutissima, funestissima. Vertigo (74), Anxietas (89), Lipyria.

III. VARIOLA.

Pustulæ (274) erysipelaceæ, suppurantes, escharoticæ (280), deciduæ, cicatrisantes (317).

Febris Synochus (13), Cephalalgia (40), Lumbago (62).

IV. RUBEOLA.

Papulæ (275) uniformes, rubræ, evanescenti-furfuraceæ.

Febris Synocha (12), Sternutatio (154), Epiphora (v72), Tussis (155) sicca.

V. PETECHIA

Sudamina (321) livido lurida, superficialia, insensibilia,

Febris exacerbans (23), Asthenia (92), Agrypnia (130).

VI SIPHYLIS.

Nodi (262), *ulcuscula*, *Myrmeciæ* (179.)
Febris Lenta (14) nocturna, dolore ostocopo (61), Marcore (209), Stranguria (169), Angina (46).

II. SPORADICI.

VII MILIARIA.

Papulæ (275) rotundæ, immersæ, diversicolores, confertæ, intacta facie, pruriginosæ.
Febris Synocha (12), Sudore (267) fœtido, punctorio.

VIII. UREDO.

Sudamina (321) inæqualia, ruberrima, dilabilia, pruriginosa, fugacia, recidivantia, furfuraceo-evanescentia.
Febris Hectica (24) benigna brevis.

IX. APHTA.

Escharæ (280) albidæ, rotundæ, ductibus excretoriis internis innatæ.
Febris Lenta (14) obscura, cum Somnolentia (96)

III. SOLITARII.

X. ERYSIPELAS

Macula rubens, urens, pressione dissimulanda, tumidiuscula, superficialis, dilatabilis, desquamatione finienda.
Febris Synocha (12) initio acuta, cum inquietudine.

Protypus Exanthematicorum *Erysipelas* (10) est.
Dysenteria (191) ad Contagiosos referreretur, modo Scabies (263) interna in oculos caderet.
Malignitatis symptoma imprimis sunt: *Lipothymia* (93), *Delirium* (65), *Vertigo* (74), *Oblivio* (101), *Atnæsthesia* (118), *Lypiria*, *Carpologia* (135), *Anhelatio* (157), *Aphonia* (115), *Aglutitio* (164).

II. CRITICI.

I. CONTINENTES.

XI. DIARIA.

Febris terminanda intra ſeptimanam dimidiam.

XII. SYNOCHA.

Febris terminanda intra ſeptimanam unicam.

XIII. SYNOCHUS.

Febris terminanda intra ſeptimanas duas vel tres.

XIV. LENTA.

Febris protrahenda ultra ſeptimanas tres.

II. INTERMITTENTES.

XV. QUOTIDIANA.

Febris paroxyſmi ſimiles nycthemeris ſingulis.

XVI. TERTIANA.

Febris paroxyſmi ſimiles nycthemeris alternis.

XVII. QUARTANA.

Febris paroxyſmi ſimiles nycthemeris tertiis.

XVIII. DUPLICANA.

Febris paroxyſmi ſimiles alternati.

XIX. ERRANA.

Febris paroxyſmi diſſimiles omnes.

II. EXACERBANTES.

XX. AMPHEMERINA.

Febris continens (14) cum Quotidiana (15).

XXI. TRITÆUS.

Febris continens (14) cum Tertiana (16).

XXII. TETARTOPHIA.

Febris continens (14) cum Quartana (17).

XXIII. HEMITRITÆA.

Febris Tritæus (21) cum Amphemerina (20).

XXIV. HECTICA.

Febris Lenta (14) cum Duplicana (18).

Protypus Criticorum Tertiana (16) *sit*, *aut potius* Rheumatismus (62).

Apyria *est deflagratio febris*.

Phthisis (208) *posset post Hecticam* (24) *collocari*, *si ordo naturalis admitteret & expectoratio*.

Lethargus (98) *cum Febricula his affinis est*.

III. PHLOGISTICI.

I. MEMBRANACEI.

XXV. PHRENITIS.

Inflammatio (231) *Meningum*.

Febris Synocha (12), Cephalalgia (40), Furor (68), Anxietas (89), Syringmos (72), Opthalmia (43), Carpologia (135), Oblivio (107).

XXVI. PARAPHRENESIS.

Inflammatio (231) *Diaphragmatis*.

Febr. Peripneumonia (34), Phrenitis (25).

XXVII PLEURITIS.

Inflammatio (231) *Pleuræ*.

Febr. Synocha (12), Dyspnœa (160), Tussis (155), Hæmoptysis (179), Pleuritica (53).

XXVIII. GASTRITIS.

Inflammatio (231) *Ventriculi*.

Febr. Amphemerina (20), Lipyria, Anxietas (89). Vomitus (183) ingestorum, Cardialgia (48).

XXIX. ENTERITIS.

Inflammatio (231) *Intestini*.

Febr. cum evacuatione abdominis, colica (50) atroci, tensiva, calente.

XXX. PROCTITIS.

Inflammatio (231) *Ani*.

Febr. Proctica (59) cum Tenesmo (193).

XXXI. CYSTITIS.

Inflammatio (231) *Vesicæ*.

Febr. Dolor Hypogastrii cum tumore inflammatorio, Dysuria (57), Tenesmo (193).

II. PARENCHYMATICI.

XXXII. SPHACELISMUS.

Inflammatio (231) *Encephali*.

Febr. Synochus (13), Delirium (65), Carpologia (135). Asthenia (92), Immobilitas, Anæsthesia (118), Aphonia (115).

XXXIII. CYNANCHE.

Inflammatio (231) *Faucis*.

Febr. Synocha (12), Tussis (155), Aglutitio (164), Orthopnœa (162, Angina (46), Suffocatio (158), Linguæ intumescentia.

XXXIV. PERIPNEUMONIA.

Inflammatio (231) *Pulmonis*.

Febr. Synocha (13), Tussis (155), Hæmoptysis (179) Dyspnœa (160), Interscapulii dolor, Cubatus supinus.

XXXV. HEPATITIS.

Inflammatio (231) *Jecinoris*.

Febr. Amphemerina (20), Tussis (155) sicca, Asthma (161), Singultus (153), Hypochondrii dextri tensio calens.

XXXVI. SPLENITIS.

Inflammatio (231) *Lienis*.

Febr. Tetartophia (22), Respiratio intersecta (149), Hypochondrii sinistri tumor pulsatorius.

XXXVII. NEPHRITIS.

Inflammatio (231) *Renis*.

Febr. Synochus (13) irregularis, Nausea (182), Singul-

gultus (153), Ructus (181), Urinæ varietas, Obstipatio (166), Lumbago (62) urens, Femoris stupor (105).

XXXVIII. HYSTERITIS.

Inflammatio (231) *Uteri*.

Febr. Delirium (65), Spasmus (121), Sardiasis (125), Dolor hypogastrii tumorque calens.

III. MUSCULOSI.

XXXIX. PHLEGMONE.

Inflammatio (231) *Partis Externæ*.

Febris ex partis externæ tumore pulsatorio, Rubore tensivo, calente.

Lipyria *dum externa frigent, interna fervent*.

Protypus Phlogisticorum Phlegmone (39) est.

Delirium (65) *quasi primus gradus Phrenitidis est*.

IV. DOLOROSI.

I. INTRINSECI.

XL. CEPHALALGIA.

Capitis totius aut portionis dolor gravativus.

XLI. HEMICRANIA.

Capitis lateralis dolor tensivus.

XLII. GRAVEDO.

Fronis dolor pressorius.

XLIII. OPHTHALMIA.

Oculi dolor.

XLIV. OTALGIA.

Auris dolor.

XLV. ODONTALGIA.

Dentis dolor maxillaris.

XLVI. ANGINA.

Faucis dolor cum suffocatione (158).

XLVII. SODA.

Oesophagi dolor rancido deurens Ructibus (181) calidis.

XLVIII. CARDIALGIA.

Cardiæ dolor scrobiculi subsyncopalis (94).

XLIX. GASTRICA.

Ventriculi dolor epigastrii.

L. COLICA.

Intestini dolor umbilicalis cum torminibus (123).

LI. HEPATICA.

Jecinoris dolor hypochondrii dextri.

LII. SPLENICA.

Lienis dolor hypochondrii sinistri, suspiria (150).

LIII. PLEURITICA.

Thoracis dolor lateralis punctorius.

LIV. PNEUMONICA.

Pulmonis dolor cum Orthopnœa (162), Tussi (155), Hæmoptysi (179)

LV. HYSTERALGIA.

Uteri dolor.

LVI. NEPHRITICA.

Renis dolor.

LVII. DYSURIA.

Vesicæ dolor.

LVIII. PUDENDAGRA.

Genitalis dolor.

LIX. PROCTICA.

Ani dolor.

II. EXTRINSECI.

LX. ARTHRITIS.

Geniculorum dolor periodicus;
a Synovia corrupta.

LXI. OSTOCOPUS.

Articulorum dolor internus fixus;
a Periostio infecto.

LXII. RHEUMATISMUS.

Musculorum dolor ad motum;
a Tunica cellulosa infecta.

LXIII. VOLATICA.

Vasorum dolor migrans.

LXIV. PRURITUS.

Cutis titillatio occulta, *Scalpendi necessitatem inducens*

Raphania (245) *dolore intenso his affinis; Ob Spasmos vero & Convulsiones sequentibus.*

V. MENTALES.

I. IDEALES.

LXV. DELIRIUM.

Insania acuta, transitoria, symptomatica cum febre.

LXXI. PARAPHROSYNE.

Insania acuta, periodica, sine febre.

LXVII. AMENTIA.

Insania chronica, universalis, innocua.

LXVIII. MANIA,

Insania chronica, universalis, furibunda.

LXIX. DÆMONIA.

Insania chronica, partialis, furibunda, meticulosa, de Dæmonibus.

LXX. VESANIA.

Insania chronica, partialis, tranquilla.

LXXI. MELANCHOLIA.

Insania chronica, partialis, mœsta, meditabunda.

II. IMAGINARII.

LXXII. SYRINGMOS.

Perceptio *Soni* tinnitantis falsi.

LXXIII. PHANTASMA.

Perceptio *Visibilis* objecti falsi.

LXXIV. VERTIGO.

Perceptio circumgyrationis falsæ.

LXXV. PANOPHOBIA.

Imaginatio *mali* falsi in solitudine.

LXXVI. HYPOCHONDRIASIS.

Imaginatio *fati lethalis* e levi malo, Borborygmi (123), Ructus (181) acidi, Palpitationes (132), Præcordia tremula, Persuasio.

LXXVII. SOMNAMBULISMUS.

Imaginatio *somniantis* fortior, qua motus voluntarii excitantur.

III. PATHETICI.

LXXVIII. CITTA.

Desiderium *non Esculenti* ingerendi.

LXXIX. BULIMIA.

Desiderium *Cibi* inexplebile.

LXXX. POLYDIPSIA.

Desiderium *Potus* continuum.

LXXXI. SATYRIASIS.

Desiderium *Veneris* enorme.

LXXXII. EROTOMANIA.

Desiderium *Amantium* pudicum.

LXXXIII. NOSTALGIA.

Desiderium *Patriæ* Affiniumve.

LXXXIV. TARANTISMUS.

Desiderium *Choreæ* (*sæpe a morsura Insecti*).

LXXXV. RABIES.

Desiderium *Mordendi* lacerandique innocuos (*sæpe a Morsura Mammalis.*)

LXXXVI. HYDROPHOBIA.

Aversatio *Potulentorum* cum Rigore (141) & Sardiasi (125); (*sæpius præcedenti maritata*).

LXXXVII. CACOSITIA.

Aversatio *Cibi* cum horrore.

LXXXVIII. ANTIPATHIA.

Aversatio *obiecti* particularis.

LXXXIX. ANXIETAS.

Aversatio *mundanarum* rerum.
(*Cordis dolor*).

V. QUIETALES.

I. DEFECTIVI.

XC. LANGUOR.

Debilitas constans musculorum ponderosa, quietem inducens.

XCI. LANGUOR.

Debilitas successiva virium vitalium, non reparanda quiete & cibatione.

XCII. ASTHENIA.

Debilitas successiva virium omnium.

XCIII.

XCIII. **LIPOTHYMIA.**

Defectio motus sensusque subita, superstite Pulsu Menteque.

XCIV. **SYNCOPE.**

Lapsus virium vitalium subitaneus; abolitis Pulsu, Respiratione, Sensu, Calore.

XCV. **ASPHIXIA.**

Lapsus virium animalium vitaliumque persistens.

II. SOPOROSI.

XCVI. **SOMNOLENTIA.**

Sopor vigiliis protractior.

XCVII. **TYPHOMANIA.**

Sopor apparens cum Agrypnia (130).

XCVIII. **LETHARGUS.**

Somnolentia constans, levis, febrilis, Delirio (65) oblivioso.

XCIX. **CATAPHORA.**

Sopor constans allocutione evigilans.

C. **CARUS.**

Sopor constans cum insensibilitate, respirationeque tacita.

CI. **APOPLEXIA.**

Sopor constans cum insensibilitate, respirationeque stertorosa (156).

CII. **PARAPLEGIA,**

Sopor constans partium sub thorace.

CIII. **HEMIPLEGIA.**

Sopor constans lateris alterius.

CIV. **PARALYSIS.**

Sopor constans partis alicujus.

CV.

CV. STUPOR.

Sopor tranſitorius partis alicujus cum ſenſu formicationis.

III. PRIVATIVI.

CVI. MOROSIS.

Imaginationis defectus.

CVII. OBLIVIO.

Memoriæ defectus.

CVIII. AMBLYOPIA.

Viſus obſcuritas ſine vitio ſenſibili.

CIX. CATARACTA.

Viſus privatio cum vitio obſervabili.

CX. AMAUROSIS.

Viſus privatio ſine vitio ſenſibili, pupilla dilatata.

CXI. SCOTOMIA.

Viſus Lypothymia (93) momentanea,

CXII. COPHOSIS.

Auditus defectus.

CXIII. ANOSMIA.

Olfactus defectus.

CXIV. AGEUSTIA.

Guſtus defectus.

CXV. APHONIA.

Loquelæ privatio.

CXVI. ANOREXIA.

Famis defectus.

CXVII. ADIPSIA.

Sitis defectus.

CXVIII. ANÆSTHESIA.

Tactus ſenſationis defectus.

CXIX.

CXIX. ATECNIA.

Libidinis defectus.

CXX. ATONIA.

Fibrarum Muſcularium contractionis defectus.

VII. MOTORII.

I. SPASTICI.

CXXI. SPASMUS.

Artus diſtenſio violenta, ſubitanea, fugax.

CXXII. PRIAPISMUS.

Penis ſpaſtica intumeſcentia.

CXXIII. BORBORYGMUS.

Inteſtinorum contractio boans.

CXXIV. TRISMOS.

Mandibularum clauſura arcta.

CXXV. SARDIASIS.

Oris retractio riſum mentiens, fugax.

CXXVI. HYSTERIA.

Præcordiorum preſſio ſub pectore, cum flatulentia (165), Suffocatione (158), Anxietate (89), Palpitatione (132), verticis preſſione.

CXXVII. TETANUS.

Corporis rigiditas cum ſenſibilitate.

CXXIII. CATOCHUS.

Corporis rigiditas cum inſenſibilitate.

CXXIX. CATALEPSIS.

Corporis totius recepta forma, conſtans, flexilis, cum inſenſibilitate.

CXXX.

CXXX. AGRYPNIA.

Senſorii rigiditas ſpaſtica, continua *Pervigilium*).

II. AGITATORII.

CXXXI. TREMOR.

Partium agitatio continua, chronica, abſque frigoris ſenſu.

CXXXII. PALPITATIO.

Cordis Viſcerisve motus ſubſultorius.

CXXXIII. ORGASMUS.

Arteriarum ſubſultus.

CXXXIV. SUBSULTUS.

Tendinum ſubſultoria elevatio.

CXXXV. CARPOLOGIA.

Digitorum tremula contractio inſcia.

CXXXVI. STRIDOR

Manducatio ſonora, vacua.

CXXXVII. HIPPOS.

Palpebrarum nictitatio frequentiſſima.

CXXXVIII. PSELLISMUS.

Loquelæ titubatio in quibuſdam literis.

CXXXIX. CHOREA.

Lateris agitatio tremula, continua, inordinata.

CXL. BERIBERI.

Partium tremor (131), Genuum contractura (299), Stupor (105), Raucedo (246).

CXLI. RIGOR.

Partium vibratio periodica, cum frigoris intercutanei ſenſu.

CXLII. CONVULSIO.

Partium agitatio violenta, periodica, cum ſenſibilitate.

CXLIII.

CXLIII. E P I L E P S I A.

Corporis agitatio periodica, chronica, cum insensibilitate.

CXLIV. H I E R A N O S O S.

Corporis agitatio continua, indolens, convulsiva, cum sensibilitate.

CXLV. R A P H A N I A.

Articulorum contractio spastica, cum Agitatione convulsiva, Dolore violentissimo, periodico.

VIII. SUPPRESSORII.

I. S U F F O C A T O R I I.

CXLVI. R A U C E D O.

Vocis sibilans elocutio ab arescentia pneumatica.

CXLVII. V O C I F E R A T I O.

Vocis dolorosa exaltataque exclamatio.
Ad Corpus indurandum.

CXLVIII. R I S U S.

Expiratio profunda, agitatoria, cum Sardiasi (125).
Ad Sanguinem e Corde expellendum.

CXLIX. F L E T U S.

Inspiratio intersecta, singultuosa, cita, suspirosa, cum mœstitia, gemitu, lacrymis (172).
Ad sanguinem intro pulmones inglutiendum.

CL. S U S P I R I U M.

Inspiratio profunda, agitatoria, lenta.
Ad sanguinem e pulmonibus expellendum.

CLI. O S C I T A T I O.

Inspiratio tarda, adaucta, hians, spasmodica.
Ad sanguinem propellendum per pectus.

CLII. P A N D I C U L A T I O.

Inspiratio profunda, pressoria cum extensione corporis artuumque.

Ad

Ad ſanguinem per vaſorum anaſtomoſes propellendum.

CLIII. SINGULTUS.

Inſpiratio celer, convulſiva, momentanea, iterata, ſonora.

Ad Cardiam evacuandam.

CLIV. STERNUTATIO.

Expiratio ſonora, convulſiva, celer, inſpirationi lentæ ſuccedens.

Ad ſinum Frontis evacuandum.

CLV. TUSSIS.

Expiratio ſonora, convulſiva, periodica.

Ad Tracheam evacuandam.

CLVI. STERTOR.

Reſpiratio ſonora, rauca, narium agitatione.

Ad mucum faucium ſubigendum.

CLVII. ANHELATIO.

Reſpiratio citatiſſima, profunda, lævis, fugax.

Ad ſanguinem per pulmones accelerandum.

CLVIII. SUFFOCATIO.

Reſpiratio anguſtatione faucium continua, ſine febre.

A Tracheæ anguſtatione.

CLIX. EMPYEMA.

Reſpiratio gravis cum fluctuatione in cavo thoracis, poſt febrim.

A pure in cavum Thoracis effuſo.

CLX. DYSPNŒA.

Reſpiratio anheloſa (157), laborioſa, ſine ſenſu anguſtationis faucium.

A pulmonum ſubſtantia oppilata.

CLXI. ASTHMA.

Reſpiratio ſtertoroſa (156), laborioſa, difficilis chronica.

A Bronchiis oppilatis.

CLXII. ORTHOPNŒA.

Reſpiratio ſuſpirioſa (150), ſuffocatoria (158), acuta, ſubitanea.

A ſanguinis per pulmones difficili tranſitu.

CLXIII. E P H I A L T E S.

Respiratio profunda, suffocans (158), dormientis in dorso cum somno laborioso.

Ab Intestinorum inflatione premente.

II. CONSTRICTORII.

CLXIV. A G L U T I T I O.

Deglutitio impedita.

CLXV. F L A T U L E N T I A.

Ructus (181) Crepitusque (194) impeditus, cum abdominis intumescentia.

CLXVI. O B S T I P A T I O.

Fæcum exoneratio impedita.

CLXVII. I S C H U R I A.

Mictus impeditus.

CLXVIII. D Y S M E N O R R H Œ A.

Menstrua suppressa s. dolorifica.

CLXIX. D Y S L O C H I A.

Lochiorum suppressio.

CLXX. A G L A C T A T I O.

Lactis defectus.

CLXXI. S T E R I L I T A S.

Genituræ suppressio.

IX. EVACUATORII.

I. CAPITIS.

CLXXII. OTORRHŒA.
Auris purulentus fluxus.

CLXXIII. EPIPHORA.
Oculi lacrymalis fluxus continuus.

CLXXIV. HÆMORRHAGIA.
Naris ſanguineus fluxus.

CLXXV. CORYZA.
Naris mucoſus fluxus, copioſus, continuus.

CLXXVI. STOMACACE.
Oris ſanguinea e gingivis cruentatio.

CLXXVII. PTYALISMUS.
Oris ſalivalis e glandulis copioſiſſimus effluxus,

II. THORACIS.

CLXXVIII. SCREATUS.
Faucis muci ſonora evacuatio.

CLXXIX. EXPECTORATIO.
Pulmonis ſeroſa e Trachea evacuatio.

CLXXX. HÆMOPTYSIS.
Pulmonis ſanguinea cum Tuſſi evacuatio.

CLXXXI. VOMICA.
Pulmonis purulenta, copioſa, improviſa evacuatio.

III. ABDOMINIS.

CLXXXII. RUCTUS.
Rejectio *Flatuum* frequens.

CLXXXIII. NAUSEA.

Rejectionis *Cibi Flatuumque* conatus inanis.

CLXXXIV. VOMITUS.

Rejectio ingestorum convulsiva.

CLXXXV. HÆMATEMESIS.

Vomitus (184) sanguinis.

CLXXXVI. ILIACA.

Vomitus (184) cum Obstipatione (166) fixa & Colica (50).

CLXXXVII. CHOLERA.

Vomitus (184) cum Diarrhœa (188), Colica (50.)

CLXXXVIII. DIARRHŒA.

Dejectio *Fæcum* liquidarum frequens.

CLXXXIX. LIENTERIA.

Diarrhœa (188.) Cibi immutati.

CXC. CŒLIACA.

Diarrhœa (188) Chymi.

CXCI CHOLIRICA.

Diarrhœa (188) rubella, absque Colica.

CXCII. DYSENTERIA.

Diarrhœa (188) cruenta, cum Colica (50), Tenesmo (194.)

CXCIII. HÆMORRHOIS.

Dejectio *Sanguinis* cum Proctica (59), absque Colica.

CXCIV. TENESMUS.

Dejectio *Muci* frequens, parca, cum desiderio.

CXCV. CREPITUS.

Dejectio *Flatuum* copiosa, crebra.

IV. GENITALIUM.

CXCVI. ENURESIS.

Urinæ stillicidium involuntarium, indolens.

CXCVII. STRANGURIA.

Urinæ parca, guttata, frequens, dolorosa micturitio.

CXCVIII. DIABETES.

Urinæ copiosissimæ frequens micturitio.

CXCIX. HÆMATURIA.

Urinæ cruentæ micturitio.

CC. GLUS.

Urinæ viscosæ micturitio.

CCI. GONORRHŒA.

Geniturae stillicidium.

CCII. LEUCORRHŒA.

Muci e sinu muliebri effluxus.

CCIII. MENORRHAGIA.

Menstruatio copiosa, inordinata.

CCIV. PARTURITIO.

Fœtus maturi enixus laboriosissimus.

CCV. ABORTUS.

Fœtus præmatura ejectio.

CCVI. MOLA.

Massæ carneæ, intus cysticosæ, ex utero ejectio.

V. CORPORIS EXTERNI.

CCVII. GALACTIA.

Lactis effluxus.

CCVIII. SUDOR.

Seri per poros copiosa, frequens sudatio.

X. DEFORMES.

I. EMACIANTES.

CCIX PHTHISIS.

Marcor cum Hectica (24), Tussi (155), Dyspnœa (160), Expectoratione (178) purulenta, copiosa.

CCX. TABES.

Marcor cum Hectica (24), *absque Expectoratione*.

CCXI. ATROPHIA.

Marcor cum Atonia (120), *absque Expectoratione & Hectica*.

CCXII. MARASMUS.

Marcor cum Aridura (226), *absque Atonia, Expectoratione, Hectica*.

CCXIII. RACHITIS.

Marcor carnium tumentibus artuum Geniculis Capiteque; ossibusque sæpe flexilibus.

II. TUMIDOSI.

CCIV. POLYSARCIA.

Corporis pinguedinosa intumescentia.

CCXV. LEUCOPHLEGMATIA.

Corporis emphysematosa (229) intumescentia.

CCXVI. ANASARCA.

Corporis œdematosa (230) intumescentia.

CCXVII. HYDROCEPHALUS.

Capitis œdematosa (230) intumescentia, hiantibus suturis cranii.

CCXVIII. ASCITES.

Abdominis œdematosa (230) intumescentia.

CCXIX.

CCXIX. HYPOSARCA.

Abdominis nodosa intumescentia.

CCXX. TYMPANITES.

Abdominis flatulenta (165) intumescentia, constans, sonora.

CCXXI. GRAVIDITAS.

Abdominis a fœtu intumescentia nimia.

III. DECOLORES.

CCXXII. CACHEXIA.

Pallor corporis œdematosus (230), cum debilitate, mœrore.

CCXXIII. CHLOROSIS.

Viridi-cinereus color faciei fœmineæ cum Citta (78).

CCXXIV. SCORBUTUS.

Opacitas faciei cum Anorexia (116), Lassitudine (90) matutina, Stomacace (175) Labario (309).

CCXXV. ICTERUS.

Flavedo corporis cum urina luteo-tinctoria, fæcibus albidis, (*Obstipatio Bilis*).

CCXXVI. PLETHORA.

Rubedo corporis a distentis vasis sanguineis, cum Dyspnœa (160).

HYDROPIS nomine veniunt Anasarca (216), *Ascites* (218), *Hyposarca* (219), *Hydrocephalus* (217), *Oedema* (230), *&* *Tympanites* (220).

XI. VITIA.

I HUMORALIA

CCXXVII. ARIDURA.

Pars exsucca, emarcida, exantlatis humoribus, indolens.

CCXXVIII. DIGITIUM.

Articuli exsiccatio friabilis occulta.
Digiti marcor Dolore periodico intesissimo.

CCXXIX. EMPHYSEMA.

Flatus intra tunicam cellulosam Partis.
Tumor elasticus, concolor, subdiaphanus, indolens.

CCXXX. OEDEMA.

Lympha stagnans intra tunicam cellulosam Partis.
Tumor digito premente foveolam admittens, concolor, vespertinus, indolens, Partis.

CCXXXI. SUGILLATIO.

Cruor effusus in tunicam cellulosam.
Tumor obsoletus, latus, luridus.

CCXXXII. INFLAMMATIO.

Sanguis obstructus in vasis.
Tumor tensus, calidus, ruber, pulsans, dolens.

CCXXVIII. ABSCESSUS.

Inflammatio suppurata, in *Pus* collecta.
Tumor mollis, æqualis, pruriens.

CCXXXIV. GANGRÆNA.

Inflammatio, s. Suppuratio suffocata, *mortua* serpens in tunica cellulosa.
Cutis livens, molliuscula, putris cum vesiculis sub epidermide, serpente vitio, margine subinflammato, subardente.

CCXXXV. SPHACELUS.

Gangræna (234) omnium solidorum partis.

Mor-

Mortificatio putrida ad oſſa penetrans, indolens, properans.

II. DIALYTICA.

(*Solutiones Continui*).

CCXXXVI. FRACTURA.

Oſſis ſolutio citra ſubſtantiæ diſſolutionem.

CCXXXVII. LUXATURA.

Geniculi ſolutio citra ſubſtantiæ diſſolutionem.

CCXXXVIII. RUPTURA.

Tendinis ſolutio citra ſubſtantiæ diſſolutionem.

CCXXXIX CONTUSURA.

Fibrarum ſolutio citra ſubſtantiæ diſſolutionem.

CCXL. PROFUSIO.

Sanguinis effluxus copioſus e ſubſtantiæ diſſolutione.

CCXLI. VULNUS.

Subſtantiæ diſſolutio partis mollis, hians, cruenta.

CCXLII. AMPUTATURA.

Vulnus *detruncatione* partis totalis factum.

CCXLIII. LACERATURA.

Vulnus Fibrarum Cutiſque *laceratione* factum.

CCXLIV. PUNCTURA.

Vulnus *Tendinis* punctione factum.

CCXLV. MORSURA.

Vulnus punctum armis animalium *venenatis*.

CCXLVI. COMBUSTURA.

Vulnus *igne* factum, inducta Eſchara (281).

CCXLVII. EXCORIATURA.

Cutis remota a Carnibus vivis.

CCXLVIII. INTERTRIGO.

Cuticulæ eroſio madens dolenſque.

CCXLIX. R H A G A S.

Fissura Cutis arida.

III. EXULCERATIONES.

(*Suppurationes apertæ.*)

CCL. U L C U S.

Vulnus *Suppuratum* partis carnosæ.

CCLI. C A C O E T H E S.

Ulcus *superficiale* serpens, manans, perenne.

CCLII. N O M A.

Ulcus Carnes integumentaque depascens, cicatricem inducens.

CCLIII. C A R C I N O M A.

Ulcus *Scirrhi* (284) suppurati.

Ulcus putridum, serpens, vasis tumidis radicatum, periodice dolens.

CCLIV. O Z E N A.

Ulcus intra antrum *Higmori*.

Ulc. occultum e Naribus fœtens.

CCLV. F I S T U L A.

Ulcus cortice *calloso vaginatum*.

Ulc. sinuoso penetrans, intus cortice obtectum, ore angustatum.

CCLVI. C A R I E S.

Ulcus *Ossis* separato periostio.

Ulc. connivens, cum raris punctionibus indolens, sanie passim nigra se prodens.

CCLVII. A R T H R O C A C E.

Ulcus *Medullæ* cum ossis Carie (256).

Ulc. malignum, tumens, dolore ostocopo (61).

CCLVIII. C O C Y T A.

Animalculum venenatum intra partem receptum.

Patris stigma dolore furioso.

CCLIX. PARONYCHIA.

Serum corruptum sub *tendinibus* periostioque.

Partis ruber dolentissimus os destruens.

CCLX. PERNIO.

Partis ustio *Gelu* facta.

Pars albo cærulescens, tempestatibus recrudescens, sæpe exulcerans.

CCLXI. PRESSURA.

Digiti inflammatio (232) a *frigore*, in casum unguis tendens.

Inflam. Digiti circum ungues in suppurationem vergens.

CCLXII. ARCTURA.

Unguis curvatura lateralis cutem secans.

Inflammat. digiti cum ulceratione laterali unguis.

IV. SCABIES.

* *Multiplicativa.*

CCLXIII. LEPRA.

Pustulæ (275), Eschara (281) sicca colorata, cum *Nodis* immersis mobilibus indolentibus fuscis Rhagadibusque (249).

CCLXIV. TINEA.

Pustulæ (275) *Capillitii* siccæ, eschara (281) albo-flavescente, *Pilisque* abbreviatis erectis bulboso-radicatis.

CCLXV. ACHOR.

Pustulæ (275) exulcerantes, manantes communi pinguedinoso.

CCLXVI. PSORA.

Pustulæ (275) ichorosæ, escharoticæ (281), noctu imprimis pruriginosæ (64).

CCLXVII. LIPPITUDO.

Pustulæ (275) excoriantes *Palpebrarum* margines.

CCLXVIII. SERPIGO.

Pustulæ (275) siccæ, obsoletæ, serpentes, subfarinaceo- desquamantes.

CCLXIX. HERPES.

Pustulæ (275) escharoticæ (281), basi communi erysipelacea (10).

CCLXX. VARUS.

Pustulæ (275) *Glandularum sebacearum* rubræ, dispersæ, chronicæ.

CCLXXI. BACCHIA.

Vari (270) *faciei* cum nodis maculisque coloratis chronicis.

** *Simplex*.

CCLXXII. BUBO.

Glandula conglomerata inflammata, in suppurationem tendens.

CCLXXII. ANTHRAX.

Glandula subcutanea inflammata, in suppurationem malignam vergens.

Tumor rotundus, erisipelaceus (10), immersus, dolentissimus, suppurandus apice acuto, pustula purifera.

CCLXXIV. PHLYCTÆNA.

Vesicula serosa, distenta, pellucida, basi inflammata, rupta dolens.

CCLXXV. PUSTULA.

Vesicula purulenta, turgens, dehiscens pure.

CCLXXVI. PAPULA.

Tuberculum farctum, coloratum inflammatum, vix suppurandum.

CLXXVII. HORDEOLUM.

Tuberculum cysticosum, ovatum, in limbo palpebrarum, suppurans sæpius apice.

CCLXXVIII. VERRUCA.

Papilla nervea intumescens, indurata.

Papula durior, scabra, sicca, indolens.

CCLXXIX.

CCLXXIX. CLAVUS.

Verruca (278) callosa, in Tendinibus radicata, basi sensibilis.

CCLXXX. MYRMECIUM.

Verruca (278) madida, mollis, denudata.

CCLXXXI. ESCHARA.

Crusta mortua, ab humoribus extravasatis coagmentata, decidua.

V. TUMORES protuberantes.

CCLXXXII. ANEURISMA.

Arteriæ dilatatio.

Tumor mollis, pulsans, concolor, rotundatus.

CCLXXXIII. VARIX.

Venæ dilatatio.

Tumor mollis, quiescens, concolor, rotundatus.

CCLXXXIV. SCIRRHUS.

Glandula indurata.

Nodus durus, asper, concolor indolens, rotundatus, pressione insensilis.

CCLXXXV. STRUMA.

Grandula infarcta.

Nodus indolens, solidiusculus, pressione obtuse sentiens.

CCLXXXVI. ATHEROMA.

Tumor tunicatus, rotundatus, mobilis, molliusculus, indolens, absque cystide.

CCLXXXVII. ANCHYLOSIS.

Tumor *Geniculorum*, ligamenti capsulæque tensione expressa Synovia.

Tumor ad genicula, mollis, pulposus concolor.

CCLXXXVIII. GANGLION.

Tumor *Tendinibus* innatus, ovatus, mobilis, pulposus indolens.

CCLXXXIX. NATTA.

Tumor tunicatus, musculis irradicatus, eminens, pulposus, indolens.

CCXC. SPINOLA.

Tumor supra *vertebras lumborum* mollis; exiguus, Vertebrarum processibus dehiscentibus.

CCXCI. EXOSTOSIS.

Tumor durus ex *osse* prominente enatus.

VI. PROCIDENTIÆ.

CCXCII. HERNIA.

Intestini obtecti ultra propriam sedem protrusio.

CCXCIII. PROLAPSUS.

Visus nudum relaxatum, elongato propendens ultra proprium locum.

CCXCIV. CONDYLOMA.

Tunica interior relaxata gibba.

CCXCV. SARCOMA.

Caro nuda enata e vivo vulnere.

CCXCVI. PTERYGIUM.

Cuticula excrescens e cantho, oculi, superficiem ejus obtegens.

CCXCVII. ECTROPIUM.

Palpebra inferior resupinato-inversa.

CCXCVIII. PHIMOSIS.

Præputii intumescentia inflammata, glandem denudans incarceransve.

CCXCIX. CLITORISMUS.

Clitoridis intumescentia extra sinum pudoris.

VII. DEFORMATIONES.

CCC. CONTRACTURA.
Geniculorum fixatio rigida.

CCCI. GIBBER.
Thoracis dilatatio ptominens.

CCCII. LORDOSIS.
Ossium incurvatio.

CCCIII DISTORTIO.
Ossium ad latus non naturale flexio.

CCCIV. TORTURA.
Oris ad latus flexio.

CCCV. STRABISMUS.
Oculi distorti & inæqualiter moti.

CCCVI. LAGOPHTHALMIA.
Oculi sursum visio palpebra superiore abbreviata.

CCCVII. NYCTALOPIA.
Oculi visus nocturnus.

CCCVIII. PRESBYTIA.
Oculi visus remotus.

CCCIX. MYOPIA.
Oculi visus approximatus.

CCCX. LABARIUM.
Dentes vacillantes in suis alveolis.

CCCXI. LAGOSTOMA.
Labium superius oris fissum.

CCCXII. APELLA.
Præputii abbreviatio absque inflammatione.

CCCXIII. ATRETA.
Meatus corporis imperforatus.

CCCXIV. PLICA.
Capillorum contortuplicatio indissolubilis.

CCCXV.

CCCXV. H I R S U T I E S.

Pili copiosiores longioresque.

CCCXVI. A L O P E C I A.

Pilorum defluvium.

CCCXVII. T R I C H I A S I S.

Ciliorum distortio.

VII. M A C U L Æ.

CCCXVIII. C I C A T R I X.

Callus replens ulcerationes consolidatas.

CCCXIX. N Æ V U S.

Macula quæcunque congenita.

CCCXX. M O R P H Æ A.

Macula *alba*, depressa, lata.

CCCXXI. V I B E X.

Lineæ *sanguinicolores* subcuticula.

CCCXXII. S U D A M E N.

Maculæ *rubræ*, pulicares, glabræ, pungentes, evanescentes.

CCCXXIII. M E L A S M A.

Macula *cærulescens* in parte tecta.

CCCXXIV. H E P A T I Z O N.

Macula *griseæ*, subaspera, pruriens.

CCCXXV. L E N T I C O.

Maculæ *griseæ*, confluentes, insensiles.

CCCXXVI. E P H E L I S.

Color *fuscus* partis insolata.

Heu mihi! tot mortes Homini, quot membra, malisque
Tot sumus infecti, Mors, ut Medicina putetur.

THEORIA.

1 CORPUS vivum constat *Medullari* cerebroso, & *Corticali* solido fluidoque.

2 VITA sentiens movensque residet in medullari primordiali, continuato, multiplicativo.

3 MEDULLARE arcte custoditum, nervis expansis tentaculatum, fabricat suum corticale solidum e fluidis vegetabilium, & fluida hæc vicissim per solida præparat.

4 Medullare hoc *nutritur* tenuissimo spirituoso liquido corticali, sed *flagrat* electrico pulmonibus hausto.

5 Medullare sentiens se pandit ad *gratum* salutare, & movens se retrahit ad *ingratum* noxium.

6 Fluidum corticale, e quo solida, solvitur destruiturque *Acidis* aut *Putridis*, utrisque multiplicativis. Sic vitiatur Sanguis putrido, Serum acido.

7 His dum resistit sentiens movens, oriuntur FEBRES: *Criticæ* ab acescente, *Phlogisticæ* a putrescente, at *Exanthematicæ* a vivo peregrino multiplicabili.

8 Fluidorum nociva ingrata eliminare studet vita per vias naturales & artificiales, & quo hæc periculosiora, eo citius per datam sic portam simul ejecit quævis impura, sed duas portas simul apertas non facile admittit, ne exhauriatur (*a*).

9 Quidquid præcipue adversum sentit, præcipue curat vel minora majoribus adsociat (*b*), ut tota se his opponat.

10 CORTICALE solidum deteritur vitiaturque quotidie, adeoque quotidie reparandum; reparatur autem *Diæta*, eaque multiplici; ab appropriata bene, ab erronea perverse, unde, defectus, *Morbi* dicti.

11.

(*a*) Evacuationes duæ simul & semel possunt vix stare.
(*b*) Dolor dolorem trahit.

11 MORBI tolluntur contraria caussa (*a*); hanc ut citius natura obtineat, Toxica misceantur ingerendis, *Medicamenta* dicta.

12 CONTRARIA hæc ex sapidis in fluida Solidaque & ex *Olidis* in medullare agentibus dignoscenda sunt: E contrariis itaque saporibus & odoribus primaria medicamenta eruenda: in his itaque *Clavis Materiæ Medicæ*.

PARS

(*a*) Morbi morbis curantur.

PARS TERTIA.
DEFINITIONES
GENERUM
MORBORUM
A CLARISSIMO
RUDOLPHO AUGUSTO VOGEL,
PHILOS. ET MED. D. HUJUSQ. PROFESS.
&c. &c.

Gottingæ 1764.

QUALITATES MEDICAMENTORUM.

I. SAPIDA.

Agunt in *Corticale* Vitale:

	in *Fluidis*.	in *Solidis*.		
1 AQUOSA.	Mundificantia, Absorbentia,	Humectantia. Exficcantia	SICCA.	1
2 ACIDA.	Refrigerantia, Balsamica,	Attenuantia. Tonica	AMARA.	2
3 DULCIA.	Edulcorantia, Incidentia,	Impinguantia. Corrodentia	ACRIA.	3
4 VISCOSA.	Inviscantia, Penetrantia,	Lubricantia. Abstergentia	SALSA.	4
5 PINGUIA.	Obtundentia, Inspissantia,	Emollientia. Adstringentia	STIPTICA.	5

II. O L I D A.

Agunt in *Medullare* Animatum.

Sensuum	*Excitant*	AROMATICA,	*Sopiunt*	VIROSA.
Motum	*Spasticant*	ORGASTICA,	*Evacuant*	NAUSEOSA.
Judicium	*Acuunt*	SPIRITUOSA,	*Confundunt*	TETRA.
Libidinem	*Provocant*	AMBROSIACA,	*Suffocant*	HIRCINA.

TA-

TABULA CLASSIUM MORBORUM.

I. FEBRES. Innati caloris augmentum præternaturale, cum oris ſiccitate & gravitate corporis.

II. PROFLUVIA. Humorum evacuatio, ab ordine, quantitate aut qualitate naturali abhorrens.

III. EPISCHESES. Excernendorum ſuppreſſiones.

IV. DOLORES. Senſationes moleſtæ, corporis & animi tranquillitatem turbantes.

V. SPASMI. Solidorum mobilium contractiones, vel agitationes.

VI. ADYNAMIÆ. Senſationum, motuum, naturaliumve functionum defectus, aut imminutiones.

VII. HYPERÆSTHESES. Senſationes auctæ, vel perverſæ.

VIII. CACHEXIÆ. Male colorata corporis conſtitutio, cum debilitate.

IX. PARANOIÆ. Mentis aberrationes.

X. VITIA. Mutationes in ſuperficie corporis conſpicuæ.

XI. DEFORMITATES. Aberrationes ſolidorum ab ordine, poſitura, habitu, figura, numero, aliiſque qualitatibus.

I. FEBRES.

I. INTERMITTENTES.

Æstus ad summum 18 horas perdurat, dein aliquamdiu cessat, posteaque revertitur prævio frigore.

I. SIMPLICES.

I. QUOTIDIANA.

Quolibet die aut nocte recurrit.

II. TERTIANA.

Uno die vel nocte una invadit, sequente intermittit, tertio repetit.

III. QUARTANA.

Uno die vel una nocte invadit, deinde biduum intermittit, quarto iterum redit.

IX. QUINTANA.

Singulo quinto die redit.

V. SEXTANA.

Singulo sexto die repetit.

VI. SEPTANA.

Singulo septimo die revertitur.

VII. OCTANA.

Quolibet octavo die redit.

VIII. NONANA.

Quovis nono die recurrit.

IX. DECIMANA.

Quovis decimo die recurrit.

X. VAGA.

Alio post decimum diem, sed haud fixo, recurrit.

XI. MENSTRUA.

Viris circa fluxum hæmorrhoidalem, vel etiam citra illum, fœminis circa catamenia accidit.

II.

II. DUPLICATÆ.

XII. TERTIANA duplex.

Quotidie accedit, interdum quoque bis uno die vacuo, accessionis vero tempora alternis diebus respondent.

XIII. QUARTANA duplex.

Inter quatuor dies tertium tantum a febre vacuum habet, & accessionis tempora alternatim præcedenti insultui respondent.

III. TRIPLICATÆ.

XIV. QUARTANA triplex.

Quotidiana, paroxysmis quarto quovis die conspirantibus.

II. CONTINUÆ.

Nec interdiu, nec noctu intermittunt, sed remissiones saltem inferunt cum exacerbationibus, quæ vel quotidie, aut tertio die, aut quarto, aliove accedunt.

I. SIMPLICES.

XV. QUOTIDIANA Continua.

Quotidie cum frigore accidit, calor vero per totum reliquum tempus durat.

XVI. SYNOCHUS.

Facie rubra, cute humida, pulsu magno & frequenti, crisi perfecta terminantur intra 21. dies. Species ejus *Ephemera* est.

XVII. AMATORIA.

Febris paucarum horarum a magno frigore incipiens, ex vehementi concubitus expectatione.

XVIII. PHRENITS.

Febris acuta, dolor capitis, delirium constans & vehemens.

XIX. EPIALA.

In qua frigoris ſenſus perpetuus cum rigore contingit.

XX. CAUSOS.

Febris ardentiſſima, tertio quoque die acerbior cum immenſa ſiti, & ſicciſſima atque nigra liugua.

XXI. ELODES.

Febris cum profuſiſſimo ac perpetuo ſudore inde a primo die, & magno virium lapſu. *Typhodes & Sudor Anglicanus* ejus ſpecies ſunt.

XXII. LETHARGUS.

Febris in qua ſopor & ab expergefactione delirium, mox opprimente iterum ſopore.

XXIII. TYPHOMANIA.

Febris ex phrenitide & lethargo mixta.

XXIV. LEIPYRIA.

Febris in qua extrema algent, interna uruntur, pulſus parvus & obſcurus.

XXV. PHRICODES.

Febris cujus decurſum crebri horrores rigoreſve interpellant.

XXVI. LYNGODES.

Febris in qua æger a principio uſque ad criſin ſingultit.

XXVII. ASSODES.

Febris in qua æger fere irrequietus eſt, & implacide moleſteque habet, vel faſtidio agitatur.

XXVIII. CHOLERICA.

Febris cum vomitu frequenti atque torminoſa alvi dejectione.

XXIX. SYNCOPALIS.

Febris cui frequens lipothymia ſe intermiſcet.

XXX. HYDROPHOBIA.

Febris cum averſatione liquidorum, ſingultu, convulſione, & delirio.

XXXI. OSCITANS.

Febris cum perpetua oscitatione.

XXXII. ICTERICODES.

Aurignosa febris, quæ cutem colore flavo inquinat, citra hepatis inflammationem.

XXXIII. PESTILENTIALIS.

Febris pandemia, contagiosa, acutissima, in qua bubones aut certe carbunculi, aut vesiculæ oriuntur cum leipyria, ingenti siti, spiritu, sudore, & dejectionibus fœtidis, delirio, nausea, vomitu, pulsuque parvo ac obscuro.

XXXIV. SIRIASIS.

Febris infantibus propria, in qua cutis sicca, pallida, inappetentia, oculi concavi, fontanellæ subsidentia.

II. COMPOSITÆ.

1. *Exanthematicæ*.

XXXV. VARIOLOSA.

Synochus contagiosa, a vomitu, cephalalgia, & lumbagine incipiens, in qua tertio die maculæ erumpunt, sensim in pustulas purulentas escharoticas, deciduas, abeuntes.

XXXVI. MORBILLOSA.

Synochus contagiosa, cum tussi sicca & madore oculorum, in qua maculæ rubellæ, latescentes, paullum elevatæ erumpunt, quæ deinceps in tenuissimas squamulas solvuntur.

XXXVII. MILIARIS.

Phricodes, dolor rheumaticus in aliqua corporis parte, aut sensus punctorius in dorso, crure, ac intestinis, aut stupor in digitis, pustulæ prurientes milii seminis magnitudine, rubræ vel albæ, sero primum limpido, deinceps subalbo perlarum colore non dissimili, plenæ, facie intacta, sudor multus fœtidus.

XXXVIII. PETECHIALIS.

Febris maligna, exanthemata morsibus pulicum fere similia, flavescentia, rubra, vel livida.

XXXIX.

XXXIX. SCARLATINA.

Synochos, maculæ coccineæ crebriores ac latiores, quam morbilli, nodulis subflavis, ad instar capitis acicularum, ornatæ, fugaces, in squamulas dehiscentes.

XL. URTICATA.

Synochos quotidiana continua mitior, tubercula puncturis urticarum similia, rubra, prominentia, fugacia

XLI. BULLOSA.

Maligna, vesiculæ sero sublimpido repletæ, magnitudine nucis avellanæ & majores, in variis corporis partibus, facie non excepta, citra cutis inflammationem erumpentes.

XLII. VARICELLA.*

Variolæ spuriæ, ephemera, pustulæ variolis simillimæ prurientes, primo die erumpentes & suppurantes, tertio resiccatæ, & in squamulas deciduæ, toto morbo intra septem dies ad summum terminato.

XLIII. PEMPHINGODES.

Febris, quæ pustulas in ore, phlyctides dictas, generat.

XLIV. APHTHOSA.

Maligna cum ulcusculis in ore superficialibus, fungosis, quas aphthas vocant.

II. *INFLAMMATORIÆ.*

XLV. PHRENISMUS.

Vera inflammatio cerebri aut membranarum ejus; quam ex dolore capitis & vehementi delirio febrili vulgo definiunt, quæ signa vero admodum ambigua.

XLVI.

* Hæc *Varicella* facillime illudere Medicis sub specie variolosæ potest, nisi ad decursum accuratissime attendant; unde dein bis vel ter laborare homines variolis existimantur.

XLVI. CHEMOSIS.

Vehemens adnatæ oculorum inflammatio, ut super corneam feratur, acerbus dolor, perversio palpebrarum, cephalalgia, agrypnia.

XLVII. OPHTHALMITES.

Inflammatio interiorum oculi membranarum, & præcipue choroideæ; dolor in oculo fere intolerabilis cum febre, cephalalgia, agrypnia, delirio. Vulgo *phlegmone* dicitur.

XLVIII. OTITES.

Inflammatio auris internæ; dolor immanis in aure, febris, cephalalgia, agrypnia, delirium.

XLIX. ANGINA.

Faucium inflammatio; febris continua, respirandi ac deglutiendi difficultas, præfocationis metus.

L. PLEURITIS.

Pleuræ inflammatio; febris continua, dolor in latere thoracis pungens, tussis sicca, dyspnœa.

LI. PERIPNEUMONIA.

Pulmonum inflammatio; febris continua, dolor thoracis obtusus, gravativus, tussis humida aliquando cruenta, difficultas anhelitus angustiave.

LIII. MEDIASTINA.

Mediastini inflammatio; febris continua, incendium in thorace, offendiculum quoddam ad sternum in inspiratione, respiratione, frequens, tussi cum sputis coloratis, orthopnœa; an semper?

LIII. PERICARDITIS.

Pericardii inflammatio; omnia ut in mediastina, urgente morbo syncope.

LIV. CARDITIS.

Cordis inflammatio, symptomata fere ut in peripneumonia, sed graviora, dolor vehemens in regione cordis, palpitatio, pulsus frequens ac inæqualis, hydrophobia; an semper?

LV. PARAPHRENITIS.

Diaphragmatis inflammatio; febris continua, dyspnœa, dolor e regione ventriculi cinguli instar ventrem supra lumbos ambiens, delirium.

LVI. GASTRITIS.

Ventriculi inflammatio; febris, leipyria dolor & ardor in epigastrio, sitis, vomitus ingestorum, singultus.

LVII. ENTERITIS.

Intestini inflammatio; febris assodes, phricodes, cruciatus ventris intolerabilis, flatuum & stercoris retentio, aut dysenteria.

LVIII. HEPATITIS.

Jecinoris inflammatio; febris continua hypochondrii dextri dolor tensivus, tussis sicca, icterus, interdum vomitio bilis & per alvum dejectio.

LIX. SPLENITIS.

Lienis inflammatio; febris continua, hypochondrii sinistri distentio atque tumor, dolor pulsans, molestus dexter decubitus.

LX. MESENTERITIS.

Mensenterii inflammatio; febris varia occulta & lenta phricodes aut quotidiana continua, dolor colicæ similis, egestiones chylosæ & ichorosæ, nullo doloris sensu defluentes.

LXI. OMENTITIS.

Omenti inflammatio; febris continua cum dolore & tumore in regione epigastrica & hypogastrica.

LXII. PERITONITIS.

Peritonæi inflammatio, febris assidua, tumor ventris, & dolor punctorius.

LXIII. MYOCOLITIS.

Musculorum abdominalium inflammatio; symptomata ut in peritonite.

LXIV. PANCREATICA.

Pancreatis inflammatio. Notæ deficiunt.

LXV.

LXV. NEPHRITIS.

Renis inflammatio; febris acuta, dolor ardens in regione renis, urina pauca, flammea, vel nulla, stupor cruris vicini, dolor testis vicini, ructus, vomitio.

LXVI. CYSTITIS.

Vesicæ urinariæ inflammatio; febris levior. hypogastrii dolor ardens, pressorius, frequens mejendi stimulus, ischuria, tenesmus.

LXVII. HYSTERITIS.

Uteri inflammatio; febris continua, delirium, tumor hypogastrii inflammatorius, dolor in lumbis & inguine.

LXVIII. ERYSIPELACEA.

Ephemera, erysipelatis expolsionem efficiens.

LXIX. PODAGRICA.

Continua, synochos, cum dolentissimo rubore in pede

LXX. PANARITIA.

Continua, panaritii gravioris comes.

LXXI. CYSSOTIS.

Ani inflammatio, dolor, tenesmus.

III. *SYMPTOMATICÆ.*

LXXII. APOPLECTICA.

Continua apoplexiæ superveniens.

LXXIII. CATARRHALIS.

Vespertina, catarrhis socia.

LXXIV. RHEUMATICA.

Quotidiana continua rheumatismo juncta, multus sudor, interdum pustulæ purulentæ.

LXXV. HÆMORRHOIDALIS.

Ephemera, dolor spinæ, hæmorrhoides, aut saltem varices dolentes circa quartum diem erumpentes, quo febris finitur.

LXXVI. LACTEA.

Ephemera, aliquot diebus a partu incidens.

LXXVII. VULNERARIA.

Graviori vulneri superveniens.

LXXVIII. SUPPURATORIA.

Partium internarum inflammationibus, dum in suppurationes transeunt, superveniens, continua.

LXXIX. LENTA.

Febricula quotidiana in morbo longo.

LXXX. HECTICA.

Quotidiana continua vehementior in morbo longo, cum sudore colliquativa & phthisi.

II. PROFLUVIA.

I. *HÆMORRHAGIÆ.*

LXXXI. HÆMORRHAGIA.

Sanguinis e vulnere profusio.

LXXXII. EPISTAXIS.

Sanguinis e naribus profusio.

LXXXIII. HÆMOPTOE.

Sanguinis ex ore & faucibus eruptio.

LXXXIV. HÆMOPTYSIS.

Sanguinis e pulmonibus aut trachea rejectio per tussim

LXXXV. STOMACACE.

Gingivarum cruentatio.

LXXXVI. ODONTIRRHŒA.

Sanguinis ex alveolo dentis evulsi eruptio.

LXXXVII. OTORRHŒA.

Sanguinis ex aure effluxus.

LXXXVIII. OPHTHALMORRHAGIA.

Sanguinis ex oculo ejusve cantho aut palpebris eruptio.

LXXXIX. HÆMATEMESIS.

Vomitus cruentus; sanguinis e ventriculo per vomitum rejectio.

XC. HEPATIRRHŒA.

Fluxus hepaticus; diarrhœa acquosa rubella instar loturæ carnium recentium.

XCI. CATARRHEXIS.

Sanguinis puri ex alvo profusio.

XCII. HÆMATURIA.

Mictio e renibus cruenta, quæ sanguine urinæ exquisite permixto perfunditur, ut ea quasi dilutus & tenuis sit sanguis.

XCIII. CYSTIRRHAGIA.

Mictio cruenta e vesica dolorifica, qua sanguis urinam non æqualiter perfundit, ac in imo subsidens in grumos concrescit; ejus quoque portio aut grumus interdum citra urinam excidit: *Hæmorrhoides vesicæ* appellant.

XCIV. STYMATOSIS.

Hæmorrhagia penis sine urina, nulloque voluntatis arbitrio.

XCV. HÆMATOPEDESIS.

Sudor sanguineus, sanguinis tenuis e poris cutis eruptio.

XCVI. MENORRHAGIA.

Sanguinis inordinata & larga ex vulva profusio.

XCVII. ABORTIO.

Sanguinis ex utero gravido profluvium, cum fœtu immaturo aut mola subsequente.

II. APOCENOSES.

XCVIII. CATARRHUS.

Tussis frequens, acris, cum raucitate.

XCIX. EPIPHORA.

Lacrymæ involuntarium profluvium.

C. CORYZA.

Catarrhus narium cum ſeri tenuioris deſtillatione.

CI. OTOPUOSIS.

Puris ex aure effluxus, catarrhus auris ſordidus.

CII. OTOPLATOS.

Humiditatis olidæ retro aurem excretio.

CIII. PTYALISMUS.

Copioſa ſalivæ profuſio.

CIV. VOMICA.

Subitanea, copioſa puris aut ſanguinis nigri e pulmonibus rejectio per tuſſim.

CV. DIARRHOEA.

Copioſum ſinceriorum humorum ex alvo proflu vium, ſine vehementi ſenſu doloris.

CVI. PUORRHOEA.

Puris ſinceri ex alvo excretio.

CVII. DYSENTERIA.

Frequens, pauca torminoſa ac teneſmodes alvi dejectio.

CVIII. LIENTERIA.

Lævitas inteſtinorum, qua quæ per alvum deſcendunt, alimentis aſumptis ſubſtantia & colore finitima.

CIX. COELIACA.

Lævium æqualium & quaſi chyli aut cremoris ſpecie dejectio.

CX. CHOLERA.

Vomitus bilioſi multi alvique dejectiones, cum periadynia.

CXI. PITUITARIA.

Mera pituitæ, loco ſtercoris, excretio diuturna cum, contabeſcentia.

CXII. LEUCORRHOIS.

Pituitæ sinceræ & cruentæ ex alvo excretio tenesmodes, periodica.

CXIII. ENEURESIS.

S. incontinentia urinæ, mictio urinæ involuntaria constans, sine acrimoniæ & doloris sensu.

CXIV. DIURESIS.

Immodica urinæ prorsus aqueæ excretio, in morbo spastico, periodica.

CXV. DIABETES.

Immodicum urinæ profluvium diuturnum, sub quo corpus conta bescit.

CXVI. PUOTURIA.

Mictio purulenta.

CXVII. CHYLARIA.

Urinæ mucosæ, albæ, paucæ, & quasi verminosæ, excretio. *Glus Linn.*

CXVIII. GONORRHŒA.

Invita seminis, liquoris, prostatarum, ichoris, citra venerem, citra libidinis insomnia, citraque colis tentiginem, profusio.

CXIX. LEUCORRHŒA.

Fluor albus; nimia muci aut ischoris ex vulva profusio.

CXX. EXONEIROSIS.

Pollutio involuntaria, at jucunda seminis ex rigido cole profusio.

CXXI HYDROPEDESIS.

Sudor immodicus.

CXXII. GALACTIA.

Lactis ex mammis stillicidium.

CXXIII. HYPERCATHARSIS.

Immodica purgatio ex operatione violentioris medicamenti colliquantis, urentis, stimulantis.

CXXIV. ECPHYSE.

Flatuum ex urethra aut uteri vagina eruptio.

CXXV. DYSODIA.

Exhalatio fœtida ex toto corpore, aut ejus parte.

III. EPISCHESES.

CXXVI. GRAVEDO.

Catarrhus narium impeditus cum carebaria, voce haud bene ſonora, ſpiritu nonnihil difficili, qui nec niſi hiante ori duci poteſt.

CXXVII. FLATULENTIA.

Flatuum impedita ſupra infraque expulſio, cum intumeſcentia ventris.

CXXVIII. OBSTIPATIO.

Stercoris excretio impedita.

CXXIX. ISCHURIA.

Urinæ ſuppreſſio.

CXXX. AMENORRHŒA.

Menſtrui ſanguinis ex utero fluxus, ex toto vel ex parte cohibitus.

CXXXI. DYSLOCHIA.

Lochiorum ſuppreſſio aut imminutio.

CXXXII. DEUTERIA.

Secundinarum retentio.

CXXXIII. AGALAXIS.

Lactis defectus.

IV. DOLORES.

CXXXIV. ANXIETAS.

Molesta sensatio circa praecordia, quae praesentem rerum statum fastidit.

CXXXV. BLESTRISMUS.

Incontinens corporis jactatio & inquietudo.

CXXXVI. PRURITUS.

Dolorifica voluptas in cute, hominem ad scalpendum excitans.

CXXXVII. CATAPSYXIS.

Sensus frigoris dolorificus in parte musculosa aut cutanea.

CXXXVIII. RHEUMATISMUS.

Cutis & musculorum dolor. *Lumbago*, *ischias*, *glossagra*, & *pleurodyne Sauvag.* sunt species.

CXXXIX. ARTHRITIS.

Articulorom dolor; cujus species *chiragra* & *gonagra*.

CXL. CEPHALALGIA.

Capitis dolor brevis.

CXLI. CEPHALÆA.

Capitis dolor longus.

CXLII. CLAVUS.

Capitis dolor in vertice cum sensu frigoris.

CXLIII. HEMICRANIA.

Capitis dolor tensivus alterutrum ejus latus occupans.

CXLIV. CAREBARIA.

Molestia capitis velut gravitas quaedam.

CXLV. ODONTALGIA.

Dolor dentium.

CXLVI. HÆMODIA.

Dentium stupor cum dolore.

CXLVII. ODAXISMUS.

Gingivarum dolor infantilis in dentitione.

CXLVIII. OTALGIA.

Dolor auris internæ & externæ.

CXLIX. ACATAPOSIS.

Deglutitio difficilis.

CL. CIONIS.

Dolorifica uvulæ craſſities.

CLI. HIMANTOSIS.

Ejuſdem ſolito major longitudo & gracilitas.

CLII. CARDIOGMUS.

Anxietas cordis dolorifica, cum ſenſu ponderis & pulſatione.

CLIII MASTODYNIA.

Mammarum dolor.

CLIV. SODA.

Dolor urens calidus e ventriculo in fauces aſſugens.

CLV. PERIADYNIA.

Ventriculi dolor.

CLVI. PNEUMATOSIS.

Dolorifica ventriculi a flatibus diſtentio.

CLVII. CARDIALGIA.

Ventriculi dolor vehemens ſpaſticus cum nauſea ſæpeque vomitu.

CLVIII. ENCAUSIS.

Ardor in ſtomacho cum inextinguibili ſiti.

CLIX. NAUSEA.

Inane vomendi deſiderium.

CLX. COLICA.

Dolor ſpaſticus inteſtinorum cum obſtipatione, nauſea, & vomitu.

CLXI. EILEMA.

Dolor in inteſtino fixus velut clavi muro impacti.

CLXII. ILEUS.

Colica acuta cum vomitu demum excrementorum.

CLXIII. STRANGURIA.

Urinæ denſæ rubræ mictio parca, frequens, ardore in urethra excepta.

CLXIV. DYSURIA.

Urinæ ſtillicidium dolorificum citra ardorem in urethra.

CLXV. LITHIASIS.

Difficilis mictio a calculo in organis uropœticis, cum arenulis in urina ſubſidentibus.

CLXVI. TENESMUS.

Impetuoſa, dolorifica deſidendi cupiditas, qua nihil præter pauca mucoſa & cruenta egeritur.

CLXVII. CLUNESIA,

Dolor in podice. *Proctica Sauvageſ. & Linn.*

CLXVIII. CEDMA.

Dolor in partibus genitalibus. *Pudendagra Linn.*

CLXIX. HYSTERALGIA.

Dolor ventris parturientium ſimilis.

CLXX. DYSMENORRŒA.

Profluvium ſanguinis uterini menſtruum dolorificum.

CLXXI. DYSDOCIA.

Partus laborioſus, difficilis.

CLXXII. ATOCIA.

Partus difficillimus, qui ſine arte prorſus abſolvi non poteſt.

CLXXIII. PRIAPISMUS.

Colis erectio dolorifica permanens, citra libidinis ſtimulum.

CLXXIV PSORIASIS.

Durities ſcroti cum intenſa prurigine, & interdum quoque exulceratione.

CLXXV. PODAGRA.

Dolor rheumatico-arthiticus in pede acutus.

CLXXVI. OSTEOCOPUS.

Dolor in osse fixus.

CLXXVII. PSOPHOS.

Strepitus ossium.

CLXXVIII. VOLATICA.

Dolor per tractum majorum cutis vasorum oberrans.

CLXXIX. EPIPHLOGISMA.

Ardor alicujus partis velut a pruna obortus. In aure dicitur *Pyrosis*.

V. SPASMI.

CLXXX. TETANUS.

Totius corporis aut solius cervicis distentio rigida, dolorifica, acuta, qua flecti haud possit.

CLXXXI. OPISTHOTONUS.

Eadem distentio, sed qua corpus in posteriora curvatur.

CLXXXII. EPISTHOTONUS.

Eadem, sed qua corpus in anteriora curvatur.

CLXXXIII. CATOCHUS.

Tetanus cum privatione sensuum.

CLXXXIV. TREMOR.

Levior totius corporis aut membri singularis concussio sine frigoris sensu.

CLXXXV. FRIGUS.

Cum extremæ partes membrorum inalgescunt.

CLXXXVI. HORROR.

Totius corporis algor cum tremore.

CLXXXVII.

CLXXXVII. RIGOR.

Idem & violentior cum trismo & sensu frigoris in interioribus partibus.

CLXXXVIII. EPILEPSIA.

Agitatio convulsiva universalis, chronica, periodica cum oppressione sensoriorum, exituque spumæ ex ore.

CLXXXIX. ECLAMPSIA.

Epilepsia acuta.

CXC. HIERANOSOS.

Agitatio corporis vel artuum convulsiva, continua, chronica, cum integritate sensuum.

CXCI. CONVULSIO.

Agitatio corporis vel artuum violenta, periodica, cum integritate sensuum.

CXCII. RAPHANIA *Linn.*

Convulsio cum spastica articulorum contractione & dolore immani, periodica.

CXCIII. CHOREA.

Convulsio saltatoria aut procursiva. *Tarantismus* est species.

CXCIV. CRAMPUS.

Digitorum manuum pedumque, aut crurum extensio vel contractio violenta, dolorifica, brevis.

CXCV. SCELOTYRBE.

Immanis continua crurum contractio & obrigescentia

CXCVI. ANGONE.

Faucium præfocatio acuta, sine inflammatione. *Agina convulsiva & Suffocatio hysterica* ejus sunt species.

CXCVII. GLOSSOCELE.

Linguæ violenta, acuta, extrusio.

CXCVIII. GLOSSOCOMA.

Linguæ violenta, acuta, revulsio.

CXCIX.

CXCIX. HIPPOS.

Oculorum conſtans agitatio; malum ab ortu contractum.

CC. ILLOSIS.

Oculorum perverſio acuta.

CCI. CINCLESIS.

Palpebrarum nictitatio perpetua.

CCII. CATACLASIS.

Alterutrius oculi occluſio ſpaſtica, acuta.

CCIII. CILLOSIS.

Cilii ſuperioris perpetuus tremor.

CCIV. STERNUTATIO.

Membranæ narium agitatio convulſiva, impetuoſam aeris inſpirationem, ſimilemque mox expulſionem per nares cum ſtrepitu inducens.

CCV. TUSSIS.

Convulſiva & ſonora aeris e pulmonibus expulſio.

CCVI. CLAMOR.

Vocis anxia exaltatio.

CCVII. TRISMUS.

Stridor dentium inter ſe colliſorum.

CCVIII. CAPISTRUM, *ſ. Spaſmus Maxillæ inferioris.*

Immobilitas ejus, qua os arcte clauditur.

CCIX. SARDIASIS. *ſ. Spaſmus Cynicus.*

Spaſmus muſculorum faciei & oris, quo in obliquum torquentur.

CCX. GELASMUS, *ſ. Riſus Sardonius.*

Involuntarius riſus, ſub quo animus non gaudio, ſed dolore atque iracundia plerumque effertur.

CCXI. INCUBUS,

Suffocatio in inſomnio terrifico, reſpirationem offendens, vocemque intercipiens.

CCXII.

CCXII. SINGULTUS.

Inspiratio convulsiva subitanea velocissima, sonora recurrens.

CCXIII. PALPITATIO.

Cordis, visceris, musculi, tendinis, arteriæve, temporaria agitatio.

CCXIV. VOMITUS.

Violenta contentorum in ventriculo per os rejectio.

CCXV. RUCTUS.

Violenta flatus ventriculi inclusi per os explosio.

CCXVI. RUMINATIO.

Cum cibus e ventriculo in os vicissim masticandus iterumque deglutiendus, citra voluntatem impellitur.

CCXVII. ŒSOPHAGISMUS. *s. Spasmus œsophagi.*

Ciborum deglutitorum in œsophago subsistentium remora dolorifica.

CCXVIII. HYPOCHONIDRASIS.

Anxietas præcordialis cum spasmis ventriculi ac intestinorum, variisque congestionibus conjuncta, chronica.

CCXIX. HYSTERIA.

Eadem in mulieribus.

CCXX. PHLOGOSIS. *s. Æstus volaticus.*

Subitus fugaxque æstus cum rubore faciei.

CCXXI. DIGITIUM.

Primæ phalangis digitorum invita & constans incurvatio.

VI. ADYNAMIÆ.

CCXXII. LASSITUDO.

Ingrata & gravativa ſenſatio impotentiæ ad motum

CCXXIII ASTHENIA.

Languor aut debilitas corporis.

CCXXIV. TORPOR.

Senſus motuſque imminutus in parte carnea.

CCXXV. ADYNAMIA.

Impotentia, qua ſe ægri nullo modo movere aut in lecto erigere poſſunt.

CCXXVI. PARALYSIS.

Senſus motuſve aut utriuſque defectus in ſingulari parte externa.

CCXXVII. PARAPLEGIA.

Omnium partium ſub collo, aut ſaltem medii corporis artuumque inferiorum paralyſis.

CCXXVIII. HEMIPLEGIA.

Paralyſis alterutrius lateris.

CCXXIX. APOPLEXIA..

Subita functionum animalium ceſſatio, cum ſtertore & magno pulſu.

CCXXX. CATALEPSIS. *ſ. Catoche.*

Subita functionum animalium ceſſatio, in qua correptus vigilantis formam figuramque retinet, articuliſque eum ſitum, qui ipſis datur.

CCXXXI. CARUS.

Veternus ſopor, liberam reſpirationem ſine ſtercore conſervans, ex quo ægri vix excitantur.

CCXXXII. COMA, *ſ. Cataphora.*

Sopor in quo ægri vellicati evigilant, & mox in ipſum relabuntur.

CCXXXIII. SOMNOLENTIA.

Inclinatio in somnum justo major.

CCXXXIV. HYPOPHASIS.

Albi oculorum inter dormiendum subapparitio.

CCXXXV. PTOSIS.

Impotentia attollendi palpebram superiorem.

CCXXXVI. AMBYOPIA.

Visus imbecillitas integro oculo.

CCXXXVII. MYDRIASIS.

Pupillæ dilatatio, quæ visioni nocet.

CCXXXVIII. AMAUROSIS.

Cæcitas sine sensibili oculorum labe, præter mydriasin.

CCXXXIX. CATARACTA.

Cæcitas cum obscurata lente, retro pupillam conspicua.

CCXL. SYNIZESIS.

Cæcitas cum pupillæ coalitione.

CCXLI. GLAUCOMA.

Cæcitas turbatis humoribus & oculo flaccido.

CCXLII. ACHLYS.

Corneæ obscuritas visum imminuens aut tollens.

CCXLIII. NYCTALOPIA.

Visus noctu saltem contingens.

CCXLIV. HEMERALOPIA.

Visus noctu abolitus.

CCXLV. HEMALOPIA.

Visus dimidiatus.

CCXLVI. DYSICOIA.

Imbecillitas auditus.

CCXLVII. SURDITAS.

Auditus abolitus.

CCXLVIII. ANOSMIA.

Odoratus abolitus.

CCXLIX. APOGEUSIS.

Gustus abolitus.

CCL. ASAPHIA.

Vocis obscuritas.

CCLI. CLANGOR.

Vox acuta cum stridore.

CCLII. RAUCITAS.

Vox aspera & obscura, quæ vix nisi a prope adstantibus exaudiri potest.

CCLIII. APHONIA.

Vocis privatio.

CCLIV. LEPTOPHONIA.

Vitium vocis nimium gracilis.

CCLV. OXYPHONIA.

Vox acuta, qualis edi solet cum ejulatu & planctu.

CCLVI. RHENOPHONIA.

Vox nasalis, quæ ex naribus haud simul editur.

CCLVII. MUTITAS.

Loquelæ privatio.

CCLVIII. TRAULOTIS, *Blæsitas.*

Vitiosa literarum *ʃ* & *r* pronunciatio.

CCLIX. PSELLOTIS. *Balbuties.*

Cum inter pronunciandum aut litera aut syllaba aufertur & eliditur.

CCLX. ISCHNOPHONIA.

Vitium pronunciationis, quo syllaba syllabæ cito copulari non potest.

CCLXI. BATTARISMUS.

Vitium pronunciationis, quo sermo præcipitatur, unaque syllaba aliquoties cum celeritate repetitur.

CCLXII. SUSPIRIUM.

Inſpiratio lenta, profunda, gemebunda.

CCLXIII. OSCITATIO.

Inſpiratio tarda, profunda, aperto ore.

CCLXIV. PANDICULATIO.

Oſcitatio cum artuum extenſione.

CCLXV. APNŒA.

Reſpiratio adeo rara & parva, ut plane ſpiritus periiſſe videatur.

CCLXVI. MACROPNŒA.

Reſpiratio per larga intervalla contingens.

CCLXVII. DYSPNŒA.

Reſpirandi difficultas continua, levior.

CCLXVIII. ASTHMA.

Reſpiratio difficilli periodica, chronica cum ſenſu anguſtiæ in faucibus.

CCLXIX. ORTHOPNŒA.

Reſpiratio ſuffocatoria acuta, non niſi erecto cervice peragenda.

CCLXX. PNIGMA, *Catarrhus ſuffocativus*.

Difficillima reſpiratio, cum ſubitanea ſenſuum motuſque interceptione, ſtertore pulſuque intermittente.

CCLXXI. RENCHUS, ſ. *Stertor*.

Sonus ex naribus editus.

CCLXXII. RHOCHMOS, ſ. *Ronchus*.

Sonus ſtertorosus intra fauces.

CCLXXIII. LIPOTHYMIA.

Subita ſenſus motuſque interceptio, cum ſudore frigido, tinnitu aurium, pulſu ac reſpiratione debili.

CCLXXIV. SYNCOPE.

Eadem gravior, nullo pulſu, nulla reſpiratione perceptibili, abolitoque omni ſenſu, & extincto calore.

CCLXXV. ASPHYXIA.

Abolitio pulsus.

CCLXXVI. APEPSIA.

Concoctionis ciborum in ventriculo privatio.

CCLXXVII. DYSPEPSIA.

Tarda difficilisque concoctio.

CCLXXVIII. DIAPTHORA.

Ciborum corruptio in ventriculo.

CCLXXIX. ANOREXIA.

Inappetentia sine fastidio ciborum.

CCLXXX. ANATROPE.

Inappetentia nauseabunda.

CCLXXXI. ADIPSIA.

Sitis defectus.

CCLXXXII. ACYISIS.

Sterilitas muliebris; conceptionis defectus.

CCLXXXIII. AGENESIA.

Rei venereæ impotentia in viro: libidinis defectus.

CCLXXXIV. ANODYNIA.

Doloris defectus.

VII. HYPERÆSTHISES.

CCLXXXV. ANTIPATHIA.

Certarum rerum visu, olfactu, aut gustu percipiendarum, talis aversatio, ut ex earundem perceptione gravia symptomata inducantur.

CCLXXXVI. AGRYPNIA.

Somni defectus.

CCLXXXVII. PHANTASMA.

Perceptio corporum ante oculos obversantium, quæ non adsunt.

CCLXXXVIII.

CCLXXXVIII. CALIGO.

Qua subito visui omnia nigra se repræsentant.

CCLXXXIX. HÆMALOPIA.

Qua omnia rubra apparent.

CCXC. MARMARYGE.

Fulgor ante oculos coruscans.

CCXCI. DYSOPIA.

Visus duplicatus.

CCXCII. SUSURRUS.

Soni non existentis perceptio.

CCXCIII. VERTIGO.

Imaginatio, qua omnia homini cum semetipso circummagi videntur.

CCXCIV. APOGEUSIA.

Sapor in ore depravatus.

CCXCV. POLYDIPSIA.

Continuum potus desiderium.

CCXCVI. BULIMUS.

Vehemens fames cum lipothymia.

CCXCVII. ADDEPHAGIA.

Voracitas.

CCXCVIII. CYNOREXIA.

Fames canina; addephagia cum vomitu subsequente.

CCXCIX. ALLOTRIOPHAGIA.

Rerum non esculentarum devoratio arbitraria.

CCC. MALACIA.

Earundem anxia appetentia.

CCCI. PICA.

Certi cibi assumendi, aut rei olfaciendæ vehemens desiderium.

CCCII. BOMBUS.

Murmur ex flatibus, quod auribus percipitur.

CCCIII. CELSA.

Sensus flatus, vaporis, aut formicarum oberrantium subter cute.

VIII. CACHEXIÆ.

CCCIV. CACHEXIA.

Corpus grave atque iners, colore pallido squalidum.

CCCV. CHLOROSIS.

Cachexia in virginibus colore ex pallido virescente.

CCCVI. ICTERUS.

Cachexia cum flavo cutis colore, urina obscure rubra, tingente immissa linteamina colore croceo.

CCCVII. MELANCHLORUS.

Cachexia cum subnigro cutis colore, urina de nativo statu haud decedente.

CCCVIII. ATROPHIA.

Extenuatio corporis, aut partis ejus, sine febre lenta & hectica.

CCCIX. TABES.

Extenuatio corporis cum febre lenta vel hectica, at sine dyspnœa & tussi.

CCCX. PHTHISIS.

Extenuatio corporis cum febre lenta vel hectica, dyspnœa, & tussi (*).

CCCXI. HYDROTHORAX.

Cachexia cum dyspnœa & effusione aquæ intra pectus strepitum concussione intus facientis.

CCCXII.

(*) In *atrophia* sola pinguedo absumitur, nec æque restituitur, in *tabe* & *phthisi* caro simul minuitur.

CCCXII. RACHITIS.

Atrophia infantum cum epiphysium protuberantia.

CCCXIII. ANASARCA.

Totius corporis intumescentia, aquosa, mollis, digiti impressi vestigium aliquandiu retinens, cum pallore cutis.

CCCXIV. ASCITES.

Tumor abdominis, scroti, & crurum aquosus, cum atrophia superiorum partium.

Abdomen impulsum sonum collectæ permotæque intus aquæ præbet.

CCCXV. HYDROCYSTIS.

Hydrops saccatus pleuræ, peritonæi, aut visceris abdominalis.

CCCXVI. TYMPANITES.

Tumor abdominalis renitens, pulsatione sonitum edens cum obstipatione & atrophia.

CCCXVII. HYSTEROPHYSE.

Tumor hypogastrii ab utero flatu distento.

CCCXVIII. SCORBUTUS.

Cachexia cum lassitudine, maculis artuum lividis, stomacace, ulceribus.

CCCXIX. SIPHYLIS.

Cachexia contagiosa ex contagio venereo, cum tumoribus ossium & ulceribus faucium partiumque obscœnarum, prægressis plerumque bubonibus aut gonorrhœa.

CCCXX. LEPRA *Græcorum*, *s. Psora*

Pertinacissima scabies totius corporis vel partis, sicca, dura, aspera, serpentibus pustulis furfuracea.

CCCXXI. ELEPHANTIASIS, *s. Lepra Arabum*.

Mutatio cutis in tumores lividos, duros, saniem fœtidam crustosam emanantes.

CCCXXII. ELEPHANTIA *Arabum.*

Eadem duntaxat in pede valde tumido & duro.

CCCXXIII. PLICA, *s. Rhopalosis.*

Vitium capillorum capitis aut pubis, quo ab humore glutinoso ita in cirrhos contorquentur, ut explicari nullo modo possint.

CCCXXIV. PHTHIRIASIS.

Morbus pedicularis, quo pediculi variis in corporis partibus copiose emergunt.

CCCXXV. PHYSCONIA.

Intumescentia abdominis longa, a magnitudine habituve visceris mutato.

CCCXXVI. PARACYISIS.

Graviditas a natura abhorrens retardatione aut alieno situ foetus extra uterum.

CCCXXVII. GANGRÆNA.

Inflammatæ partis livor & mortificatio fœtida, cum pustulis ichorosis, sensus doloris habens.

CCCXXVIII. SPHACELUS.

Perfecta mortificatio, qua pars sensum motum & innatum calorem tota amisit, fitque prorsus nigra, mollis, putris, & cadaverosa.

IX. PARANOIÆ.

CCCXXIX. ATHYMIA.

Animi abjectio, consternatio, tristitia, desperatio.

CCCXXX. DELIRIUM. *Paraphrosyne.*

Mentis alienatio in febre haud constans, nec furibunda. *Carpologia* ejus est species.

CCCXXXI. MANIA.

Insania longa, ridicula aut furibunda. *Furorem uterinum* & *satyriasin* pro speciebus habeo.

CCCXXXII.

CCCXXXII. MELANCHOLIA.

Insania longa cum mœstitia ac timore. *Nostalgia* ejus species est.

CCCXXXIII. ECSTASIS.

Insania, quæ brevi tempore durat.

CCCXXXIV. ECPLEXIS.

Excessus mentis, qui ex repentina aliqua perturbatione ab externa causa affertur.

CCCXXXV. ENTHUSIASMUS.

Est veluti cum quidam in sacris faciendis mente capiuntur, si qua viderint audiverintve.

CCCXXXVI. STUPIDITAS, *Morosis*, *Fatuitas*.

Mentis imminuta & infirmata functio, seu quædam ignavia, citra delirium & soporem.

CCCXXXVII. AMENTIA, *Anoia*.

Imaginationis vel mentis occasus atque privatio; qua jam ab ipso ortu affecti vix mentis inopia loqui discunt.

CCCXXXVIII. OBLIVIO.

Memoriæ privatio.

CCCXXXIX. SOMNIUM.

Visum, quod in somno occurrit, tanquam verum si existimatum. *Pavor* ejus est species.

CCCXL. HYPNOBATASIS.

Somnium in quo homo assurgit, ambulat, & diversa vigilantium opera exercet.

X. VITIA.

I. INFLAMMATIONES.

CCCXLI. OPHTHALMIA.

Inflammatio albi oculorum.

CCCXLII. BLEPHAROTIS.

Inflammatio palpebrarum.

CCCXLIII. ERYSIPELAS.

Inflammatio lata cutis, quæ ſplendet & leviter ac æqualiter tumet.

CCCXLIV. HIEROPYR.

Eryſipelas cum eminentibus ardentibus puſtulis. *Zoſter* dicitur, ſi abdominis cutem occupat.

CCCXLV. PARONYCHIA.

Inflammatio dolorifica in ſummitate digitorum.

CCCXLVI. ONYCHIA.

Inflammatio digiti lateralis ab ungue profundius in cutem demerſo.

CCCXLVII. ENCAUSIS.

Inflammatio cutis ab uſtione.

CCCXLVIII. PHIMOSIS.

Inflammatio, aut œdematodes tumor præputii, quo glans nudari non poteſt.

CCCXLIX. PARAPHIMOSIS.

Inflammatio præputii, retro glandem adducti, ut eam tegere non poſſit.

CCCL. PERNIO.

Cutis rubor ardens, pruriens, a frigore; in exulcerationem tendens.

II. TUMORES.

CCCLI. PHLEGMONE.

Tumor dolens renitens inflammatorius cum rubore, ovi ſaltem gallinacei magnitudine.

CCCLII.

CCCLII. FURUNCULUS.

Tuberculum acutum apostematodes, ovum columbinum magnitudine non excedens.

CCCLIII. ANTHRAX.

Quasi malignus furunculus, qui partem mox adurit, pustulas circum se ardentissimas ciet, tandem crusta nigra vel cinerea obducitur, & corruptae carnis globum excutit, qua excidente ulcus cavum sordidumque manet.

CCCLIV. ABSCESSUS.

Collectæ in inflammato loco materiæ in pus [aut in alienam substantiam conversio.

CCCLV. ONYX.

Abscessus inter corneæ laminas.

CCCLVI. HIPPOPYON.

Abscessus intra oculum.

CCCLVII. PHYGETHLON.

Phlegmone in glandulis emergens.

CCCLVIII. EMPYEMA.

Abscessus in thorace, latus aut partem ejus in tumorem attollens, cum febre hectica, prægressa pleuritide vel peripneumonia.

CCCLIX. PHYMA.

Tumor glandularum, simplici plegmone atque phygethlo minor, planior, minusque rubens ac dolens.

CCCLX. ECTHYMATA.

Tubercula ex cute subito erumpentia, modo colorem cutis non excedentia, modo rnbra fugacissima.

CCCLXI. URTICARIA.

Tubercula puncturis urticarum similia, rubra, prurientia, fugacia, acuta.

CCCLXII. PARULIS.

Tuberculum dolens inflammatum in gingivis.

CCCLXIII. EPULIS.

Tuberculum in gingivis ſine inflammatione.

CCCLXIV. ANCHYLOPS.

Tumor durus inflammatorius apoſtematodes in cantho oculi interno.

CCCLXV. PARAGLOSSA.

Lingua tumida.

CCCLXVI. CHILON.

Labium tumidum & inflammatum.

CCCLXVII. SCROPHULA.

Tumor glandularum colli & meſenterii indolens obduratus.

CCCLXVIII. BUBON.

Tumor glandulæ inquinalis.

CCCLXIX. BRONCHOCELE.

Tumor glandulæ thyreoideæ.

CCCLXX. PAROTIS.

Tumor glandulæ ejuſdem nominis.

CCCLXXI. GONGRONA.

Collum tumidum.

CCCLXXII. SPARGANOSIS.

Tumor mammarum in lactantibus a lactis copia.

CCCLXXIII. COILIMA.

Intumeſcentia abdominis ſubita, flatulenta.

CCCLXXIV. SCIRRHUS.

Tumor durus, indolens, concolor, renitens.

CCCLXXV. CANCER.

Tumor durus, dolore lancinante gravis, inæqualis, liveſcens aut nigricans.

CCCLXXVI. SARCOMA.

Carnis incrementum tuberculi tumoriſve ſpecies.

CCCLXXVII.

CCCLXXVII. POLYPUS.

Sarcoma intra nares; prælongum, pluribus appendicibus adharens.

CCCLXXVIII. CONDYLOMA.

Turberculum durum, pene indolens in ani margine; Ejus species *Ficus* & *Thymus* a figura ita dictæ.

CCCLXXIX. GANGLION.

Tumor durus, concolor, indolens tendini insidens.

CCCLXXX. RANULA, *Batrachus*.

Tumor ad frenulum linguæ folliculosus, materiam spissam aut tofaceam complexus.

CCCLXXXI. TERMINTHUS.

Tuberculum rotundum, nigrum, præsertim in tibiis enascens, humorem glutinosum & subrubrum exulceratione emittens.

CCCLXXXII. ŒDEMA.

Tumor frigidus, laxus, mollis, indolens, circumscriptus aut diffusus, presso digito cedens.

CCCLXXXIII. ENCEPHALOCELE.

Cerebrum per hiatum calvæ extrorsum eminens.

CCCLXXXIV. HYDROCEPHALUM.

Capitis monstrosus tumor a collecta aqua in cute aut subter calvaria.

CCCLXXXV. HYDROPHTHALMIA.

Totius oculi cum aliquo dolore, adeo ut is palpebris operiri non possit.

CCCLXXXVI. SPINA *bifida*.

Tumor aquosus exiguus, in nucha aut inferiore spinæ loco, posterioribus vertebrarum dehiscentibus processibus emergens.

CCCLXXXVII. HYDROMPHALUS.

Tumor umbilici ab humore in eodem consistente.

CCCLXXXVIII. HYDROCELE.

Tumor tunicarum, quibus testis comprehenditur, aquosus.

CCCLXXXIX.

CCCLXXXIX. HYDROPS *Scroti*.

Tumor tunicæ ſcroti celluloſæ aquoſus.

CCCXC. STEATITES.

Abdominis intumeſcentia pinguedinoſa, graviditatem mentiens.

CCCXCI. PNEUMATOSIS.

Totius corporis intumeſcentia a flatu.

CCCXCII. EMPHYSEMA.

Tumor mollis, frigidus, in ſingulari parte ab aere celluloſum cutis habitum ingreſſo formatus.

CCCXCIII. HYSTEROPTOSIS.

Uteri vel vaginæ procidentia, protuberantiam intra aut extra vaginam faciens.

CCCXCIV. CYSTOPTOSIS.

Membranæ veſicæ urinariæ interioris protuberantia extra urethram.

CCCXCV. ARCHOPTOMA.

Inteſtini recti procidentia.

CCCXCVI. BUBONOCELE.

Tumor in inguine ex annulo muſculi obliqui ab ingreſſo inteſtino omentove, vel utroque conjunctim.

CCCXCVII. OSCHEOCELE.

Idem in ſcroto tumor.

CCCXCVII. OMPHALOCELE.

Idem ex umbilico.

CCCXCIX. MEROCELE.

Tumor aſi inteſtino infra ligamentum Poupartii elapſo.

CCCC. ENTEROCELE, *Ovularis*.

Hernia inteſtinalis foraminis ovalis, in ſuperiori & interna femoris parte prope perinæum.

CCCCI. ISCHIATOCELE.

Tumor ab inteſtino per hiatum intra ligamenta ſacroiſchiatica elapſo.

CCCCII.

CCCCII. ELYTROCELE.

Hernia in vagina uteri eminens.

CCCCIII. HYPOGASTROCELE.

Hernia inte stini ventralis.

CCCCIV. CYSTOCELE.

Prominentia vesicæ per musculi obliqui annulum, sub qua urina nonnisi presso exterius tumore redditur.

CCCCV. CYRTOMA.

Tumor particularis abdominis a flatibus.

CCCCVI. HYDRENTEROCELE.

Tumor ex hernioso & hydropico compositus.

CCCCVII. VARIX.

Tumor venæ mollis, lividus, aut niger.

CCCCVIII. ANEURISMA.

Tumor arteriæ mollis & pulsans.

CCCCIX. CIRSOCELE.

Tumor arteriarum venarumque spermaticarum inæqualis, renitens.

CCCCX. GASTROCELE.

Hærnia ventriculi; tumor inter cartilaginem xiphoiden & umbilicum inque ipso illo, post pastum auctus, dolore stomachi, vomitionibusque stipatus.

CCCCXI. HEPATOCELE.

Hernia ab hepate facta ventralis, vel umbilicalis congenita.

CCCCXII. SPLENOCELE.

Hernia a liene, ventralis aut inguinalis.

CCCCXIII. HYSTEROCELE.

Hernia uteri ventralis vel inguinalis.

CCCCXIV. HYGROCIRSOCELE.

Aquosus & varicosus tumor vasorum testis.

CCCCXV. SARCOCELE

Testis sarcoma aut scirrhus.

CCCCXVI. PHYSOCELE

Tumor a flatu herniam mentiens.

CCCCXVII. EXOSTOSIS.

Tumor in osse circumscriptus.

CCCCXVIII. HYPEROSTOSIS.

Tumor totius ossis.

CCCCXIX. PÆDARTHOROCACE.

Tumor ossis, dolore gravis, in exulcerationem tendens.

CCCCXX. ENCYSTIS.

Tumor frigidus, indolens, membrana inclusus, & materiam spissam complexus. *Atheroma*, *Steatoma*, *Testudo*, *Talpa*, *Meliceris* ejus species.

CCCCXXI. STAPHYLOMA.

Protuberantia corneæ obscuratæ.

CCCCXXII. STAPHYLOSIS

Procidentia uvæe ex cornea disrupta.

CCCCXXIII. FUNGUS.

Tumor ad articulum mollis, œdematodes.

CCCCXXIV. TOFUS.

Tuberculum ad articulum, tofacœm materiam complexum, in morbo articulari.

CCCCXXV. FLEMEN.

Tumor pedis circa talos.

III. EXTUBERANTIÆ*.

CCCCXXVI. VERRUCA.

Tuberculum supra cutim durum, asperum sessile vel pensile. Unde species *Athrobordon*, *Acrotymium*, *Myrmæcium*

CCCCXXVII.

(*) Extuberantiæ supra cutim eminent; tumores intra aut subter eam existunt.

CCCCXXVII. PORRUS.

Verruca in obſcœnis, mollis, madida, tactu dolens.

CCCCXXVIII. CLAVUS.

Tuberculum album rotundum, calloſum, in digitis plantiſque pedum.

CCCCXXIX. CALLUS, [ſ. *Tylloma*.]

1. Obdurata ſumma cutis ex labore in palmis aut pedum plantis. 2. Tunica pallida, dura, quæ ſine ſenſu eſt, in ulcere.

CCCCXXX. ENCANTHIS.

Intumeſcentia carunculæ lacrymalis.

CCCCXXXI. PLADAROTIS.

Tuberculum fungoſum, molle in interiori palpebra.

CCCCXXXII. PINNULA.

Excreſcentia corneæ tunicæ inhæreſcens.

CCCCXXXIII. PTERYGIUM.

Excreſcentia, membranulæ forma, rubra ſupra album oculi.

CCCCXXXIV. HORDEOLUM, *Crithe*.

Tuberculum calidum in abſceſſum fere deſinens, quod e palpebræ margine atque e cilio prorumpit.

CCCCXXXV. GRANDO.

uberculum durum, palpebræ fere ſuperiori innaſcens.

CCCCXXXVI. VARUS, *Ionthos*.

Tuberculum in facie durum, exiguum, rubrum, fere calloſum, diſperſum, multiplex.

CCCCXXXVII. GUTTA, *Roſacea*.

Varus quaſi confluens, cum rubedine aſpera maculoſa.

CCCCXXXVIII. EPHELIS.

Aſperitas quædam & durities mali coloris in facie.

CCCCXXXIX. ESOCHE.

Tuberculum intus in ano latens.

CCCCXL. EXOCHE.

Idem foris eminens.

IV. *PUSTULÆ & PAPULÆ.*

CCCCXLI. EPINYCTIS.

Pustula ardens, alba, subrubra aut sublivida, sanie subcruenta repleta, ciceris aut fabæ magnitudine, circa quam vehemens inflammatio & dolor.

CCCCXLII. PHLYCTÆNA.

Pustula subflavo humore distenta, lucida, illi similis, quæ ab ambustione erumpit, non manifesto dolens. In capite *Psydracium* vocatur.

CCCCXLIII. HERPES, *Serpigo*.

Papula ardens, cutem serpentibus minimis pustulis erodens. *Purpura scorbutica*, quam vocant, verissima *serpigo* est.

CCCCXLIV. SCABIES.

Durities cutis rubicundior, ex qua pustulæ oriuntur, quædam humidiores, quædam sicciores, saniem rodentem, exulcerantem, crustas formantem, & contagiosam complexæ.

CCCCXLV. AQUULA.

Pustula palpebrarum, vel pinguis quædam materia, cuti earundem substrata.

CCCCXLVI. HYDROA, *Boa*, *Sudamina*.

Pustulæ milii magnitudine, aquosæ, sine rubore & sine ullo dolore, ex sudoribus repente sparsim toto corpore emergentes.

CCCCXLVII. VARIOLA.

Pustula purulenta ex macula rubra in synocho emergens, contagiosa.

CCCCXLVIII. VARICELLA.

Pustula similis acuta, ex macula rubra in ephemera erumpens, non contagiosa.

CCCCXLIX. PURPURA.

Pustula pruriens, seminis milii magnitudine, rubra vel alba, lucida, acuta.

CCCCL. ENCAUMA, *Phlyzacion*.

Pustula ab ustione contracta.

V. *MACULÆ*.

CCCCLI. ECCHYMOMA.

Macula a sanguine per cutem quasi effuso livida vel nigra. Illa *Pelioma*, hæc *Melasma* speciatim dicitur.

CCCCLII. PETECHIÆ.

Maculæ pulicum morsui similes, magnitudine & colore, interdum tamen etiam lividæ in febre acuta.

CCCCLIII. MORBILLI.

Maculæ acutæ, rubellæ, latescentes, & plerumque confluentes, inque squamas defluentes, in febre acuta.

CCCCLVI. SCARLATÆ.

Maculæ latiores ac rubicundiores quam morbilli; subflavis nodulis ornatæ, in febre acuta.

CCCCLIV. LENTIGO.

Macula lentis magnitudine fusca, multiplex, in facie potissimum & in manibus emergens.

CCCCLVI. URTICARIA.

Maculæ subtumidæ, rubentes, prurientes, fugaces.

CCCCLVII. STIGMA.

Macula coloris coccinei.

CCCCLVIII. VIBEX.

Linea coccinea, qualis relinquitur e flagellis.

CCCCLIX. VITILIGO.

Macula fœda, fere subaspera, dispersa, serpens, alba (*Alphos*), aut nigra (*Melas*).

CCCCLX.

CCCCLX. LEUCE.

Alphos in qua albi & lanugini similes pili.

CCCCLXI. CYASMA.

Macula fusca in fronte, labiis, aut manibus gravidarum.

CCCCLXII. LICHEN. *Impetigo.*

Macula subrubra aspera, dura, sicca, cum ingenti prurigine.

CCCCLXIII. SELINE.

Macula alba in ungue.

CCCCLXIV. NEBULA.

Macula alba in cornea.

VI. *DISSOLUTIONES.*

1. *Apospasmata.*

CCCCLXV. VULNUS.

Solutio partis solidæ, mollis a causa mechanica, cum effluxu sanguinis.

CCCCLXVI. RUPTURA.

Solutio partis solidæ, mollis, internæ, ab interna causa, cum hæmorrhagia.

CCCCLXVII. RHAGAS.

Solutio cutis linearis arida.

CCCCLXVIII. FRACTURA.

Dissolutio ossis transversa aut obliqua.

CCCCLXIX. FISSURA.

Eadem recta, & ut ligni in longitudinem.

CCCCLXX. PLICATIO.

Ossium longorum concussio & contorsio citra fracturam.

CCCCLXXI. THLASIS.

Calvaria depressa citra fracturam.

CCCCLXXII.

CCCCLXXII. LUXATIO.

Dimotio ossis ex articulo suo perfecta.

CCCCLXXIII. SUBLUXATIO.

Cum os ab osse paulum recedit, eaque inter se dehiscunt.

CCCCLXXIV. DIACHALASIS.

Suturæ dimotio.

CCCCLXXV. ATTRITIO, *Ecthlimma.*

Dissolutio cuticulæ & cutis a compressione.

CCCCLXXVI. PRORIGO, *Pityriasis*

Resolutio cutis in tenues squamulas deciduas.

CCCCLXXVII. APOSYRMA.

Cutis abrasio, dilaceratio.

CCCCLXXVIII. ANAPLEUSIS.

Ossis corrupti squamula.

CCCCLXXIX. SPASMA.

Species solutionis continui tendinum, ligamentorum, citra rupturam, membri mobilitatem dolorificam inducens.

CCCCLXXX. CONTUSIO.

Cutis musculorumque conquassatio dolorifica, plerumque cum ecchymomate, at citra vulnus aut substantiæ manifestam deperditionem.

CCCCLXXXI DIABROSIS.

Erosio cutis a re acri & mordaci interna vel externa.

CCCCLXXXII. AGOMPHIASIS.

Dentium vacillatio.

CCCCLXXXIII. ESCHARA.

Cutis pars dehiscens a viva carne, & in crustam emortuam mutata.

CCCCLXXXIV. PIPTONYCHIA.

Unguis destructio & casus.

2. *Exulcerationes.*

CCCCLXXXV. CACOETHES.

Ulcus fere magnum oris tumentibus atque calosis.

CCCCLXXXVI. THERIOMA.

Ulcus in quo caro computrescit, atque mollis & cadaverosa reddita tetrum odorem exhalat.

CCCCLXXXVII. CARCINOMA.

Cancri conversio in ulcus, quod nigrum est, putridum, teterrimi odoris, & vehementer dolet.

CCCCLXXXVIII. PHAGEDÆNA.

Ulcus serpens, sed solam cutem rodens ac depascens.

CCCCLXXXIX. NOMA.

Ulcus quod non afflictam tantum partem, sed & vicinas exedit & absumit.

CCCCXC. SYCOSIS.

Ulcus, in quo multa caro excrescit.

CCCCXCI. FISTULA.

Ulcus altum, angustum, callosum.

CCCCXCII. SINUS.

Ulcus altum, quod ab angusto ore orsum intus curvatum ampliatur, sine callo.

CCCCXCIII. CARIES.

Ulcus in osse cum substantiæ & periostei corruptione, qua os spongiosum & friabile redditur.

CCCCXCIV. ACHORES.

Ulcuscula capitis manantia, plurimis ac minimis foraminulis, unde tenuis & glutinosa sanies exit, cutem perforantia.

CCCCXCV. CRUSTA *lactea*.

Achores in facie.

CCCCXCVI. FAVUS, *Cerion.*

Ulcus multis foraminibus, sed majoribus ac in achore,

re, pervium, ex quibus melli similis humor exit. Frequentius in capite, rarius in partibus musculosis, articulis, & plantis pedum, oritur.

CCCCXCVII. TINEA.

Ulcus capitis, quod densissimam, durissimam, aridissimamque crustam facit, serpens, pilis abbreviatis.

CCCCXCVIII. ARGEMON.

Exulceratio in cornea.

CCCCXCIX. ÆGILOPS.

Anchilops in ulcus conversum.

D. OZÆNA.

Ulcus narium putridum, e quo graveolens mucus exstillat.

DI. APHTHÆ.

Ulcera oris aut pudendorum, superficiaria, mucosa.

DII. INTERTRIGO.

Excoriatio cutis madens ac rubens, a sudoris vel urinæ acrimonia.

DIII. RHACOSIS.

Excoriatio scroti laxati.

VII. CONCRETIONES.

DIV. ANCYLOBLEPHARON.

Palpebrarum inter se conglutinatio.

DV. SYNIZESIS.

Pupillæ concretio.

DVI. DACRYOMA.

Punctorum lacrymalium coalitus.

DVII. ANCYLOGLOSSUM.

Linguæ concretio cum partibus subjectis, loquelam, suctum, deglutitionemque impediens.

DVIII. ANCYLOSIS.

Articulorum rigor, quo flexus eorundem aut extensio prohibetur.

DIX. CICATRIX.

Callus a conglutinato vulnere ulcereve relictus. *Leocoma* in cornea dicitur.

DX. DACTYLION.

Digitorum concretio.

XI. DEFORMITATES.

DXI. PHOXOS.

Cui caput acuminatum & fastigiatum.

DXII. GIBBER.

Protuberantia spinæ dorsalis, omoplatæ, ossiumve thoracis. Ejus species *Cyphosis*, *Lordosis*, *Scoliosis*, & *Seisis*.

DXIII. CAPUT *obstipum*.

Incurvatio colli.

DXIV. STRABISMUS.

Oculorum distortio & inæqualis motus.

DXV. MYOPIASIS.

Qua propinqua cernimus, remota vel parum vel nihil omnino.

DXVI. LAGOPHTHALMUS.

Vitium superioris palpebræ, si illa parum descendit, oculumque non claudit.

DXVII. TRICHIASIS.

Obversio ciliorum ad oculum.

DXVIII. ECTROPIUM.

Vitium palpebræ inferioris, quo parum sursum attollitur, sed hiat, aut extrorsum eversa est.

DXIX. ENTROPIUM.

Palpebræ inferioris inversio introrsum.

DXX. RHOEAS.

Defectus carunculæ lacrymalis, epiphoram faciens.

DXXI. RHYSSEMATA.

Rugæ & sordes, quæ in senili facie cernuntur.

DXXII. LAGOCHEILOS, *Labium leporinum*.

Divisum semel vel bis labium.

DXXIII. MALACOSTEON.

Ossium mollities.

DXXIV. HIRSUTIES.

Præternaturalis pilorum in parte generatio.

DXXV. CANITIES.

Capillorum color albus ante legitimam ætatem.

DXXVI. DISTRIX.

Exilitas pilorum, modum excedens.

DXXVII. XIRASIA.

Lanuginosa pilorum superficies, quasi pulvere sint conspersi.

DXXVIII. PHALACROTIS.

Pilorum casus, qui tabescentibus & ex morbo graviore convalescentibus evenit.

DXXIX. ALOPECIA.

Pilorum defluvium, aream relinquens. *Ophiasis* ejus species, item *Calvities* & *Pelada*.

DXXX. MADAROSIS.

Ciliorum defluvium.

DXXXI. PTILOSIS.

Eadem cum duritie callosa palpebrarum.

DXXXII. RODATIO.

Ciliorum decurtatio.

DXXXIII. PHALANGOSIS.

Ciliorum duplex vel triplex acies.

DXXXIV. COLOBOMA.

Defectus particulæ in parte aliqua corporis.

DXXXV. CERCOSIS.

Clitoris prælonga.

DXXXVI. CHOLOSIS.

Claudicatio, quando crus vel longius vel brevius fit.

DXXXVII. GRYPOSIS.

Unguium aduncatio.

DXXXVIII. NÆVUS.

Tuberculum, maculave congenita.

DXXXIX. MONSTROSITAS.

Deformitas multiplex congenita.

DXL. POLYSARCIA.

Corpulentia excedens.

DXLI. ISCHNOTIS.

Excessiva corporis gracilitas.

DXLII. RHICNOSIS.

Cutis corrugatio cum extenuatione corporis.

DXLIII. VARUS.

Cui crura introrsum versa.

DXLIV. VALGUS.

Cui crura extrorsum distorta.

DXLV. LEIOPODES, *Plancus*, *Plautus*.

Cui pedum medium ab interiori parte non est cavum, sed planum.

DXLVI. APELLA.

Cui præputium citra inflammationem ita contractum est, ut glandem non tegat.

DXLVII. HYPOSPADIÆOS.

Cui glans non antice, sed inferne sub frenulo perforata.

DXLVIII. URORHOEAS.

Cui urina ex urethra in perinæo exesa effluit.

DXLIX. ATRETA

Cujus anus aut naturalia occlusa.

DL. SANIODES.

Cui thorax tabulæ ritu est angustus.

DLI. CRIPSORCHIS.

Cujus unus testis aut ambo absconditi.

DLII. HERMAPHRODITUS.

Cui vitiosa naturalium conformatio, ita ut utriusque sexus adesse videantur.

DLIII. DIONYSISCUS.

Cui prope tempora duæ eminentiæ osseæ, quasi cornua, nascuntur.

DLIV. ARTETISCUS

Qui membri alicujus defectum patitur.

DLV. NEFRENDIS.

Qui dentibus caret.

DLVI. SPANOPOGON.

Qui raram habet barbam, & cui e mento pili excidunt.

DLVII. HYPERARTETISCUS.

Cui membrum aliquod superfluum.

DLVIII. GALIANCON.

Cui brachium altero brevius.

DLIX. GALBULUS.

Cui flavedo corporis congenita.

DLX. MOLA.

Massa carnea, fibrosa, vasculosa, ex utero excreta. Ovum deforme.

Nec silentio prorsus transeunda sunt vitia quædam occulta, quæ non nisi in cadaverum sectione se offerunt,

runte; velut hydrops pericardii, concretiones viscerum, ossescentiæ cartilaginum, membranarum, musculorumque, varices venarum majorum, hydatides, polypi cordis & vasorum, positura viscerum perversa, bullæ æreæ in venis & pulmonum superficie, aneurismata aortæ, angustiæ præternaturales vasorum & ductuum, ipsorumque concretiones.

PARS QUARTA.

SYSTEMA

MORBORUM

SYMPTOMATICUM,

AUCTORE

CLAR. JO: BAPT. MICH. SAGAR,

MED. DOCT. &c. &c.

Viennæ 1776.

CLAVIS CLASSIUM ET ORDINUM.

CLASSIS I. VITIA.

Symptomata externa levidensia, palpabilia, absque notabili cachexia, pyrexia.

ORDO I. MACULÆ.
II. EFFLORESCENTIÆ.
III. PHYMATA.
IV. EXCRESCENTIÆ.
V. CYSTIDES.
VI. ECTOPIÆ.
VII. DEFORMITATES.

CL. II. PLAGÆ.

Continui solutiones, morbi proprie chirurgici persæpe sat graves.

ORDO I. SOLUTIONES recentes plerumque cruentæ.
II. SOLUTIONES artificiales recentes cruentæ.
III. SOLUTIONES incruentæ.
IV. SOLUTIONES anomalæ.

CL. III. CACHEXIÆ.

Coloris, figuræ, molis, in corporis habitu sine notabili febre, depravatio.

ORDO I. MACIES.
II. INTUMESCENTIÆ.
III. HYDROPES PARTIALES.
IV. TUBERA.
V. IMPETIGINES.
VI. ICTERITIÆ.
VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

CL.

CL. IV. DOLORES.

Sensationes molestæ ad febres non referendæ.

ORDO I. DOLORES VAGI.
II. DOLORES CAPITIS.
III. DOLORES PECTORIS.
IV. DOLORES ABDOMINIS.
V. DOLORES EXTERNARUM.

CL. V. FLUXUS.

Exitus insolitus cujusvis solidi, vel fluidi, e corpore est character hujus classis.

ORDO I. SANGUIFLUXUS.
II. ALVIFLUXUS sanguinolenti.
III. ALVIFLUXUS non sanguinolenti.
IV. SERIFLUXUS.
V. AERIFLUXUS.

CL. VI. SUPPRESSIONES.

Meatuum impeditio, hinc excretionum consuetarum in sanitate retentio.

ORDO I. SUPPRESSIONES egerendorum.
II. SUPPRESSIONES ingerendorum.
III. SUPPRESSIONES imi ventris.

CL. VII. SPASMI.

Contractio invita constans, vel interpolata musculorum motum localem efficientium.

ORDO I. SPASMI TONICI PARTIALES.
II. SPASMI TONICI GENERALES.
III. SPASMI CLONICI PARTIALES.
IV. SPASMI CLONICI GENERALES.

CL. VIII. ANHELATIONES.

Motus ſpaſmodici iterati, defatigantes, pectoris cum reſpiratione ſonora, moleſta, abſque pyrexia notabili.

ORDO I. ANHELATIONES SPASMODICÆ.
II. ANHELATIONES OPPRESSIVÆ.

CL. IX. DEBILITATES.

Impotentia ſentiendi, appetendi, imaginandi, organa artuſque movendi more ad ſanitatem neceſſario.

ORDO I. DYSÆSTHESIÆ.
II. ANEPITHYMIÆ.
III. DYSCINESIÆ.
IV. LEIPOPSYCHIÆ.
V. COMATA.

CL. X. EXANTHEMATA.

Febris cum efflorescentia cutis varia maculoſa, puſtuloſa, phlyctænoidea, & aſthenia.

ORDO I. EXANTHEMATA contagioſa.
II. EXANTHEMATA non contagioſa.

CL. X. PHLEGMASIÆ.

Febris cum pulſu duro, dolore topico, inflammatione partis vel externæ, ſanguine miſſo cruſta inflammatoria tecto, urina plus tincta.

ORDO I. PHLEGMASIÆ muſculoſæ.
II. PHLEGMASIÆ membranaceæ.
III. PHLEGMASIÆ parenchymatoſæ

CL. XII. FEBRES.

Frigus, calor, pulſus frequens, reſpiratio aucta, viribus

bus artuum imminutis, depravatis, vel viribus vitalibus pulſu & reſpiratione vix mutatis, virium artuum ſumma proſtratio.

ORDO I. FEBRES CONTINUÆ.
II. FEBRES REMITTENTES.
III. FEBRES INTERMITTENTES.

CL. XIII. VESANIÆ.

Error mentis in imaginatione, appetitu, judicio, aut memoria.

ORDO I. HALLUCINATIONES.
II. MOROSITATES.
III. DELIRIA.
IV. VESANIÆ ANOMALÆ.

CLAS-

CLASSIS I.

ORDO I. MACULÆ.

Mutationes coloris nativi.

GENUS I. LEUCOMA. 1

Macula corneæ pelluciditatem vitians, opacans.

G. II. VITILIGO. 2

Macula corymbosa cum cutis depressione, locum fixum non servans in quo nascatur.

G. III. EPHELIS. 3

Maculæ umbrinæ glabræ, corymbosæ, raro partes tectas afficientes, acquisitæ.

G. IV. NÆVUS. 4

Macula congenita eminens, vel non, supra libellam cutis.

G. V. ECCHYMOMA. 5

Est macula nigricans, vel atro-rubra, cærulea, livescens, in gilvum successive desinens colorem, nata a sanguine in adiposam sub cute effuso.

O. II. EFFLORESCENTIÆ.

Aspredines, cum cuticulæ elevatione ultra libellam cutis humorales, exiguæ, gregales, absque pyrexia.

G. VI. PUSTULA. 6

Phyma aut vesicula colorata suppurans, diametri linearis, fastigiata, pure dehiscens, quandoque in crustam abiens; est ceu *furunculus* linearis diametri.

G. VII. PAPULA. 7

Phyma parvulum seu efflorescentia desquamanda, nec suppurans.

G. VIII.

8 G. VIII. PHLYCTHÆNA.

Vesicula parva fluido seroso plena, quæ deinde sponte rumpitur & fundit serum.

9 G. IX. BACCHIA.

Maculæ rubræ, vel efflorescentiæ nasi & partium adjacentium eidem, guttatæ, plus minus prominentes, asperæ, furfurascentes, diuturnæ; hoc genus ambigit inter maculas & efflorescentias.

10 G. X. VARUS.

Tumor pisi magnitudine plerumque sat durus, non suppurandus, aut desquamandus, pertinax in glandulis sebaceis. L.

11 G. XI. HERPES.

Papularum prurientium corymbus in squamas furfurfuraceas fatiscentium.

12 G. XII. EPINYCTIS.

Phlycthænarum atro-rubrarum congeries, maxime in tibiis, noctu potissimum acriter prurientium.

13 G. XIII. HEMEROPATHOS.

Papulæ rutilæ crura obsidentes, extra lectum illico apparentes, importune prurientes, in lecto evanescentes, diuturnæ.

14. G. XIV. PSYDRACIA.

Eflorescentia erysipelatosa absque febre notabili.

15 G. XV. HYDROA.

Exanthemata granis milii magnitudine & forma similia subito exorsa, phlycthænoidea, fugacia; absque asthenia, pyrexia, & prægressa oppressione præcordiorum, miliaria multis habita.

O. III. PHYMATA.

Tumores humorales solitarii.

G. XVI. ERYTHEMA. 16

Phyma rubrum calens, diffusum, sine febre.

G. XVII. ŒDEMA. 17

Phyma album, frigidum, indolens, molle, foveam ex pressione servans plerumque.

G. XVIII. EMPHYSEMA. 18

Phyma cuti concolor elasticum, ex pressione aut percussione crepitans.

G. XIX. SCIRRHUS. 19

Phyma durum, indolens, gravans, frigidum, in partibus glandulosis enatum, dum externum cuti quoque concolor observatur.

G. XX. INFLAMMATIO. 20

Est tumor sphæroideus rubore, calore, tensione, dolore pulsatili insignis, solitarius, plerumque sat extensus, in suppurationem sponte vergens; erysipelas non suppurat, & phlegmone habet semper pyrexiam conjunctam manifestam; inflammatio sæpius in phlegmone transit, vel phlegmone est gradus major inflammationis.

G. XXI. BUBO. 21

Phyma scirrhoso-phlegmonoideum in glandulis inguinalibus.

G. XXII. PAROTIS. 22

Tumor scirrhoso-phlegmonoideus parotidis glandulæ, in suppurationem lentissime vergens.

G. XXIII. FURUNCULUS. 23

Tumor inflammatorius cutaneus, seu subcutaneus, prominens, profunde ruber, sphæroideus, cujus centrum occupat vortex fibrosus digeri nescius; ordinario juglandis habet magnitudinem.

24 G. XXIV. ANTHRAX.

Phyma apice gangrænoſum, & in radio inflammatum.

25 G. XXV. CANCER.

Phyma ſcirrhoſum lancinans, vel phyma lancinans venis varicoſis profunde rubris, nigris, lividis obſitum, cinctum, facile ſanguinantibus.

26 G. XXVI. PARONYCHIA.

Inflammatorius tumor extremi digiti, cum dolore ſæpius perterebrante, calore, tenſione, & ſubinde cum rubore.

27 G. XXVII. PHIMOSIS.

Tumor fere ſemper inflammatorius præputii glandem incarcerans, aut excludens ad coronam hancce vinciendo.

O. IV. EXCRESCENTIÆ.

Tumores a ſolidis adauctis per ſuccum nutricium copioſiorem advectum, &c. in hoc converſum.

28 G. XXVIII. SARCOMA.

Excreſcentia carnis conſiſtentiam fere habens, plerumque rubra.

29 G. XXIX. CONDYLOMA.

Eſt excreſcentia eminens, vel non eminens, firmior carnibus & cute, mollior contra oſſibus, non elaſtica.

30 G. XXX. VERRUCA.

Excreſcentia cutanea prominens, vix ſenſibilis, indolens, prærupta ſeu aſpera ſuperficie.

31 G. XXXI. PTERYGIUM.

Eſt excreſcentia carnea, vel membranaceo-vaſculoſa ad oculi canthum in globo oculi exorta, alam expanſam utcunque referens, verſuſve corneam ſeſe extendens, creſcens.

G. XXXII. HORDEOLUM. 32

Tumor durus, aut excrescentia, plus minus mollis, plerumque cuti concolor, ferme sensu carens, in limbo palpebrarum enata, magnitudine sæpius granum hordei vel pisi æquans.

G. XXXIII. TRACHELOPHYMA. 33

Est tumor varius, non purulentus, neve inflammatorius, anticæ partis colli.

G. XXXIV. EXOSTOSIS. 34

Tumor ossis partialis, vel aliquando totius ossis, ut subinde in minoribus fit, ad ossa accedens.

O. V. CYSTIDES.

Tumores capsulati fluido referti.

G. XXXV. ANEURYSMA. 35

Cystis arteriosa cruore referta, ex pulsu & situ noscenda.

G. XXXVI. VARIX. 36

Dilatatio venæ rubra, nigrescens, ad pressionem recedens, iterumque subito rediens hac cessante, plerumque pruriens, mordicans.

G. XXXVII. MARISCA. 37

Tumor in margine ani, ex sanguine in textum vasorum minimorum varicosorum effuso efformatus, ruber, dolens, variæ formæ & magnitudinis. Vide Hæmorrhoidem. L.

G. XXXVIII. HYDATIS. 38

Cystis lymphæductuum dilatatorum, lympham vel serum continens.

G. XXXIX. STAPHYLOMA. 39

Cystis corneæ, ex dilatatione ejusdem, ectopia uveæ in cameram oculi anteriorem prolapsæ; hoc genus magis ad Ectopias spectat. Vide Caliginem. L.

40 G. XL. LUPIA.

Est cystis materiem pultis, vel mellis consistentiam referentem continens, haud purulentam, indolens, cuti concolor, loco mobilis.

41 G. XLI. HYDARTHRUS.

Hydrops vel in capsa articulari, vel in cellulis vicinis, haud in tunica propria; tumor est fluctuans sine coloris mutatione, pulsatione.

42 G. XLII. APOSTEMA.

Cystis purulenta, vel ichoroso-purulenta; noscitur ex fluctuatione, prægressa inflammatione, albedine, remissione doloris & pulsationis.

43 G. XLIII. EXOMPHALUS.

Cystis umbilicalis, fluido quopiam repleta, absque ectopia.

44 G. XLIV. OSCHEOPHYMA.

Cystis scroti variis fluidis turgens.

O. VI. ECTOPIÆ.

Partium solidarum e sua sede dimotio, sensibus obvia, continentibus has relaxatis.

45 G. XLV. EXOPHTHALMIA.

Ectopia oculi.

46 G. XLVI. BLEPHAROPTOSIS.

Est palpebræ utriusque, vel alterutrius, morbosa elongatio, retractio, intro vel extra versio, cum symptomatibus cuique ectopiæ propriis.

47 G. XLVII. HYPOSTAPHYLE.

Est procidentia seu elongatio uvulæ relaxatæ, inflammatæ, ulceratæ, incrassatæ, attenuatæ, vel bicornis.

48 G. XLVIII. PARAGLOSSA.

Est linguæ magnitudo minuta, vel aucta; vel plane solutio, aut elongato frenulo, in fauces ejusdem revolutio.

G. XLIX. PROPTOMA. 49

Est procidentia appendicum externarum in solita & morbosa, diversa a prædictis.

G. L. EXANIA. 50

Sphincteris ani, vel & intestini recti inversi procidentia extuberans, rubra, reducibilis semper extra strangulationem.

G. LI. EXOCYSTIS. 51

Vesicæ inversa membrana interior, soluta a reliquis per urethram foras pendet, & en exocystis!

G. LII. HYSTEROPTOSIS. 52

Est uteri procidentia tumorem sistens in vagina, vel quandoque extra genitalia pendentem, undique liberum, menses stillantem, saltem initio reponibilem cum doloribus hypogastrii, inguinum, urinæ difficultate, animi deliquiis; hæc omnia tactus obstetricius definit.

G. LIII. COLPOPTOSIS. 53

Tumor in sinu muliebri, vel extra pendens, annularis, mollis, perforatus (prolabitur subinde una tantum ruga vaginæ) per quod foramen digitus immissus altius orificium uteri, uterumque in sua quasi sede absque colpocele deprehendit, reponibilis; torquet insuper ægram dysuria, tenesmus.

G. LIV. GASTROCELE. 54

Est tumor in scrobiculo cordis vulgo dicto, vel ad minus supra umbilicum insolitus, herniosus, ventriculum, aut alia viscera illapsa, continens, cuti concolor, reponibilis, in decubitu dorsali sponte recedens, indolens, ex relaxatione integumentorum undecunque orta natus, vomitum caussans.

G. LV. OMPHALOCELE. 55

Tumor herniosus ad umbilicum, reponibilis, cuti concolor, indolens plerumque, ex relaxatione in-

integumentorum & peritonæi natus, varia viscera continens.

56 G. LVI. LAPAROCELE.

Tumor herniosus, ventralis seu abdominalis, in quocunque loco abdominis aliis herniis non dicato.

57 G. LVII. MEROCELE.

Tumor herniosus, in suprema & anteriore parte femoris, ad exitum vasorum cruralium in fœminis præcipue observabilis, proprietates herniarum habens; vidi merocelen etiam in viro.

58 G. LVIII. BUBONOCELE.

Tumor herniosus emergens per annulum vasorum spermaticorum sensim, enatus, cuti concolor & indolens, absente strangulatione.

59 G. LIX. OPODEOCELE.

Est tumor herniosus in summo femine adlatus, genitalium egrediens per sinuositatem ossis ischii superiorem, vasis transmittendis dicatam; in fœminis prope alterum vulvæ labium visitur hæc ectopia; reponibilis, cuti concolor, mollis; dum parvus est tumor, vix observatur, subin est elasticus. T. I. Auctorum chirurgicorum Paris. p. 709. consule L.

60 G. LX. ISCHIOCELE.

Est hernia emergens per incisuram ossis sacri, seu hiatum inter os sacrum & tuber ossis ischii, decubitu prono reponibilis; rarum genus, & sat adhuc obscurum.

61 G. LXI. COLPOCELE.

Est tumor herniosus in vagina emergens, reponibilis, in decubitu supino natibus elevatis sponte recedens plerumque, indolens, absque signis aliorum tumorum qui hic enasci solent.

62 G. LXII. PERINÆOCELE.

Tumor herniosus in perinæo ad unam vel alteram, aut plane utramque, ut vidi in parvula puella,

la, partem, raphes, mollis, reponibilis, cuti concolor; ſubin eſt effectus dyſtociæ; ſpecies hujus generis veſicalis, inteſtinalis, omentalis, patent una cum therapeia ex prioribus.

G. LXIII. PERITONÆORIXIS. 63

Sunt herniæ omnes jam deſcriptæ ob rupturam peritonæi natæ; rixis vero peritonæi ſigna ſunt, crepitus in violentia aliqua majore peritonæum lacerante, herniæ alicujus ſubita & magna protuberantia, eruptio; dolor in loco rixis major aut minor; ſpecies ſunt hujus generis tot, quot genera jam numeravi herniarum. Hernia eſt extenſio præternaturalis peritonæi & integumentorum cavum formans, recipiens viſcera adjacentia; præter prædictas hernias dantur herniarum varietates: Sic dantur herniæ partiales inteſtinales, ubi media pars fiſtulæ inteſtinalis cavum hernioſum ingreditur, altera parte libera in abdomine manente; dantur herniæ accretæ, in quo caſu pars illapſa cavi hernioſi peritonæo accreſcit; cavum hernioſum quandoque præter viſcera illapſa liquorem in abdomine collectum continet; ſæpius quoque partes cavum hernioſum ingreſſæ incarcerantur a ſpaſtice contracto annulo, unde ileus naſcitur, quem vide ſuo loco. Peritonæorixis pertinet quidem ad rupturam; ſed propter affinitatem ejusdem cum herniis, hic eandem ſubjunxi.

G. LXIV. ENCEPHALOCELE. 64

Eſt cerebri, aut cerebelli, vel utriusque ſimul, per hiatus oſſium cranii necdum ſat cohærentium, ectopia hernioſa, relaxata pariter lamina utraque duræ matris & piæ externa tenuiſſima pellucida; ſymptomata ſubin non magna, ſubin contra graviſſima cauſſans.

G. LXV. HYSTEROLOXIA. 65

Eſt uteri gravidi, vel non gravidi, in abdomine ſitus ſeu directio aberrans a directione naturali axeos ſuæ, noſcenda ex orificii uterini directione mutata, palpo externo abdominis, tum aliis

symptomatis inconsuetis; ut ischuria, dysuria, enuresi, obstipatione, &c.

66 G. LXVI. PARORCHIDIUM.

Est testiculi unius, vel utriusque, a situ naturali aberratio.

67 G. LXVII. EXARTHREMA.

Est separatio contigui in ossium articulis per diarthrosin combinatorum, noscenda ex impotentia ad motum, mutatione nativæ conformationis, dolore, protuberantia insolita, cavitate, musculorum tensione, conversione artus, accurtatione membri, vel prolongatione.

68 G. LXVIII. DIASTASIS.

Ossium recessus junctorum per raphen, harmoniam, synchondrosin, aur syndesmosin, cognoscibili cavitate insolita uno in loco, in altero vero tumore, mutatione positurae, & reliquis symptomatis oculo & tactui patentibus.

69 G. LXIX. LOXARTHRUS.

Est ossium articulatorum situs relativus in alienum constanter mutatus, seu obliquitas respectiva persistens citra exarthrema & spasmum: Vide Subluxationem & Distorsionem.

70 G. LXX. GIBBOSITAS.

Est ossium pectus, vel pelvim componentium indecora prominentia a tumore, luxatione, diastasi, torsione, pressione, aut alio principio nata.

71 G. LXXI. LORDOSIS.

Ossium longiorum fistulosorum circa medium inflexio, incurvatio ectopia a linea recta.

O. VII. DEFORMITATES.

Sunt vitia quæ vix sanitatem lædunt.

72 G. LXXII. LAGOSTOMA.

Labium oris fissum.

G. LXXIII.

G. LXXIII. APELLA. 73

Est præputii, vel alterius appendicis mollis, brevitas, parvitas.

G. LXXIV. POLYMERISMA. 74

Partium supra numerum ordinarium excessus.

G. LXXV. EPIDOSIS. 75

Appendicum mollium incrementum inconsuetum sanum. Species sunt pedes prælongi, auriculæ pendentes, præputia longissima, clitorismus, caro pubis fœminarum Africanarum, nasones, labia tumida oris; &c.

G. LXXVI. ANCHYLOMERISMA. 76

Est partium concretio.

G. LXXVII. HIRSUTIES. 77

Pili copiosiores, longiores, vel in locis ubi non solent crescere obvii, dant ideam hujus generis.

CLASSIS II.

PLAGÆ.

CHAR. CLASSIS. Continui solutiones, morbi proprie chirurgici persæpe sat graves.

ORDO I. SOLUTIONES.

Recentes, quasi semper cruentæ.

G. I. VULNUS. 78

Est continui solutio molli in parte hians, labiata, cruenta, ab instrumento mechanico scindente facta; corneæ vulnus cruorem non fundit.

G. II. PUNCTURA. 79

Continui solutio intus extensa tantum, eaque instrumento pungente facta casualiter.

G. III.

80 G. III. SCLOPETOPLAGA.

Est vulnus a glandibus e bombardis, aut sclopetis explosis illatum, vaginatum, decursum glandis designans, oblongum, vexatum.

81 G. IV. MORSUS.

Est plaga recens, quam animalia dentibus inferunt mordendo.

82 G. V. EXCORIATIO.

Est epidermidis a cute, vel cutis a carnibus separatio, detractio.

83 G. VI. CONTUSIO.

Est partis cujuscunque mollis, vel solidæ, in minimis vasculis, fibris attritio, fractio, solutio.

84 G. VII. RUPTURA.

Membranarum, tendinum, aut ligamentorum dialysis per tensionem facta, vires horum excedentem. Consule chirurgos & de utero rupto Cl. Henricum Crantz, ingenii excitatissimi virum; huc pertinet peritonæorixis.

O. II. SOLUTIONES.

Recentes, cruentæ, & artificiales.

85 G. VIII. OPERATIO.

Est studiosa solutio continui ad aliquid eximendum, ut lithotomia; operatio reipsa est vulnus studiosa & dextra manu factum chirurgi, morbum relinquens hujus classis.

86 G. IX. AMPUTATIO.

Vulnus detruncatione partis totalis factum.

87 G. X. SUTURA.

Est, studiosis puncturis mediante acu factis, filisque per puncturas trajectis, solutorum mollium contractio, adductio; sutura sicca fit emplastris, quæ huc non spectat, quum non sit plaga.

G. I.

G. XI. PARACENTESIS. 88

Est artificialis punctura in aliquod cavum corporis, plerumque acu triquetra cannulata facta.

O. III. SOLUTIONES

Incruentæ, nec ad priores referendæ, pus, saniem, cariem, &c. sistentes.

G. XII. ULCUS. 89

Est vulnus suppuratum partis mollis, vel solutio continui mollis antiqua, pus, ichorem, aut saniem quamcunque alens, fundens.

G. XIII. EXULCERATIO. 90

Ex excoriatio suppurans, seu ulcus superficiale: reliqua, quæ ad hoc genus spectare videntur, ex ulcere patent.

G. XIV. FISTULA. 91

Est ulcus cortice calloso vaginatum, ore angustatum, oblongum.

G. XV. SINUS. 92

Est cavitas ulcerosa ampla, sæpe multiplex, ore angusto non calloso, vel plane nullo donata.

G. XVI. ESCHARA. 93

Crusta mortua sicca partis mollis sæpius causticis facta est eschara, sensus & vitæ expers.

G. XVII. CARIES. 94

Ossis erosio cava, aspera, periostio denudata, plerumque nigra; unde os evadit fragile, friabile, vel exfoliabile. Species numerat hoc genus sequentes; est nimirum caries sicca, humida, exfoliabilis, syphilitica, scorbutica, scrophulosa, variolosa.

G. XVIII: ARTHROCACE. 95

Ulcus medullæ ab interioribus sponte natum, cum ossis carie, exostosi, & persæpe dolore; species numerat hoc genus fere totidem quot caries; vulgo vocatur spina ventosa: Consule super hac Petit de morbis ossium.

O. IV.

O. IV. SOLUTIONES

Anomalæ, quæ prioribus includi renuunt.

96 G. XIX. RHAGAS.

Est solutio continui sicca in partium mollium marginibus, ut labiis oris; species includit Rhagas veneream, malignam, pestiferam, frambæsiacam ulcerosam, benignam, lixivialem, glacialem, &c.

97 G. XX. AMBUSTIO.

Est plaga a flamma ignis, corporibusque ex igne candentibus, liquidis ferventibus, aut radiis solis in focum coactis, nostro corpori illata succedentibus phænigmo, phlycthænis, vel eschara.

98 G. XXI. FRACTURA.

Est divisio ossium in fragmenta separabilia.

99 G. XXII. FISSURA.

Divisio ossium rimam referens, hæcve non penitus separans.

CLASSIS III.

O. I. MACIES.

Diminutio voluminis corporis ex consumptione pinguedinis, vel sanguinis defectu.

G. I. TABES. 100

Est macilentia universalis, cum pyrexia lenta & habituali, citra tussim purisve anacatharsin.

G. II. PHTHISIS. 101

Corporis emaciatio, cum amphimerina lenta, tussi, dyspnœa, & ut plurimum puris sputo. Ab initio rarius in phthisi adest puris sputum, in Statu contra & fine semper. Quid est proprie pus?

G. III. ATROPHIA. 102

Est macies sine tussi, anacatharsi, & febre notabili; raro equidem est atrophia sine omni febricula. Consule definitionem febris.

G. IV. HÆMATAPHORIA. 103

Macies seu cachexia ex inopia sanguinis. Descriptio: Virium debilitas, pertinax aurium sibilus, anorexia, facies lurida, epidelio tecta, pallidissima alvi fluxus, diabetes, sudores profusi, lipothymiæ, tibiæ tumidæ, subin hydrothorax his succedens, vigiliæ, suspiria, animi abjectio, mœror, mortis timor, urina pallida, venæ abditæ, pulsus vacuus, sanguinis profluvia prægressa, sunt signa hæmataphoriæ; aliquando aer evolutus locum sanguinis in vasis occupat.

G. V. ARIDURA. 104

Macies, exsiccatio unius tantum artus, vel partis corporis, sine febre.

O. II. INTUMESCENTIÆ.

Deformitas ex volumine, mole, auctis.

105 G. VI. PLETHORA.

Intumescentia universalis, proportionata & æquabilis, ex abundantia sanguinis. Descriptio: Amystidis & ventris cultus, pulsus plenus aut suppressus, venarum amplitudo conspicua: Æstus & gravitas totius corporis, respirandi difficultas, lassitudo spontanea, stupor artuum, somni turbati; partes epidelio tectæ ruberrimæ; temperamentum subaxum, sanguineum.

106 G. VII. POLYSARCIA.

Intumescentia universalis, mollis, pallidula, ab adipe nimium aucto.

107. G. VIII. PNEUMATOSIS.

Intumescentia universalis ab aere, ad attactum crepitans, elastica, levis.

108 G. IX. ANASARCA.

Intumescentia universalis œdematosa, non elastica, vestigium digiti impressi servans, pallida, frigida, haud crepitans.

109. G. X. PHLEGMATIA.

Intumescentia œdematosa artuum inferiorum mollis, cuti concolor, indolens, foveam digiti impressi servans, non elastica.

110. G. XI. PHYSCONIA:

Est intumescentia abdominis à partibus solidis præternaturalis, sine graviditate, fluctuatione, & elasi, ad tactum dura, resistens, parenchymatica.

111 G. XII. GRAVIDITAS.

Intumescentia abdominis ex imo hypogastrio incipiens, in axique ejusdem ascendens, opus generationis subsequens, partu terminanda; pathemata gravidarum, motus infantis sensibilis, sunt totidem characteres hujus generis.

O. III.

O. III. HYDROPES PARTIALES.

Tumores a fluidis in cavitatibus congestis, ut abdomine, &c.

G. XIII. HYDROCEPHALUS. 112

Hydrops capitis a sero.

G. XIV. PHYSOCEPHALUS. 113

Est tumor totius capitis emphysematosus elasticus, sub digito crepitans.

G. XV. HYDRORACHITIS. 114

Tumor cysticus ex hiatu vertebrarum lumbarium, vulgo spina bifida, in recens natis protuberans cum anæsthesia; est verus hyprops thecæ spinalis. A.

G. XVI. A S C I T E S. 115

Gravis, sphæroidea, & fluctuosa abdominis intumescentia, non elastica, cum polydisia, urina pauca, lixiviali, lateritia.

G. XVII. HYDROMETRA. 116

Tumor hypogastrii sine graviditate, ab utero fluidis distento, rotundus, fluctuans, leges gravitatis sequens; dolor inguinum, spirandi difficultas, menostasia, rigores, mammarum mollities, phlegmatia, & tactus orificii uterini, diagnosin firmant.

G. XVIII. P H Y S O M E T R A. 117

Est constans tumor hypogastrii a flatu uterum distendente, rotundus, elasticus, levis, in sede uteri.

G. XIX. T Y M P A N I T E S. 118

Est intumescentia totius abdominis, levis & elastica, a pulsatione sonum edens, cum ructibus, borborygmis, constipatione, & doloribus abdomini; chronicus est hic morbus.

119 G. XX. METEORISMUS.

Est intumescentia flatulenta epigastrii, hypochondriorum, vel totius abdominis, fugax & plerumque indolens.

O. IV. TUBERA.

Tumores partium solidarum externi, non hydropici, cachexia.

120 G. XXI. RACHITIS.

Est deformitas nata ex articulorum tumore duro, carnium marcore & flacciditate, capitis mole, sterni protuberantia; ingenium præcox in infantibus, ossiumve flexilitas & lordosis.

121 G. XXII. SCROPHULA.

Tumores subscirrhosi glandularum colli, mesenteriive, cum labiis nasoque crassioribus; scrophula ordinario mollior est scirrho.

122 G. XXIII. CARCINOMA.

Ulcera cancrosa, sordida, labiis duris eversis, scirrhosis, ex quibus ichor manat acris & rodens; adsunt insuper dolores lacinantes, excrescentiæ fungosæ, venæ adjacentes varicosæ non inepte pedes cancri referentes, & febris hectica.

123 G. XXIV. LEONTIASIS.

Cognoscitur ex mutatione formæ humanæ in ferinam aliquatenus; unde aspectus hominis ferinus.

124 G. XXV. MALIS.

Morbus est, qui cognoscitur tumoribus. ulceribus, quæ insecta vermiformia vel horum larvæ excitarunt, in quibus nidulantur, & ex apertis prodeunt.

125 G. XXVI. FRAMBÆSIA.

Morbus contagiosus, aliquando & congenitus apud Americanos, cujus præcipuum symptoma sunt excrescentiæ fungosæ mori fructus referentes, qui-

quibus sese adjungunt ulcera dysepulota, exostoses, caries, anchyloses, & macies.

O. V. IMPETIGINES.

Morbi contagiosi, chronici, qui cutis excrescentias, tumores gregales, exulcerationes, crustas, inducunt, plures foventur a viru inoculabili.

G. XXVII. SYPHILIS. 126

Ulcuscula, porri, sicus, bubones, tophi, nodi, post vel cum gonorrhœa plerumque; dein pustulæ crustosæ, dolores nocturni, ostocopi, exostoses, caries, macies, & color luridus, morbum adesse loquuntur.

G. XXVIII. SCORBUTUS. 127

Cognoscitur ex maculis lividis, flavis, cœruleis tibiarum, stomacace, facie lurida, urina pellicula tecta.

G. XXIX. ELEPHANTIASIS. 128

Facies deformis, tubera callosa, ozæna, raucedo, cutis elephantina crassa & unctuosa, rictus satyrorum, anæsthesia in artubus, constituunt characterem hujus generis.

G. XXX. LEPRA. 129

Cognoscitur ex pustulis verrucosis, duris, crassis, herpetosis, vel squamis siccis in corymbos dispositis, prurientibus, escharoticis, rhagadibus; dum plures sunt siccæ pustulæ, *sicca*; ubi vero e contra, plures humidæ & exulceratæ, *humida* dicitur lepra.

G. XXXI. SCABIES. 130

Cognoscitur ex pustulis, vel phlycthænis, lentis vel secalis grani magnitudine, lympham aut saniem continentibus, quæ scalpendo ruptæ crustas prurientes formant: contagiosus hic morbus & inoculabilis flexuras artuum maxime occupat.

G. XXXII. TINEA. 131

Incipit a pustulis vel phlycthænis capitis aut faciei

diversi-coloribus, quæ ruptæ in crustas humidas vel siccas abeunt corymbosæ; videtur nimirum esse scabies capitis, & nihil aliud.

O. VI. ICTERITIÆ.

Cognoscuntur ex totius cutis colore inassueto, pallido, flavo, nigro, rubro, lurido sine pyrexia notabili.

132 G. XXXIII. AURIGO.

Flavedo cutis ad aureum, vel aurantium tendens colorem, præcipue vero sceleroticæ membranæ.

133 G. XXXIV. MELASICTERUS.

Color cutis & sceleroticæ niger, atro-lividus, fuliginosus, constituunt characterem hujus generis, cum mœstitia & perturbatione mentis.

134 G. XXXV. PHOENIGMUS.

Morbus hicce apyretus rubedine cutis diffusa maculata, vel punctata, notatur.

135 G. XXXVI. CHLOROSIS.

Pallor faciei totiusve corporis cum asthænia, & sæpius pica, sine aurigine scleroticæ; color est albus, cinereus, fuscus, cereus, luridus, aut virescens, cum sclerotica semper albissima perseverante.

O. VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

Noscuntur ex signis classeos & affinitate cum prioribus generibus.

136 G. XXXVII. PHTHIRIASIS.

Exortus insectorum, pediculorum, aut his affinium, cum porrigine, exulceratione, pruritu, cachexia.

137 G. XXXVIII. TRICHOMA.

Morbus contagiosus Hebræorum, cujus præcipuum sym-

symptoma est capillorum conspurcatio, complicatio, conglutinatio, & in cirros ac funiculos concretio inextricabilis, sæpius cum phthirasi; hæreditarius est morbus hicce.

G. XXXIX. ALOPECIA. 138

Defluvium pilorum & desquamatio cuticulæ constituunt characterem hujus morbi, cunctis animantibus communis.

G. XL. ELCOSIS. 139

Copiosa ampla ulcera, fœtida, cariosa, chronica, cum pyrexia lenta, produnt hoc genus.

G. XLI. GANGRÆNA. 140

Anæsthesia, immobilitas, frigus, phlycthænæ lympham continentes, flacciditas, lividitas, & partis mors in cute & membrana cellulosa, vel in omnibus ad ossa usque, textus facilis laceratio & dissolutio putrida, cum fœtore cadaveroso, definiunt hoc genus.

G. XLII. NECROSIS. 141

Est partis mors lenta sine prævio tumore, mollitie, & dissolutione fœtida, cum dolore ardente ordinario & stupore, quæ sequitur exsiccatio partis, induratio, nigredo, & mumia; differt a gangræna in eo, quod lentius procedat, cum dolore rodente & stupore, & in mumiam abeat; gangræna contra mollescat, phlycthænas elevet, putrescat, fœteat, atque cito decurrat.

CLASSIS. IV.

Ingrata & molesta sensatio, aut imaginatio, qualis ex nervearum partium laceratione, rosione, ustione, pressione, distractione, oritur, reliqua symptomata superans hanc definit classem.

O. I. DOLORES VAGI.

Sæpius universales, aut cutanei ad phlegmasias non referendi.

142 G. I. ARTHRITIS.

Articulorum dolor spontaneus, periodicus a synovia corrupta.

143 G. II. OSTOCOPUS.

Est dolor constans & notabilis ossium, a periostio interno potissimum affecto, ex pressione non exacerbans, fixus.

144 G. III. RHEUMATISMUS.

Dolor diuturnus in parte carnosa, tendinosa artuum, vagabundus, sæpius sine coryza, rheumate, catarrho, erysipelate. & sine febre notabili; acutus rheumatismus facit genus inter phlegmasias *Myositin* a me dictum; sanguis missus rheumatismo laborantium est gelatinosa crusta tectus, & urina sæpe ad sulphureum colorem accedit.

145 G. IV. CATARRHUS.

Colli collove vicinarum partium dolor a frigore suscepto, cum tussi, coryza, levi partium intumescentia, & pyrexia vespertina exigua, seu amphimerina catarrhali.

146 G. V. ANXIETAS.

Molestia ad loci mutationem assiduam cogens ægrum, quem habet.

147 G. VI. LASSITUDO.

Est ingrata sensatio, juncta cum debilitate, quæ ad quietem cogit virium reparandarum gratia.

G. VII.

G. VII. STUPOR. 148

Est molesta sensatio cum obscuritate tactus.

G. VIII. PRURITUS. 149

Molesta sensatio ad scalpendum cogens.

G. IX. ALGOR. 150

Molesta qualis a summo aeris frigore excitatur, jam cum phricasmo, rigore, vel concussione corporis, jam sine his symptomatibus.

G. X. ARDOR. 151

Molestia qualis a summo aeris calore producitur.

O. II. DOLORES CAPITIS,

Faciei, vel Capillitii.

G. XI. CEPHALALGIA. 152

Est capitis gravitas vel sensatio molesta, quæ refert caput interius distensum, turgidum, & quasi gravatum, malum haud chronicum.

G. XII. CEPHALÆA. 153

Est dolor capitis chronicus, &, juxta Sthalianos, tensivus; videtur sola diuturnitate a cephalalgia differre receptissimum hoc genus.

G. XIII. HEMICRANIA. 154

Est morbus, cujus præcipuum symptoma est dolor in alterutro capitis latere, potissimum ad tempora, frontem, ac oculos, isque vehemens sæpe & periodicus quandoque.

G. XIV. OPHTHALMIA. 155

Cognoscitur ex oculi dolore, rubore, intolerantia lucis, & lacrymatione, vel siccitate.

G. XV. OTALGIA. 156

Dolor in aure.

157 G. XVI. ODONTALGIA.

Dolor dentium maxillarumque, cum vigiliis &

ſæpius ptyaliſmo, maxillæ aut genarum tumore.

O. III. DOLORES PECTORIS

Anhelationis expertes.

158 G. XVII. PYROSIS.

Ardor œſophagi ad ventriculum uſque extenſus, ſine febre, vulgo Soda dicitur.

159 G. XVIII. CARDIOGMUS.

Eſt gravis pertinaxque moleſtia in præcordiis, cum ſenſu ponderis auctæve molis & pulſatione, quæ ad minimum motum augentur: Aneuryſmati cordis, auricularum, ſinuum, & arteriarum tribuitur cardiogmus, ſeu dolor cordis.

O. IV. DOLORES ABDOMINIS

Interni.

160 G. XIX. CARDIALGIA.

Moleſtia ad epigaſtrium & ventriculum relata, ſyncopen minitans.

161 G. XX. GASTRODYNIA.

Notabilis & durans in regione ventriculi dolor, ſine ſyncope & pyrexia.

162 G. XXI. COLICA.

Eſt dolor potiſſimum inteſtini craſſi regiones occupans in abdomine, hujuſque officia turbans, ſine febre notabili, cum pulſu plerumque ſuppreſſo, rariore, & obſtipatione.

163 G. XXII. HEPATALGIA.

Moleſta ſenſatio gravativa, tenſiva, aut quævis alia in regione hepatis, ſine pyrexia acuta.

164 G. XXIII. SPLENALGIA.

Eſt dolor pertinax gravativus, tenſivus, in regione

ne lienis, cum aliquali dyspnœa, pulsu in inspiratione intermittente, tumore & duritie, sine pyrexia.

G. XXIV. NEPGRALGIA. 165

Dolor fixus in regione renum & ureterum, sine pyrexia acuta.

G. XXV. HYSTERALGIA. 166

Dolor in regione uteri, sine parturitionis nisu & phlegmasia notabili.

O. V. DOLORES EXTERNARUM

Partium locales.

G. XXVI. MASTODYNIA. 167

Dolor mammarum.

168 G. XXVI. RACHIALGIA.

Atroces dolores abdominis, ad lumbos & dorsum serpentes, pressione non crescentes, cum umbilici subin retractione, alvi constipatione, convulsione, manuum torpore, paresi, paralysi, ac contracturis artuum, definiunt hunc morbum.

169 G. XXVIII. LUMBAGO.

Est dolor lumborum corporis erectionem impediens, sine nausea, ureterum dolore, femoris stupore, urinæve vitiis; dolor est in musculis spinæ dorsi aut ligamentis,

G. XXIX. ISCHIAS. 170

Dolor constans coxendicis, pelvis, & capitis femoris, nec non musculorum ejusdem, hinc difficultas gradiendi, standi, claudicatio, frigus partis; conatus ad deponendam alvum dolorem augent ischiadicum.

G. XXX. PROCTALGIA. 171

Est dolor podicis.

G. XXXI. PUDENDAGRA. 172

Dolor partium genitalium tum in viris, tum in fœminis.

173 G. XXXII. DIGITIUM.

Est dolor periodicus articuli cujusdam digiti, cum emaciatione & ossis friabilitate, sine omni phlegmasia. Vide Ill. De Sauvages. T. I. p. 150.

CLASSIS V.

FLUXUS.

CHAR. CLASSIS. Exitus insolitus cujusvis fluidi vel solidi e corpore.

O. I. SANGUIFLUXUS.

Sanguinis, vel saltem sanguinolentæ materiæ ejectio seu effluxus, quacunque via, præter alvinam.

174 G. I. HÆMORRHAGIA.

Est fluxus sanguinis e naribus.

175 G. II. HÆMOPTYSIS.

Est sanguinis expectoratio seu anacatharsis, cum tussi sine notabili pyrexia.

176 G. III. STOMACACE.

Stomacace laborantibus sanguis dissolutus promanat e gingivis laxis, sordidis, & fœtidis, sponte, vel ad levem harum attactum.

177 G. IV. HÆMATEMESIS.

Est sanguinis rejectio ex œsophago, cum vomitorio conatu, anxietate magna, & animi deliquiis; observantur & fæces alvi sanguine tinctæ, nigricantes.

178 G. V. HÆMATURIA.

Est effluxus seu minctio cruoris, urinæ cruentæ ex vesica, vel seminis sanguinolenti ex urethra, in viris, & mulieribus.

G. VI.

G. VI. METRORRHACIA. 179

Sanguinis ex utero aut vagina fluxus morbosus, nimius.

G. VII. ABORTUS. 180

Est fœtus immaturi, id est ante nonum mensem graviditatis saltem aliquot septimanis exclusio, subin cum metrorrhagia. Symptomata sunt, lassitudo, anorexia, frigus, mammarum flacciditas, lumbago, hysteralgia, lipothymia, &c.

O. II. ALVIFLUXUS

Sanguinolenti.

G. VIII. HEPATIRRHŒA. 181

Est alvi fluxus per inferiora sanguinolentus, nec ater, nec torminosus.

G. IX. HÆMORRHOIS. 182

Est sanguifluxus ex tuberculis, mariscis rubris, duris, dolorificis, finem intestini recti obsidentibus, vel in recto latentibus; sentiunt posteriora tubercula ægri in recto sæpius obstipari, & digitus immissus intestino hæc offendit; sanguis in depositione alvi præcedit, vel ad minus comitatur, excrementa.

G. X. DYSENTERIA. 183

Est frequens torminosa mucoso-cruenta alvi dejectio.

G. XI. MELÆNA. 184

Est fluxus materiei nigricantis, atro-rubræ, ano vel cato frequens.

O. III.

O. III. ALVIFLUXUS

Non ſanguinolenti.

185 G. XII. NAUSEA.

Eſt inanis vomendi conatus, & tamen maximis licet niſibus nihil niſi flatus aut mucus exiguus exantlatur; adeſt anorexia, gaſtrodynia, motus oſſis hyoidis ad ſuperiora, ptyaliſmus; capitis ad anteriora inclinatio, tremor labii inferioris, &c.

186 G. XIII. VOMITUS.

Eſt palpabilium materierum non cruentarum per os œſophagumque rejectio frequens ex ventriculo; cauſa eſt antiperiſtaltica ventriculi contractio, concurrente diaphragmatis & muſculorum abdominalium preſſione, cum ſimultanea expiratione; pulſus eſt contractus, rigidus, & frequens.

187 G. XIV. ILEUS.

Gaſtrodynia, obſtipatio, anxietas, & vomitus demum fæculentæ materiæ, determinant hunc morbum; atrocia circa umbilicum tormina, ructus, nauſea, ſingultus, inteſtinorum volutatio, virium proſtratio, pertinax alvi obſtipatio & vomitus demum fæculentus, ſunt ſymptomata principalia hujus morbi.

188 G. XV. CHOLERA.

Eſt ſyndrome ex vomitu, diarrhœa, gaſtrodynia, proſtratione virium, & ſubin ſurarum crampo.

189 G. XVI. DIARRHOEA.

Eſt recrementorum & excrementorum ut plurimum fluxilium frequens per anum dejectio notabilis & conſtans, adeoque morboſa.

190 G. XVII. COELIACA.

Eſt albeſcentium, aut chyliacearum materierum per alvum frequens dejectio, plerumque profuſa cum torminibus & proſtratione virium.

G. XVIII.

G. XVIII. LIENTERIA. 191

Alimenta parum aut nihil mutata per alvum dejiciunt, & quidem plerumque paulo post ingestionem, lienterici.

G. XIX. TENESMUS. 192

Muci frequens & pauca dejectio per anum, cum intensa dejiciendi cupiditate, conatuque eidem proportionali; stimulum & dolorem sentiunt ægri intestino recto.

G. XX. PROCTORRHŒA. 193

Est fluxus mucosi subalbi, flavescentis, quandoque striis sanguineis tincti, humoris ex vasis hæmorrhoidalibus externis, vel in recto latitantibus, qui humor ordinario spissior est, dum ex internis vasis stillat, scybalaque præcedit: Vide Lieutaud T. 1. p. 396. N. 4. Pruritum præterea & ardorem hoc fluxore madentes & fœtentes in podice sentiunt, queruntur. Species non adeo magni momenti in praxi possunt esse proctorrhœa externa, interna, periodica sanguinolenta, hujus generis, quod etiam proctoleucorrhœa vocari potest, ob similitudinem cum leucorrhœa.

O. IV. SERIFLUXUS.

Fluidi nec sanguinolenti, nec per alvum, effluxus morbosi.

G. XXI. EPHIDROSIS. 194

Est sudoris quantitate, qualitate, aut intempestivitate peccantis, excedentis affluxus.

G. XXII. EPIPHORA. 195

Est oculis constans effluxus humoris serosi, lacrymalis, sebacei, aut purulenti, morbosus.

196 G. XXIII. CORYZA.

Est humoris serosi muscosive e naribus fluxus morbosus, sine, vel cum ozæna, concomitante plerumque gravedine capitis.

197 G.

197 G. XXIV. PTYALISMUS.

Est salivæ mucive, sine anacatharsi ac vomitione ex ore effluxus, emissio, aut sputatio uber & constans.

198 G. XXV. ANACATHARSIS.

Est muci, lymphæ, aut puris facta cum tussi e pectore per os rejectio frequens, notabilis, & morbosa.

199 G. XXVI. DIABETES.

Subita potus omnis per urinæ vias emissio, vel urinarum utcunque coctarum nimia profusio, cum siti, anorexia, & polydipsia.

200 G. XXVII. ENURESIS.

Involuntaria & inopportuna doloris & ardoris expers minctio, quæque sæpius insciis accidit.

201 G. XXVIII. PYURIA.

Est purulentæ, albæ, flavæ, mucosæ, aut lutulentæ materiæ cum urinis minctio.

202 G. XXIX. LEUCORRHOEA.

Est serosæ, flavæ, puriformis, mucosæ, fœtidæ, atræ, &c. materiæ ex utero aut vagina delapsus, effluxusve morbosus.

203 G. XXX. LOCHIORRHOEA.

Est lochiorum alborum nimius fluxus puerperam debilitans.

204 G. XXXI. GONORROEA.

Est stillicidium fluidi seminalis, vel puriformis, ex urethra, sine minctione.

205 G. XXXII. GALACTIRROEA.

Est stillicidium lactis e mammis, vel locis insolitis.

G. XXXIII.

G. XXXIII. OTORRHOEA. 206

Est fluxus serosus, purulentus, fœtidus, ex cavo auris, meatu auditorio, vel ambitu auriculæ.

O. V. AERIFLUXUS

Sunt flatus halitusve insolitæ & vitiosæ emissiones per os vel anum, &c.

G. XXXIV. FLATULENTIA. 207

Est morbus flatuum per os, vel anum, frequenti emissione & borborygmis designatus.

G. XXXV. ÆDOPSOPHIA. 208

Est flatuum ex vesica per urethram, vel ex utero per vaginam, emissio.

G. XXXVI. DYSODIA. 209

Est fœtidorum vaporum e corpore exhalatio odoratum offendens, exhalante tales vapores e naribus, ore, vulva, inguinibus, axillis, & pedibus.

CLASSIS VI.

CHAR. CLASSIS. Meatuum impeditio; hinc solitarum in sanitate excretionum impedimentum & emansio; *Suppressorios* morbos vocavit Ill. Linnæus.

ORDO I. SUPPRESSIONES

Humorum serosorum.

210 G. I. ADIAPNEUSTIA.

Transpirationis naturalis, & liquoris cutis organa humectantis, suppressio.

211 G. II. STERILITAS.

Est geniturae suppressio, conceptus impeditio.

212 G. III. ISCHURIA.

Urinæ secretæ a renibus retentio seu suppressio, cum tumore hypogastrii, vel secretionis in renibus suppressio, cum stupore renum, singultu, anorexia, vomitu, ptyalismo urinoso, ephridrosi.

213 G. IV. DYSURIA.

Difficilis & dolorifica, guttata sæpius & ardens mictio; est ergo fluxus urinæ pro parte suppressus, & non in integrum, ut in ischuria.

214 G. V. AGLACTATIO.

Lactis defectus.

215 G. XI. DYSLOCHIA.

Est lochiorum suppressio.

O. II.

O. II. SUPPRESSIONES INGERENDORUM;

Constrictio meatuum ingerenda admittentium, sine phlegmasia.

G. VII. DYSPHAGIA. 216

Est deglutitionis suppressio, impeditio, absque notabili respirationis læsione & phlegmasia.

G. VIII. ANGINA. 217

Est respiratio impedita, cum sensu obicis in gutture, absque phlegmasia, sive dein adsit dysphagia, sive non.

O. III. SUPPRESSIONES

Imi ventris.

G. IX. DYSMENORRHOEA. 218

Menstrua suppressa, dolorifica, cum lumbagine, cephalalgia, dyspnœa, palpitatione cordis, &c. constituunt characterem hujus generis; fluxus menstruus periodicus a tribus ad 8 dies protelari solet; quantitas sanguinis a quinque ad 10 uncias limitatur, circa 13 annum ætatis incipit, & ad 45 plerumque producitur; sanguis refert sanguinem victimæ.

G. X. DYSTOCIA. 219

Dolorifica, laboriosa ultra modum fœtus exclusio aut secundinarum, vel penitus impossibilis.

G. XI. DYSHÆMORRHOIS. 220

Est suppressio suetarum hæmorrhoidum; dum fluxus hæmorrhoidum suetarum periodicus sæpius supprimitur, ex quacunque occasione, ante annum circiter 60, 65, quo hic fons sponte siccari solet; oriuntur lumbago, ischias, vertigo, cepha-

cephalalgia, tenſio cervicis, anxietas, dyſpnœa, colica, &c. Hæmorrhoidum fluxus, qui ultra 65. annum ætatis protelatur, jam morboſus haberi debet & ſupprimi minuive; ſenectus enim hunc fluxum non fert. Hæmorrhois rariſſime cum conſtantia ſanitatis obſervatur; hinc vix pro beneficio haberi poteſt, licet morbos graviores prævertere dicatur.

221 G. XII. OBSTIPATIO.

Fæcum alvi exoneratio impedita. Carolus *Linnæus*; eſt nimirum ſegnis, difficilis, rara fæcum alvi excretio, vel plane nulla etiam medicamentis prolici poſſunt excrementa: Medici aſſiduo curant obſtipationem, & tamen hanc nec in numero morborum tolerant, equidem raro eſt morbus per ſe, ſæpiſſime vero ſymptoma hoc alios morbos comitatur & auget.

CLASSIS VII.

SPASMI.

CHAR. CLASSIS. Contractio conſtans, vel interpolata, muſculorum motum localem efficientium, eaque invita.

O. I. SPASMI TONICI PARTIALES.

Rigiditas organi, vel artus determinati.

222 G. I. STRABISMUS.

Oculi alterutrius ſpaſmus, tonicus axium opticorum divergentiam, vel convergentiam nimiam inferens, ſeu eſt ſpaſmus tonicus oculi, unde hujus axis cum alterius axi ad unicum objectum non convergit.

G. II. TRISMUS. 223

Est spastica contractio tonica, aliquando visa fuit solum clonica maxillæ inferioris, vulgo *trotura oris* dicitur; rusticus venerat ad me pedes trismo tonico laborans, pro consilio contra hunc morbum: datur igitur solitarius hicce morbus; vide *tetanum*.

G. III. OBSTIPITAS. 224

Est colli spasmus, vulgo dicitur *torticollis*, tonicus, vel clonicus capitis mobilitatem & directionem mutans.

G. IV. CONTRACTURA. 225

Est artus unius vel plurium constans, diuturna rigiditas, inflexilitas.

G. V. CRAMPUS. 226

Est subitanea, fugax, & dolorifica musculi rigiditas, cum dolore subin atroci.

G. VI. PRIAPISMUS. 227

Est penis ingrata & sine appetitu libidinis rigiditas, seu erectio.

O. II. SPASMI TONICI GENERALES.

228 G. VII. TETANUS.

Spasmus generalis tonicus subito ortus, cum dyspnœa; rigent musculi omnes, & corpus inflexile servant, cum dyspnœa & rubore faciei; vel rigent musculi soli posteriores corporis, aut anteriores, & corpus flectunt horribiliter, & plerumque flexum servant diutius.

G. VIII. CATOCHUS. 229

Spasmus generalis tonicus sensim factus, sine dyspnœa, agitatione pectoris, faciei rubore, chronicus.

O. III. SPASMI CLONICI PARTIALES.

Agitatio invita & coacta cujusdem organi aut artus, cujus motivum ab ægro non percipitur.

230 G. IX. NYSTAGMUS.

Spasmus clonicus oculi, vel palpebræ.

231 G. X. CARPHOLOGIA.

Est spasmus clonicus manuum, quo ægri floccos e tegumentis evellunt, paleas colligunt, muscas venantur, symptoma hoc a suffusione natum plerumque est lethale.

232 G. XI. SUBSULTUS.

Est motus palpitans aut tremulus tendinum, pone carpos potissimum observabilis.

233 G. XII. PANDICULATIO.

Est spasmus artus successive extendens plures, vel omnes in oscitatione.

234 G. XIII. APOMYTTOSIS.

Est succussio cutis & capitis, cum trunci totius agitatione tremula & violenta: adest simul exspiratio sonora, quasi stertorosa.

235 G. XIV. CONVULSIO.

Est agitatio invita artus, vel musculi brevis cum superstite exercitio animi.

236 G. XV. TREMOR.

Artuum aut capitis alterna, per itus & reditus frequentes, motitatio per brevissima spatiola, cum movendi voluntate concurrens, qua cessante, cessat quoque tremor.

237 G. XVI. PALPITATIO.

Est pulsatio in regione cordis insolita, cum pulsu intermittente, crapizante, tremulo, subduro, inæquali, inordinato, debili, quandoque & dyspnœa ad quemlibet motum notabili; habeo ægram,

gram, cujus pulsus sub actuali palpitatione remittit, vel intermittit, in 5 annum jam hoc ex morbo languentem; subin tremorem in praecordiis patitur, cum pulsu caprizante, tremulo; notum est, quod regularis pulsatio cordis non dicatur palpitatio.

G. XVII. CLAUDICATIO. 238

Est vitiosus gradiendi modus, quo truncus singulis passibus huc vel illuc nimium inclinat, unde crus indecore movetur, trahitur.

O. IV. SPASMI CLONICI GENERALES.

G. XVIII. PHRICASMUS. 239

Est succussio invita totius cutis, imo saepius totius corporis, frigorifera.

G. XIX. ECLAMPSIA. 240

Est morbus convulsivus clonicus acutus, quandoque remittens, cum sensuum feriatione in paroxysmo; pollices intro non premunt, spuma ex ore non eructat, spasmi sunt tremuli artuum omnium; vulgo vocatur hic morbus *apoplexia puerilis*.

G. XX. EPILEPSIA. 241

Est morbus spasmodicus, clonicus, intermittens, seu periodicus, chronicus, cum variorum membrorum invita agitatione, dyspnoea, spumae oris eruptione, pugnorum constrictione, sensuum & feriatione externorum & internorum, sine asphyxia. *Symptomata*: Subitaneus casus, oblivio omnium, clamor, mugitus, stridor dentium, truculentia oculorum, spuma oris, pugnorum constrictio, totius corporis agitatio.

G. XXI. HYSTERIA. 242

Est artuum, organorumque externorum internorumque spasmus clonicus tonicusve, paroxysmis fugacibus, leviter variantibus, cum pusillanimitate, sensibilitate animae summa, mortis formi-

 dine,

dine, intensa, teneritudine partium convulsarum remanente, attactum fugiente, & urina hyalina. Signa pathognomica hujus morbi statuit Ill. Astruc agitationem matricis, pnycem, constrictionem pectoris & glomum fluctuantem in abdomine.

243 G. XXII. SCELOTYRBE.

Est motus semivoluntarius unius lateris, vel totius corporis in gressu, situ erecto, aut comestione, gesticulationem, aut ridiculam histrionis festinationem, referens; hunc morbum vocavit *Sydenhamus Choream Sancti Viti*.

244 G. XXIII. BERIBERIA.

Est motus gradientium genua spastice retrahens, cum tremore artuum, formicationis sensu, vocis raucedine, stupore dolorifico artuum, qui morbis Indis est familiaris. In ovibus olim lupum videntibus beriberiam spasmum vidi, stantes hæ vel gradientes tristes momentanee retrahunt genua, ad situm naturalem illico reditura.

CLAS-

CLASSIS VIII.

ANHELATIONES.

CHAR. CLASSIS. Est agitatio invita, defatigans musculorum pectoris, cum respiratione difficili, laboriosa, sonora, frequenti, sine febre notabili, & sine phlegmasia.

O. I. ANHELATIONES SPASMODICÆ.

Sunt symptomata fugacia spasmodica, sæpius repetentia, quæ consistunt in vel ex inspirationibus sonoris.

G. I. EPHIALTES. 245

Morbus hic recurrens afficit dormientes cum anhelatione & insomnio corporis cujusdam pectus opprimentis; unde respiratio horum querula, gemebunda, & anxia.

G. II. STERNUTATIO. 246

Est violenta, sonora, & subitanea expiratio, in nares posticas immisso aere, ad nares everrendas sub convulsiva capitis & trunci corporis concussione, ad anteriora flexione. Species sunt sternutationis, *catarrhalis*, *rubeolosa*, *verminosa*, *spontanea*, *febricosa*, *epidemica*, *critica*; *medicamentosa*, &c.

G. III. OSCEDO. 247

Est aeris copiosi profunde inspirati diutina, lenta, & invita naturalis expiratio, cum magno oris hiatu; sæpe concurrit & pandiculatio.

G. IV. SINGULTUS. 248

Est concussio diaphragmatis invita, cum inspiratione subito interrupta, sonora.

G. V. TUSSIS. 249

Est concussio sonora, violenta, invita pectoris, cum

expiratione ad pulmonem quodam obice liberandum.

O. II. ANHELATIONES SUPPRESSIVÆ.

Hæ fiunt cum metu suffocationis, suntque pleræque constantes.

250 G. VI. STERTOR.

Est respiratio sonum gravem & tremulum in gutture edens, sæpius sibilo stipata.

251 G. VII. DYSPNŒA.

Est difficultas respirandi assidua & chronica, sine signis empyematis, hydrothoracis.

252 G. VIII. ASTHMA.

Est chronica, periodica respirandi difficultas.

253 G. IX. ORTHOPNŒA.

Est morbus continuus acutus, subitanea anhelatione sublimi, & fere suffocatoria, stipatus.

252 G. X. PLEURODYNE.

Anhelatio, cum pectoris dolore, sine phlegmasia, cum exigua vel nulla febre.

255 G. XI. RHEUMA.

Cognoscitur ex difficultate respirandi, cum sensu gravitatis in pectore, quam comitatur coryxa, sternutatio, raucedo, cephalalgia, tussis, sine pyrexia notabili, & sine sanguine inflammato; *endemius hic morbus*.

256 G. XII. HYDROTHORAX.

Est genus anhelationis chronicum continuum, stipatum phlegmasia pedum, pallore faciei, oedemate manuum, subita in somno suffocatione, alterutrius manus stupore, sine signis empyematis; hæc symptomata jam adsunt omnia, jam tantum aliqua; anhelatio crescit pro inclinatione corporis.

G. XIII. EMPYEMA. 257

Est difficultas respirandi a pectoris reclinatione crescens, quam præcessit phlegmasia pectoralis non resoluta, sed suppurata; comitatur amphimerina tabida notabilis, macies, decubitus horizontalis & in latus sanum difficilis, gravitas supra diaphragma, sudores profusi, rubor genarum, & multa symptomata hydrothoracis. Species sunt, *peripneumonicum*, *vomicale*, *pleurale*, *mediastinale*, *diaphragmaticum*, *intercostale*; quas species sufficiat hic nominasse, quam earundem historia necdum satis provecta sit.

CLASSIS IX.

DEBILITATES.

Char. Classis. Est impotentia clare & distincte sentiendi, appetendi, consueta vi artus organave movendi, nec non imaginandi, vigilandi, sensibus internis & externis utendi.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.

Impotentia clare & distincte sentiendi.

G. I. AMBLYOPIA. 258

Est visus debilitas respectiva ad situm, gradum lucis, distantiam objecti, oculis pellucidis; vel est debilitas visus absoluta, vel respectiva, sine opacitate corneæ, aut vitio internarum partium oculi.

G. II. CALIGO. 259

Est imminutio partialis, vel totalis, deletio visus propter repagulum opacum citra seu ante pupillam oculo inhærens, aut palpebris.

260 G. III. CATARACTA.

Est visus debilitas, vel abolitio, ob maculam opacam post pupillam positam, seu opacitatem lentis crystallinæ.

261 G. IV. AMAUROSIS.

Est visus suppressio, abolitio, vel defectus, cum pupillæ ferme plenaria immobilitate, sine sensibili oculorum vitio aut opacitate externis.

262 G. V. ANOSMIA.

Est imminuta, vel suppressa facultas percipiendi odores.

263 G. VI. AGHEUSTIA.

Est suppressio facultatis, qua diversos sapores percipimus, cum vel sine anorexia.

264 G. VII. DYSECŒA.

Est audiendi difficultas, seu gravis auditus & obscura perceptio sonorum.

265 G. VIII. PARACUSIS.

Est debilitas seu confusio auditus, qua affecti clare percipiunt voces, sed non distincte diversos sonos & articulatas voces audiunt, vel alios sonos clare & distincte audiunt, alios tantum clare sine distinctione.

266 G. IX. COPHOSIS.

Est obscura, vel nulla sonorum perceptio, seu impotentia percipiendi sonos totalis, vel partialis.

267 G. X. ANÆSTHESIA.

Est sensus omnis privatio, superstitibus motu musculari & rerum necessariarum appetitu aliquantum minutis, sine omni sopore.

O. II. ANEPITHYMIÆ.

Appetituum sensitivorum debilitas, seu imminutio notabilis.

G. XI.

G. XI. ANOREXIA. 268

Est notabilis debilitas, imminutio, seu cessatio famis in jejunis animantibus.

G. XII. ADIPSIA. 269

Est sitis debilitas, seu imminutio, aut abolitio.

G. XIII. ANAPHRODISIA. 270

Est debilitas, vel abolitio appetitus venerei, seu impotentia. Vide *sterilitatem*.

O. III. DYSCINESIÆ.

Impotentia exercendi motus solitos voluntati subjectos.

G. XIV. MUTITAS. 271

Est impotentia proferendi voces articulatas.

G. XV. APHONIA. 272

Est plenaria vocis suppressio, citra stuporem, syncopen, & comata; muti inarticulatam vocem habent, aphoni contra nullam.

G. XVI. PSELLISMUS. 273

Est difficultas seu impotentia quasdam syllabas literasve recte pronunciandi: faciunt hoc puellæ quædam naviter, ut magis placeant procis.

G. XVII. CACOPHONIA. 274

Est vocis vitium & insuavitas atque asperitas.

G. XVIII. PARALYSIS. 275

Est unius tantum artus, vel articuli frigida plerumque laxa immobilitas, absque dolore, cum vel sine anæsthesia; *paresis* est sensim invadens debilitas movendi artus, seu est imperfecta paralysis, movent enim hi artus, sed difficulter; colicam pictonum aliasque rachialgiæ species comitatur vel sequitur paresis, lente accedit paretica debilitas, & non est tanta, quanta observatur paralyticorum; actu observo paresin in

bra-

brachiis egregiis chirurgi Christophori Noher, ex colica pictonum laborantis.

276 G. XIX. HEMIPLEGIA.

Cognoscitur ex summa debilitate, vel integra motus muscularis suppressione unius lateris corporis, cum laxitate, frigiditate, indolentia artuum & mentis integritate, sine vel cum anæsthesia.

277 G. XX. PARALEXIA.

Est paralysis artuum inferiorum, vel omnium artuum, cum enuresi, anaphrodisia, quandoque & anesthæsia ac marasmo.

O. IV. LEIPOPSYCHIÆ.

Virium vitalium, pulsus, & respirationis debilitas seu imminutio; *pulsus est perpendiculum vitæ*.

278 G. XXI. ASTHENIA.

Est debilitas omnium artuum, superstite actionum vitalium minutarum tenore, superstitibusque sensibus, sine dolore,

279 G. XXII. LIPOTHYMIA.

Est subitanea & brevis virium muscularium & sensuum dejectio, seu eclipsatio, superstite pulsu & cognoscendi aliqua facultate adstantes, cum aurium tinnitu, calore, vertiginosaque capitis turba.

280 G. XXIII. SYNCOPE.

Est subitanea virium omnium animalium, & vitalium sensuumve, imminutio tanta, ut æger per tempus sui conscius non sit, cum lenta lenive respiratione, pulsu obscuro, sudore frigido, & aliquali interiorum calore.

281 G. XXIV. ASPHYXIA.

Est subitaneæ eclipsis omnium actionum naturalium, animalium, & vitalium, cum mortis imagine. Vide Cl. *Lancisium* circa mortes subitaneas.

O. V. COMATA, SEU MORBI SOPOROSI.

Omnium ſenſuum feriationes, maximæ debilitates.

G. XXV. CATALEPSIS. 282

Eſt ſenſuum omnium motuumque muſcularium ſuppreſsio, pulſu & reſpiratione pacatis, placidis, lentis, minutis, vel obſcuris, cum mira ad quoſvis ſitus ſuſcipiendos & retinendos artuum flexilitate, aptitudine; retinent figuram, in qua ipſos prehendit morbus, & omnem recipiunt ſervantque, quam illis dederis; morbus eſt recurrens, & fors tantum mulierum.

G. XXVI. ECSTASIS. 283

Eſt ſtatus ſoporoſus a gravi pathemate, vel mentis attentione profunda ortus, ægrum in eodem ſitu, quo prehenſus eſt, retinens, ſine aptitudine cataleptica.

G. XXVII. TYPHOMANIA. 284

Eſt ſopor apparens, cum pervigilio delirioſo reali, muſsitatione, vel eſt ſopor levis e quo ægri facile excitantur, cum delirio comitante.

G. XXVIII. LETHARGUS. 285

Eſt ſtatus ſoporoſus facile excitabilis, cum ſummo imaginationis & memoriæ torpore, oblivione, & febre.

G. XXIX. CATAPHORA. 286

Eſt ſomnolentia facile excitabilis, ſine febre, oblivione, ſtertore, delirio.

G. XXX. CARUS. 287

Eſt ſomnus altiſsimus, vix aut ne vix excitabilis, ſine ſtertore, cum reſpiratione tacita pacatiſsima; morbus ſæpius eſt acutus; ſemi-apertis oculis plerumque dormiunt omnino immobiles.

G. XXXI. APOPLEXIA. 288

Eſt ſomnus profundiſsimus vix aut ne vix excitabilis,

bilis, cum stertorosa respiratione, faciei tumore, omnium artuum laxitate, & pulsu plerumque duro, forti.

CLASSIS X.

EXANTHEMATA.

CHAR. CLASSIS. Febris cum asthenia, efflorescentia cutis maculata varia, pustulosa, papulosa, phlyctenoidea, &c. vel cavi oris, sæpius maligna.

ORDO I. EXANTHEMATA CONTAGIOSA.

289 G. I. PESTIS.

Eruptio purpuræ, bubonum, anthracum, pemphigi, cum pyrexia typhode, maligna, dat characterem pestis. Vide celebrem Loimographum *Diemerbræckium*.

290 G. II. VARIOLA.

Præludium variolæ patefit cephalalgia, lumbagine, nausea, vomituritione, eclampsia, & febre continua inflammatoria; erumpunt dein pustulæ phlegmonoideæ suppurantes, escharoticæ deciduæ, cicatrisantes; variola sæpissime epidemicus morbus habet IV. stadia, nempe contagium, eruptionem, seu inflammationem pustularum, suppurationem, tandem exsiccationem.

291 G. III. PEMPHIGUS.

Est phlegmasia sæpius acuta, exanthematica, stipata bullis seu vesiculis avellanam circiter magnitudine æquantibus, sero flavo turgidis, per cutim sparsis. An *Hippocratis* T. I. p. 684. ichores constituerint pemphigum? Tomo citato, p. 798.

p. 798. *Hippocrates* scripsit: " πυρετοὶ οἱ δὲ πεμφιγώδεις". Et *Claudius Galenus*, sexto epidemiorum T. I. Classe 3. p. 311. Basileæ 1561, inter reliquas interpretationes hujus febris, etiam hanc admisit, quæ est character hujus generis; nihil ergo novi pemphigus.

G. IV. PURPURA. 292

Sunt maculæ pulicum morsibus similes, faciei parcentes, pressione non evanescentes, carentes stigmate aculei a pulice infixi, coloris purpurei, lateritii, nigri, lividi, sine tumore, aspredine, cum febre amphimerina, vel tritæophya, putrida, asthenia, lingua plerumque rubra, lateritia, molli.

G. V. RUREOLA. 293

Post præludium catarrhosum, coryzam, epiphoram, tussim, cephalalgiam, somnolentiam, & palpebrarum tumorem, erumpunt papulæ corymbosæ rubræ, pulicum morsus æmulantes, asperæ, uniformes, evanescenti-furfuraceæ die IV. cum exiguo levamine symptomatum contagii, in facie, collo, thorace, trunco reliquo, & artubus; quandoque sexto die in facie jam asperantur, siccantur, & in tenuissimum furfurem fatiscit epidermis; & hoc est initium tertii stadii, quod ordinario 8. vel 9. die, una cum morbo, finitur; febris comitatur rubeolam continua; rubeolam porro inoculat atmosphæra morbillosa bronchiis, sacco lacrymali, & sinubus sex in nares patentibus; medici contra seminatores rubeolæ gossypium furfure morbilloso repletum sublimi vulnusculo, cujusque brachii imponunt, emplastro omnia tegunt, & 6. die post appositum hunc apparatum incipiunt ægrotare.

G. VI. SCARLATINA. 294

Est efflorescentia maculosa ruberrima, pruriens, papulosa, irregularis, diffusa, desquamabilis, sine præludio catarrhali efflorescens, cum febre plerumque judicatoria. Stadia tria scarlatinæ observamus, præludium noscimus inde quod febris ple-

plerumque judicatoria, cum horrore & frigore, prehendat infantes sub finem æstatis; sine præludio catarrhali & sine vomitu; quarto vel citius die, facies intumescit modice, pectus, &c. erumpunt exanthemata paulo ante descripta, & hoc est stadium secundum; post 3 vel 4 dies incipit stadium tertium, quo evanescunt exanthemata, & epidermis sub forma subtilis pollinis desquamatur.

O. II. EXANTHEMATA NON CONTAGIOSA.

295 G. VII. MILIARIS.

Eruptio phlycthænarum milii semine raro majorum, cum sudore vapido; febris continua, vel remittens, putrida; præludit oppressio præcordiorum gastrodynia gravans, pulsus suppressus, urina minus tincta, lingua plerumque alba, mollis, asthenia; perstant in cute 4, 5, 6, 7, 9, 11, &c. diebus, & cum pruritu, sudore solvuntur, in farinam subtilem disparent. *Hippocrates*, T. I. p. 697. describit miliarem & quidem criticam, seu servantem mulieres omnes, quarum cutim obsederat hæc efflorescentia. *Silenus* insuper indubie 8. die morbi miliari rubra maculatus fuit, T. I. p. 674.

296 G. VIII. ERYSIPELAS.

Est eruptio erythematis cum febre continua, vel amphimerina potius dicenda, tumiduli, superficialis, dilatabilis, desquamabilis; sistit nimirum maculas latas, amplas, subtumidulas, non suppurabiles; sanguis missus crusta inflammatoria non est tectus, sed pelle alba, tenui, & sat tenaci; dolor erythematis est calens, rodens. Tria stadia observantur erysipelatis: *Primum* absolvit gravedo, horror, innappetentia, lassitudo, cum febricula amphimerina; die 2. 3. vel 4. incipit secundum stadium, eruptio nempe erythematis, quod ordinario in 4. usque diem augetur;

tur; in tertio stadio collabitur successive tumor, calor, & dolor erythematis, & epidermis desquamatur, quod opus plerumque 4. diebus Natura absolvit.

G. IX. ESSERA. 297

Constituunt hoc genus maculæ rubellæ imprurigiuosæ, non fastigiatæ ultra libellam cutis, magnitudinis grani tritici, zeæ, subito erumpentes ferme sine febre, & post 4, 5, 7, 9, 11, 14, dies sponte & sine desquamatione epidermidis disparentes, quandoque sunt paucæ, subin contra numerosæ; ægri sunt plerumque orthostadii; præcedit eruptionem nox inquieta, leves anxietates; cutis, exstante essera, non est aspera ad tactum, nec rubedo est diffusa; maculæ aliæ sunt majores, aliæ minores, sub epidermide latentes; hujus morbi meminit *D. Allen*, p. 407. ubi tamen non hunc, sed alium descripsit; Cl. *D. Lieutaud*, T. I. p. 614. unam speciem descripsit hujus generis.

298 G. X. APHTHA.

Cognoscitur aphtha papulis seu phlycthænis linguæ, faucium, oris superficiem occupantibus, subrotundis, plerumque semilinearibus, colore albis in disco, cum radio sæpius rubro, vel rubris, bruneis, flavis, lividis, nigris, & febre tritæophya, vel obscura hectica, aut penitus nulla; adest simul somnolentia, dolor urens oris, & difficultas in masticatione, suctione, ac deglutitione. Aphtha 4 stadia habet distincte, si non omnibus speciebus, in febrili observabilia: Stadium *primum* sese prodit lassitudine spontanea, levi dyspnœa, gastrodynia, anxietate exigua, somnis turbatis, & calore oris. Stadium *secundum* propullulatio papularum nobis adesse loquitur. In stadio *tertio* elevantur papulæ seu maculæ in phlycthænas miliares, *quæ probabiliter sunt idem cum miliaribus cutis*. Stadium *quartum* absolvit desquamatio epidelii, cum dolore sensibilissimo linguæ & faucium superficiali.

CLAS-

CLASSIS XI.

PHLEGMASIÆ.

Char. Classis. Febris quasi semper continua, cum pulsu duro, dolore topico, alicujus partis inflammatione, sanguine crusta inflammatoria tecto, urina plus colorata, lingua subsicca, sicca, calente, &c. *Hippocrates*, T. I. p. 810-811. reliquit: Lingua concolor attingentibus ipsam humoribus: Quapropter per hanc humores cognoscimus.

O. I. PHLEGMASIÆ MUSCULOSÆ.

299 G. I. PHLEGMONE.

Cognoscimus phlegmonem ex febre acuta continua inflammatoria, pulsu duro, sanguine crusta inflammatoria tecto, & partis externæ inflammatione; pars externa phlegmone affecta calet rubet, dolet, tumet, est simul tensa resplende... sphæroidea; cutis ipsa & partes sub ipsa contentæ inflammatæ sunt; phlegmone in suppurationem tendit, neutiquam vero erysipelas.

300 G. II. CYNANCHE.

Est phlegmasia acuta pharyngis, laryngis, dyspnœam & dysphagiam inducens, cum pyrexia acuta, faucium rubore, calore, dolore, tumore, quæ adesse docet inspectio in fauces, depressa lingua.

301 G. III. MYOSITIS.

Febris acuta inflammatoria, dolores in diversis musculis artuum, eorundemque involucris, diu noctuque discruciantes, motum vetantes ferme omnem, ad noctem exacerbantes; sanguis missus est tectus crusta inflammatoria subgelatinosa, vel pelle tenui tenaci; hic morbus vulgo audit rheumatismus acutus.

G. IV.

G. IV. CARDITIS. 302

Adest dolor constans sub sterno in regione cordis urens, flammam vitæ extinguens, cum palpitatione, frequentibus animi deliquiis, pulsu jam magno, duro, per momenta, jam parvo, frequente, inæquali, inordinato, intermittente; febre acuta typhode & anxietatibus; cor manu tenentes ægri fugitivis oculis & mille jactationibus agitati, sibi comburi, illudque mori queruntur, clamant.

O. II. PHLEGMASIÆ MEMBRANACEÆ.

G. V. PHRENITIS. 303

Est phlegmasia acuta, cum pyrexia & delirio perpetuo, a cephalalgia atroci plerumque incipiens; delirium quandoque est audax, urina plerumque citrina, cum nebula sublimi.

G. VI. DIAPHRAGMITIS. 304

Est phlegmasia cum dolore obscuro ad costas spurias, oppressione pectoris, sputis sæpe cruentis, orthopnœa, anxietate; cingulum præcordia stringens queruntur ægri, angulos oris semivoluntarie sæpe retrahentes delirant; quandoque lethargo, vel cataphora laborant; pulsus est inæqualis, inordinatus, intermittens, durus; hypochondria intro tracta, respiratio sine motu diaphragmatis; facies jam pallet, jam rubet; calor est urens ad præcordia internus; scripsi sicut observavi in meis ægris: Vide *Hippocratem*, T. II. p. 101, IX.

G. VII. PLEURITIS. 305

Est phlegmasia cum pyrexia acuta, dyspnœa, dolore pectoris plerumque punctorio, & tussi molesta dolorem augente, sine gravitate in medio pectore; sedes morbi in 300 pleuriticis denatis a P. *Servio Romano* in pleura pulmonali inventa est; invenit nimirum pleuram pulmonis super-

ficiem investientem, cum superficialibus & extremis vasis pulmonis, inflammatam.

306 G. VIII. GASTRITIS.

Est phlegmasia stipata dolore epigastrii, ardore, tensione, siti, nausea, vomitione, singultu, & pyrexia acutissima.

307 G. IX. ENTERITIS.

Est phlegmasia acuta, cujus symptomata sunt tensio tumida & valde dolorifica, tactum non tolerans, partium abdominis intestinis respondentium, cum pyrexia, meteorismo, quandoque & ileo, vel dysenteria.

308 G. X. EPIPLOITIS.

Bis observavi hanc phlegmasiam, semel in viro rustico 30 annorum, & semel in quadragenaria muliere, cum sequente charactere: Febris erat mitis amphimerina, virium non adeo magna prostratio (rusticus venerat ipsus 4ta die morbi pro consilio ad me) lingua alba tumidula, sanguis missus coriaceus, obstipatio non pertinax, dolor obtusus infra peritonæum ad attactum paululum acutus, tumor omenti, respiratio suspiriosa, pulsus durus naturali celeritate & frequentia non multum major, sitis mediocris, urinæ flavæ, appetitus aliquis, aliquis & somnus.

309 G. XI. CYSTITIS.

Est phlegmasia, cujus præcipua symptomata sunt intumescentia ovalis in pelvi, cum tensione, dolore tactum non tolerante, dysuria, vel ischuria, & pyrexia amphimerina; adsunt insuper vigiliæ, sitis, subin delirium, extremorum frigus, tenesmus, vel obstipatio; pulsum observavi tensum, subdurum, naturali frequentia & celeritate non multum majorem; in sanguine misso crustam tenuem albam, subgelatinosam, clysmatum difficilem injectionem: Scribo sicut observavi,

O. III. PHLEGMASIÆ PARENCHYMATOSÆ.

G. XII. CEPHALITIS. 310

Est phlegmasia, in qua mentis stupor, somnolentia, sopor cataphoricus, carphologia adsunt, cum pyrexia acuta typhode; pulsus successive mollescit, cum frequentia sine celeritate; ægri sunt admodum debiles; lingua plerumque mollis, sudor quasi perpetuus; caput sæpe manibus impetunt, fricant etiam deliri. Ter observavi jam hunc morbum, & post mortem in cujuslibet ægri cadavere suppurationem cerebri inveni; respirabant hi ægroti cum sonitu sine stertore.

G. XIII. PERIPNEUMONIA. 311

Pyrexia acuta, dyspnœa gravis, sensu oppressionis gravativæ sub sterno, calor & anxietas in pectore, tussis cruenta, facies rubra, lingua rubra tumidula; pulsus in incremento magnus, sub inspiratione remittens, vel penitus intermittens, ad finem morbi mollis.

G. XIV. HEPATITIS. 312

Est phlegmasia acuta, cujus symptomata sunt tensio dolorifica hypochondrii dextri sub costis spuriis, cum sensu ardoris ac gravitatis, dyspnœa, tussi sicca, faciei colore flavescente, siti, anorexia, sæpius & singultu, vomitione & tumoribus hepatis; pulsus est subdurus, tensus; urinæ icteritiæ, biliosæ; serum sanguinis missi & crusta subflava; febris quasi semper remittens.

G. XV. SPLENITIS. 313

Cognoscitur hæc phlegmasia febre remittente, sæpius tetartophya, tumore, duritie in regione lienis, dolore tactum fugiente pulsatili, calore, dyspnœa, pulsu in inspiratione intermittente in carpo sinistro magis, & absentia symptomatum nephriticorum; frigent hi ægri artubus; calor

internus non est adeo magnus, sanguis missus est crusta inflammatoria tectus, cibi adest fastidium, decubitus in latus sinistrum difficilis, sitis & anxietas. Semel observavi hunc morbum sicut illum hic descripsi.

314 G. XVI. NEPHRITIS.

Est phlegmasia pyrexia acuta, dolore renum inflammatorio, urinæ ardore, mictione frequenti stipata; dolor sequitur ureteres, testis retrahitur, rotatur, crus stupet, plerumque adest vomitio, sine augmento doloris æger potest corpus ad anteriora flexum erigere.

315 G. XVII. ETRITIS.

Hanc phlegmasiam adesse noscimus tumore, ardore, dolore, gravitate in regione uteri, & pyrexia acuta; digiti in vaginam immissi os uteri tactum non fert, idem valde calet; adest dolor ad inguina, femora, diaphragma, qui ad claviculas extenditur, cum dyspnœa, nausea, vomitione, singultu, obstipatione, ischuria, vel dysuria horrore perpetuo, frigore extremorum, delirio, jactatione, spasmis, dolore oculorum; pulsus varius, animi deliquia, sopor, tetanus, catalepsis, observantur, cum febre plerumque remittente,

CLAS-

CLASSIS XII.

FEBRES.

CHAR. CLASSIS. Pulsus frequens, celer, fortis; respiratio celeritate, magnitudine, frequentia aucta, viribus artuum minutis; vel virium vitalium augmentum, aut saltem in statu sanitatis perseveratio, viribus artuum notabiliter minutis.

O. I. FEBRES CONTINUÆ.

Pyrexia semel crescit, & semel decrescit in decursus ægritudinis.

G. I. JUDICATORIA. 316

Ingruit tota febris subito cum frigore, calore, capitis dolore, &c. pulsu aliquo critico, aut evacuationibus criticis, vires artuum parum sunt minutæ, vires contra vitales multum auctæ, criticæ: absolvitur 4 diebus.

G. II. HUMORARIA. 317

Cognoscitur hæc febris pulsu irritationis, incremento successivo usque IV. V. VII. vel IX. diem, duratione morbi usque VII. IX. XI. vel XIV. diem, notabili debilitate artuum, vehementibus symptomatibus, & humorum augmento, aut vitio, unde noscitur.

G. III. FRIGERARIA. 318

Est febris continuæ genus, quæ decurrit ad XVII. XXI. vel XXX. diem, incrementum habet longius præcedente; ingruit cum pulsu irritationis; pulsu & respiratione auctis, viribus artuum multum minutis, notabili frigore sæpe & rigore, unde *Frigeraria*; lingua est sordida, excreta omnia fœtida, a statu naturali multum distantia; hæc est febris proprie *putrida*.

319 G. IV. TYPHUS:

Est febris continuæ genus, quæ plerumque ultra tres septimanas durat, calore jam magno, jam nullo, urina & pulsu sanorum similibus, artuum summa debilitate; pulsus quandoque rarior est quam pulsus sanus, color cutis pallidus, squalidus, exanthemata varia huic morbo superveniunt epigenomena.

320 G. V. HECTICA.

Est febris continua, quæ chronicorum morborum more sensim extendi suevit per plures septimanas, imo menses, sine notabili virium prostratione, cum exigua pulsus frequentia; urina sæpius est turbida, pelliculam innatantem pinguem gerit; pulsus est subdurus, post pastum frequentior, calor ad attactum est mordens; sudores nocturni; febris hæc, nullam habens exacerbationem notabilem, differt ab omni amphimerina, phthisi, & tabe, quia suppurationem pro causa non habet; ægri sunt plerumque orthostadii.

O. II. FEBRES REMITTENTES.

Sunt febres continuæ cum exacerbationibus quotidianis, tertianis, quartanis, &c.

321 G. VI. AMPHIMERINA.

Est febris continua, cum exacerbationibus quotidianis sibi similibus.

322 G. VII. TRITÆOPHYA.

Est febris continua, cum exacerbationibus tertianis.

323 G. VIII. TETARTOPHYA.

Est febris continua, cum exacerbationibus quartanis, seu quartanæ typum servantibus.

O. III. FEBRES INTERMITTENTES.

Pyrexia in decursu ægritudinis pluries penitus deserit ægrum, & redit cum intervallis mediis lucidis servata periodo.

G. IX. QUOTIDIANA. 324

Febris intermittens, cujus paroxysmi similes redeunt nycthemeris singulis.

G. X. TERTIANA. 325

Est febris intermittens, cujus paroxysmi alternis diebus sibi similes repetunt, seu circuitum servant; urinæ lateritiæ sunt optimum signum febrium intermittentium.

G. XI. QUARTANA. 326

Est febris intermittens, cujus paroxysmi sibi similes quarta quavis die abeunt, & revertuntur, inter quoslibet duos paroxysmos intercedunt duæ dies apyretæ.

G. XII. ERRATICA. 327

Hæc febris distinguitur ab aliis generibus per accessus similes pluribus diebus ab invicem distantes quam duobus, nec proinde ad priora genera referri potest.

CLASSIS XIII.

VESANIÆ.

CHAR. CLASSIS. Morbus mentis, seu error in imaginatione, appetitu, judicio, vel memoria.

ORDO I. HALLUCINATIONES.

Imaginationes deceptivæ ex errore organi, vel mentis natæ.

328 G. I. VERTIGO.

Est hallucinatio, qua objecta, licet quiescentia, e loco moveri, nutare, vel in gyrum versari, nobis videntur, ipseque æger quandoque sibi nutare videtur; dicta phænomena etiam clausis oculis plerique patiuntur.

329 G. II. SUFFUSIO.

Est genus morbi imaginarii, cujus præcipuum symptoma est hallucinatio visus circa objecta videntis corpora, quorum prototypus extra oculos non existit; suffusio repræsentat corpora quæ non sunt, & vertigo motum corporum, quo actu non aguntur.

330 G. III. DIPLOPIA.

Est hallucinatio, qua affecti idem objectum geminatum, aut multiplicatum, videntur sibi videre.

331 G. IV. SYRIGMUS.

Est error imaginationis sonos, qui extra aurem non sunt, sibi repræsentantis, a commotione vibratoria organorum acusticorum per principia in aure latentia natos.

332 G. V. HYPOCHONDRIASIS.

Est delirium circa propriam valetudinem, natum ex philautia, salvo ratiocinio de reliquis, delirant & desperant de sua valetudine recuperanda ob ructus, borborygmos, palpitationes, tremorem præcordiorum, fugaces vertigines, flatulentiam, &c. Hinc hi persuasi fatum lethale sibi imminere, omnia symptomata & minimas mutationes in corpore suo scrupulose observant, narrant, & describunt medicis, suisque querelis alios mox & alios defatigant, ingenio cæterum & appetitu pollentes.

333 G. VI. SOMNAMBULISMUS.

Est dormientium hallucinatio, somniantes, nempe, ob imaginationem vividissimam, sopitis somno sensibus, motus musculares exercent, surgunt e le-

electo, variis periculis sese exponunt, tecta scandunt, iter suscipiunt.

O. II. MOROSITATES.

Cupiditates, vel aversationes depravatæ.

G. VII. PICA. 334

Est alimentorum inassuetorum, vel rerum indigestibilium, appetitus, cum assuetorum aversatione.

G. VIII. BULIMIA. 335

Est appetitus majoris alimentorum digestibilium & solitorum copiæ, quam quæ a viribus ventriculi digeri potest.

G. IX. POLYDIPSIA. 336

Est potulentorum appetitus immodicus.

G. X. ANTIPATHIA. 337

Est aversatio quorundam objectorum tanta, quod homo ex eorum visu, odoratu, auditu, &c. gravia symptomata patiatur.

G. XI. NOSTALGIA. 338

Est desiderium videndi parentes, cognatos, solumque natale adeundi adeo ardens, ut hac sola anhelatione occupati penitus langueant, horumque animæ commercium cum corpore ferme sublatum sit; unde languent omnes sensus, & appetitus alii; hectica febris hos miseros consumit, & ad lethum ducit, si adeundi patriam cognatos copia denegetur; olim in Croatia Crisii laboravi hoc malo cum apositia, & obstipatione, intumueram ex anasarca pervigil & debilis; redux ad patriam sine omni pharmaco convalui; desiderans varia ardentissime.

G. XII. PANOPHOBIA. 339

Est summus pavor inter dormiendum sine causa evidenti ortus; clamant hi, gemunt, tremunt, sudant; hoc genus non multum differt ab ephiaite.

340 G. XIII. SATYRIASIS.

Est morbus proprius viris, cujus præcipuum symptomata est effrænis impudensque veneris cupiditas, cum libidinosa penis tentigine; priapismus caret cupiditate libidinosa.

341 G. XIV. NYMPHOMANIA.

Hujus generis character est effræne, audax, & impudens in fœminis veneris desiderium.

342 G. XV. TARANTISMUS.

Hic morbus scribitur in Apulia esse endemius, cujus præcipuum symptoma est inexplicabilis saltandi, choreas agendi cupiditas; a tarantulæ morsu excitari hunc morbum judicat Baglivias, quod Ill. Serao & experimenta Romana inficiantur.

343 G. XVI. HYDROPHOBIA.

Est morbus, cujus præcipuum symptoma est incredibilis potulentorum omnium aversatio, impossibilis deglutitio; vitant insuper lucem & aeris motum.

334 G. XVII. RABIES.

Est morbus in lupis & canibus observatus, cujus præcipuum symptoma est effrænis cupiditas mordendi obvios omnes, licet innocuos, sine hydrophobia; constat enim repetita apud Gallo-Provinciales experientia canes luposque rabidos bibisse, manducasse, & flumen tranasse; hic nihilominus morbus sæpius est symptoma hydrophobiæ: Vide dissertationem Ill. de *Sauvages* de Rabie. Rabies porro datur *canina*, *maniaca*, & *dæmonomaniaca*. Vide *Hydrophobiam*.

O. III. DELIRIA.

Delirium est ortus idearum non respondens obje-

ctis

ctis in sensus incidentibus, sed internæ cerebri dispositioni a qua nascuntur ideæ delirantium.

G. XVIII. PARAPHROSYNE. 345

Est delirium fugax a veneno, vel alio morbo dependens, cujus comes & symptoma est.

G. XIX. AMENTIA. 346

Est insania chronica, universalis, mitis, seu ineptitudo ad recte ratiocinandum & judicandum, cum sensu & perceptione objectorum, ast sine attentione.

G. XX. MELANCHOLIA. 347

Est insania chronica partialis, mœsta, meditabunda; delirant melancholici sine furore, & sine febre, de uno potissimum objecto constanter, delirant circa semetipsos, aut suum statum, de reliquis objectis adhuc sat bene ratiocinantes; mihi videtur causa hujus morbi latere in abdomine, ganglia semilunaria afficere, & plexus nervorum abdominales.

G. XXI. DÆMONOMANIA. 348

Est delirium sine febre reipsa tale, vel tantum simulatum, quo magi, sagæ, præstigiatores se tanquam a dæmone obsessos ostentant, varia phænomena leges naturales excedentia præstare, exhibere volunt.

G. XXII. MANIA. 349

Est delirium apyretum circa quævis objecta, cum furore, audacia, ac robore; maniaci habent plerique lucida intervalla; subin est mania periodica, unde Lunatici; sanguis maniacorum viscidus, seroque carens, fibræ musculares rigidæ.

O. IV. VESANIÆ ANOMALÆ.

Morbi prioribus affines.

350 G. XXIII. AMNESIA.

Est memoriæ imminutio aut plenaria abolitio.

351 G. XXIV. AGRYPNIA.

Pervigilium immodicum vel continuum, ex quo vires imminuntur; anxietas, inquietudo, anorexia, cephalalgia, aliaque molesta symptomata, oriuntur.

PARS QUINTA.

TABULÆ NOSOLOGICÆ

AB EXIMIO MEDICO

DAVIDE MACBRIDE

COMPOSITÆ.

EX EJUS OPERE

CUI TITULUS,

A Methodical Introduction to the Theorii and Practice og Physic.

London 1772.

TABULÆ NOSOLOGICÆ.

Eruditus auctor morbos in quatuor classes, in universales scilicet, locales, sexuales, & infantiles, distribuere voluit: distributionem tamen non nisi per primam classem prosecutus est.

Morbos in hac classe comprehendendos in novem tabulas, sive ordines disposuit, quos hic recensere volumus.

ORDO I. FEBRES.

GENUS I. FEBRIS CONTINUA.

Species 1. Continua simplex.

Varietates sunt A Continua simplex plethorica.
B Continua simplex a frigore.
C Continua simplex a calore.
D Continua simplex a dolore.
E Continua simplex catharralis.

Sp. 2. Continua inflammatoria.

Var. A Continua inflammatoria cephalalgica.
B Continua inflammatoria soporosa.
C Continua inflammatoria pleuritica.
D Continua inflammatoria rheumatica.
E Continua inflammatoria dysenterica.

Sp. 3. Continua nervosa.

Var. A Continua nervosa communis seu febricula.
B Continua hyrocephalica.

Sp. 4.

Sp. 4. Continua putrida.

Var. A Continua putrida carceraria.
B Continua putrida maligna Hungar.
C Continua putrida maligna Ægyptiorum.
D Continua putrida icteriodes Carolinensis.
E Continua putrida icteriodes Canadensis.

Sp. 5. Continua mista.

Var. A Continua mista depuratoria.
B Continua mista sudatoria.
C Continua mista comatoria.
Var. D Continua mista variolosa.
E Continua mista hyemalis.
F Continua mista verminosa.

G. II. FEBRIS INTERMITTENS.

Sp. 1. Quotidiana.

Var. A Quotidiana simplex.
B Quotidiana duplicata.
C Quotidiana hysterica.
D Quotidiana cephalalgica.

Sp. 2. Tertiana.

Var. A Tertiana legitima.
B Tertiana spuria.
C Tertiana pleuritica.
D Tertiana asthmatica.
E Tertiana carotica.
F Tertiana cardialgica.
G Tertiana duplex.
H Tertiana duplicata.
I Tertiana urticata.
K Tertiana hemiplegica.
L Tertiana rheumatica.

Sp. 3. Quartana.

Var. A Quartana legitima.
B Quartana splenetica.
C Quartana hepatica.
D Quartana metastatica.

Sp. 4. Erratica.
Var. Quintana, Sextana, &c.

G. III. FEBRIS REMITTENS.

Sp. 1. Remittens inflammatoria.
Var. A Remittens inflammatoria catarrhalis.
B Remittens inflammatoria peripneumonica.
C Remittens inflammatoria ardens.

Sp. 2. Remittens putrida.
Var. A Remittens putrida biliosa.
B Remittens putrida anginosa maligna.
C Remittens putrida paludosa.

G. IV. FEBRES EXANTHEMATICA.

Sp. 1. Variola.
Var. A Variola simplex.
a Variola simplex discreta.
b Variola simplex confluens.
c Variola simplex crystallina.
d Variola simplex verrucosa.
B Variola complicata.
a Variola complicata inflammatoria.
b Variola complicata crystallina.
c Variola complicata nigra seu sanguinea.
d Variola complicata dysenterica.

Sp. 2. Morbilli.
Var. A Morbilli regulares.
B Morbilli anomali.
C Morbilli variolosi.

Sp. 3. Scarlatina.
Var. A Scarlatina benigna.
B Scarlatina maligna.

Sp. 4. Erysipelas.

Sp. 5. Miliaria.
Var. A Miliaria simplex.
B Miliaria catarrhalis.
C Miliaria inflammatoria.
D Miliaria serosa.
E Miliaria putrida seu petechialis.

Sp. 6. Aphtha.

Sp. 7. Pemphigus.

Sp. 8. Pestis.

G. V. HECTICA.

Sp. 1. Phthisis.

Var. A Phthisis sicca.
B Phthisis mucosa.
C Phthisis hæmoptoica.
D Phthisis scrophulosa.
E Phthisis scorbutica.
F Phthisis asthmatica.
G Phthisis syphilitica.

Var. H Phthisis arthritica.
I Phthisis hypochondriaca.
K Phthisis chlorotica.

Sp. 2. Tabes.

Var. A Tabes hepatica.
B Tabes mesenterica.
C Tabes dorsalis.
D Tabes scrophulosa.
E Tabes scorbutica.
F Tabes asthmatica.
G Tabes syphilitica.
H Tabes arthritica.
I Tabes hypochondriaca.
K Tabes chlorotica.

ORDO II. INFLAMMATIONES.

G. I. INFLAMMATIO EXTERNA.

Sp. 1. Phlegmone.
Sp. 2. Erysipelas.
Sp. 3. Furunculus.
Sp. 4. Anthrax.
Sp. 5. Ophthalmia.
Sp. 6. Cynanche.

Var. A Cynanche tonsillaris.
B Cynanche trachealis.
C Cynanche suffocatio stridula, Croup.
D Cynanche maxillaris.

G. II. INFLAMMATIO INTERNA.

Sp. 1. Phrenitis.
Sp. 2. Otitis.
Sp. 3. Carditis.
Sp. 4. Pleuritis.

Var. A Pleuritis simplex.
B Pleuritis complicata.

Sp. 5.

Sp. 5. Peripneumonia.
Var. A Peripneumonia ſimplex.
B Peripneumonia complicata.
Sp. 6. Paraphrenitis.
Sp. 7. Hepatitis.
Sp. 8. Splenitis.
Sp. 9. Epiploitis.
Sp. 10. Gaſtritis.
Var. A Gaſtritis exanthematica.
B Gaſtritis a veneno.
C Gaſtritis traumatica.
Sp. 11. Enteritis.
Var. A Enteritis dyſenterica.
B Enteritis hernioſa.
C Enteritis a veneno.
Sp. 12. Meſenteritis.
Sp. 13. Nephritis.
Sp. 14. Cyſtitis.

ORDO III. FLUXUS.

G. I. ALVIFLUXUS.

Sp. 1. Cholera.
Var. A Cholera ſpontanea.
B Cholera verminoſa.
C Cholera arthritica.
Sp. 2. Dyſenteria.
Var. A Dyſenteria putrida.
B Dyſenteria inflammatoria.
Sp. 3. Diarrhœa.
Var. A Diarrhœa ſtercoroſa.
B Diarrhœa bilioſa.
C Diarrhœa ſeroſa.
D Diarrhœa verminoſa.
Sp. 4. Lienteria.
Sp. 5. Cœliaca.
Sp. 6. Hepatirrhœa.
Sp. 7. Melana.

G. II. HÆMORRHAGIA.

Sp. 1. Epiſtaxis.
Var. A Epiſtaxis critica.
B Epiſtaxis activa.
C Epiſtaxis paſſiva.
Sp. 2. Hæmoptyſis.
Var. A Hæmoptyſis accidentalis.

B Hæmoptysis habitualis.
C Hæmoptysis periodica.
D Hæmoptysis traumatica.

Sp. 3. Hæmatemesis.
Sp. 4. Hæmaturia.
Sp. 5. Hæmorrhois.

G. III. FLUXUS HUMORALES.

Sp. 1. Ephidrosis.
Sp. 2. Diabetes.

Var. A Diabetes verus.
B Diabetes hystericus.
C Diabetes arthriticus.
D Diabetes febricosus.

O. IV. DOLORES.

Sp. 1. Arthritis regularis.
Sp. 2. Arthritis irregularis.
Sp. 3. Arthritis complicata.

Var. A Arthritis rheumatica.
B Arthritis chlorotica.
C Arthritis melancholica.
D Arthritis scorbutica.
E Arthritis syphilitica.
F Arthritis asthmatica.
G Arthritis cardialgica.
Var. H Arthritis exanthematica.
I Arthritis rachistica.

G. II. RHEUMATISMUS.

Sp. 1. Rhaumatismus acutus.
Sp. 2. Rheumatismus chronicus.

Var. A Rheumatismus desentericus.
B Rheumatismus arthriticus.
C Rheumatismus scorbuticus.
D Rheumatismus syphiliticus.
E Rheumatismus hystericus.

Sp. 3. Lumbago.
Sp. 4. Sciatica.

G. III. OSTOCOPUS.

Sp. 1. Ostocopus spina ventosa.
Sp. 2. Ostocopus cancrosus.
Sp. 3. Ostocopus syphiliticus.
Sp. 4. Ostocopus ab osteosarcosi.
Sp. 5. Ostocopus scorbuticus.

G. IV. DOLOR CAPITIS.

Sp. 1. Cephalalgia.

Sp. 2. Cephalæa.

Sp. 3. Hemicrania.

G. V. ODONTALGIA.

Sp. 1. Odontalgia catarrhalis.

Sp. 2. Odontalgia cariosa.

Sp. 3. Odontalgia scorbutica.

Sp. 4. Odontalgia arthritica.

Sp. 5. Odontalgia hysterica.

G. VI. OTALGIA.

Sp. 1. Otalgia inflammatoria.

Sp. 2. Otalgia purulenta.

Sp. 3. Otalgia verminosa.

Sp. 4. Otalgia ab intrusis.

Sp. 5. Otalgia catarrhalis.

G. VII. PLEURODYNE.

Sp. 1. Pleurodyne plethorica.

Sp. 2. Pleurodyne flatulenta.

Sp. 3. Pleurodyne a spasmate.

Sp. 4. Pleurodyne parapleuritica.

Sp. 5. Pleurodyne verminosa.

G. VIII. DOLOR VENTRICULI.

Sp. 1 Pyrosis.

Var. A Pyrosis a saburra.

B Pyrosis biliosa.

C Pyrosis ulcerosa.

Sp. 2. Cardialgia.

Var. A Cardialgia saburralis.

Var. B Cardialgia a veneno.

C Cardialgia sputatoria.

D Cardialgia bradypepta.

E Cardialgia arthritica.

F Cardialgia verminosa.

Sp. 3. Gastrodynia.

Var. A Gastrodynia ab ingluvie.

B Gastrodynia flatulenta.

C Gastrodynia biliosa.

D Gastrodynia a veneno.

E Gastrodynia a xyphoide.

F Gastrodynia ab extraneis.

G. IX. COLICA.

Sp. 1. Colica flatulenta.

Sp. 2. Colica inflammatoria.
Sp. 3. Colica biliosa.
Sp. 4. Colica iliaca.
Sp. 5. Colica nervosa.

G. X. LITHIASIS.

Sp. 1. Lithiasis nephritica.
Sp. 2. Lithiasis cystica.

G. XI. ISCHURIA.

Sp. 1. Ischuria renalis.
Var. A Ischuria renalis ab inflammatione
B Ischuria renalis mucosa.
C Ischuria vesicalis, calculosa seu arenosa.
Sp. 2. Ischuria vesicalis.
Var. A Ischuria vesicalis calculosa.
B Ischuria vesicalis inflammatoria.
C Ischuria vesicalis spasmodica.
D Ischuria vesicalis paralytica.
E Ischuria vesicalis polyurica.
F Iscuria purulenta.
Sp. 3. Ischuria urethralis.
Var. A Ischuria urethralis caruncolosa.
B Ischuria urethralis urethro-lithica.
C Ischuria urethralis hydrocelodes.

G. XII. PROCTALGIA.

Sp. 1. Proctalgia inflammatoria.
Sp. 2. Proctalgia fistulosa seu purulenta.
Sp. 3. Proctalgia hæmorrhoidalis.
Sp. 4. Proctalgia cancrosa.
Sp. 5. Proctalgia intertryginosa.

O. V. SPASMI.

G. I. TETANUS.

Sp. 1. Tetanus episthotonos.
Sp. 2. Tetanus opisthotonos.

G. II. CATOCHUS.

G. III. TRISMUS.

Sp. 1. Trismus spontaneus vel primarius.
Sp. 2. Trismus secundarius.

G. IV. HYDROPHOBIA.

Sp. 1. Hydrophobia spontanea.
Sp. 2. Hydrophobia secundaria.

G. V. CONVULSIO.

Sp. 1. Convulsio ab inanitione.

Sp. 2. Convulsio traumatica.
Sp. 3. Convulsio verminosa.
Sp. 4. Convulsio plethorica.

G. VI. EPILEPSIA.

G. VII. ECLAMPSIA.

G. VIII. HIERANOSUS.

O. XI. ADYNAMIÆ.

G. I. COMA.

Sp. 1. Apoplexia.
Var. A Apoplexia sanguinea.
B Apoplexia serosa.
C Apoplexia traumatica.
D Apoplexia temulenta.
Sp. 2. Carus. Sp. 3. Lethargus.
Sp. 4. Catalepsis.

G. II. PARALYSIS.

Sp. 1. Hemiplegia.
Sp. 2. Paraplegia.

G. III. DELIQUIUM.

Sp. 1. Leipothymia.
Sp. 2. Syncope.
Sp. 3. Asphyxia.

O. VII. ANHELATIONES.

G. I. DYSPNŒA.

Sp. 1. Dyspnœa pituitosa.

Sp. 2. Dyspnœa a tuberculis.
Sp. 3. Dyspnœa calculosa.
Sp. 4. Dyspnœa physconialis.
Sp. 5. Dyspnœa scorbutica.

G. II. ORTHOPNŒA.

Sp. 1. Orthopnœa idiopathica.
Var. A Catarrhus suffocativus.
B Peripneumonia notha.
Sp. 2. Orthopnœa sympathica.
Var. A Orthopnœa hysterica.
B Orthopnœa stomachica.

G. III. ASTHMA.

Sp. 1. Asthma humidum.
Sp. 2. Asthma siccum.

G. IV. HYDROTHORAX.

G. V. EMPYEMA.

O. VIII.

O. VIII. MENTALES.

Morborum, qui sub hoc titulo recenseri possint, nullam tabulam hic apposuit clariss. Auctor, & ob hanc causam, ut videtur, quod dubitat an genera maniæ & melancholiæ, sub hoc titulo vulgo recensita, revera aliter differant quam idem natura morbus, qui sub diversa facie diversis temporibus compareat.

O. IX. CACHEXIÆ.

G. I. POLYSARCIA.

G. II. HYDROPS.

Sp. 1. Anasarca.
Sp. 2. Hydrocephalus.
Sp. 3. Hydrops pectoris.
Sp. 4. Ascites.

G. III. ICTERUS.

Sp. 1. Icterus spasmodicus.
Sp. 2. Icterus a pressura.
Sp. 3. Icterus calculosus.

G. IV. EMPHYSEMA.

Sp. 1. Emphysema primarium.
Sp. 2. Emphysema secundarium a vulneribus thoracis.

G. V. TYMPANIATES.

G. VI. PHYSCONIA.

G. VII. ATROPHIA.

G. VIII. OSTEOSARCOSIS.

G. IX. SARCOSTOSIS.

G. X. MORTIFICATIO.

Sp. 1. Sphacelus.
Sp. 2. Necrosis.

G. XI. SCORBUTUS.

G. XII. SCROPHULA.

G. XIII. CANCER.

G. XIV. LUES VENEREA.

FINIS TOMI PRIMI.

=INV 911=